

婦科五



定質料瘤包括脆骨瘤與骨瘤

微細囊瘤包括根囊水脹

根囊

者毛髮等之根皆有油膩囊

脹竟有孩兒頭大兩邊卵核變如腐壞

癰

即蟹癰

卵核為各種癰瘍所害由癰種留在其中所致

癰

種如下

一、卵核或有沙硬壞料

色灰而藍有亮光以刀切之似砂硬有聲

此沙硬壞

料在卵核者固少或婦人中年後有之所生瘤塊或甚大其生

長甚緩與他具若肝若脾若肺沙硬變壞料相同初層或為其

惡毒原病

非別處累及

或為第二層病

由別處傳來

初層之病在身體他

處早已見之

二、卵核或有髓形癰種料在微細卵珠窠中或

在卵珠破核而出處處黃繭或在卵核間隙中癰料漸長大致

卵核包衣繃碎由是髓形癰料即與腹包膜臟腑相遇而脹愈

八、三、沙硬一種或髓形料一種之癰、或兩種合攻囊瘤、而所
攻之癰料、或由本質生、或爲外來質料所生、將囊四圍包裹、視
之似癰料爲其本、而囊瘤反爲其次矣、四、囊瘤內邊、或發微

細血管成絨形、而襯於其內、日後脹大、將囊袋繃碎、其中癰料
卽與腹包膜相遇、癰料卽借資以生發、由是害出危險之腹包
膜發炎、或害腹內水鼓脹、醫於此四種須認明、乃能料病之

勿愈與否、況用手法或刀法、必因是以決斷、其惡毒一種、亦或

刀法手法、令其人得延生數年、卵核瘤症惡毒性如下、一、

卵核定質瘤長發極迅速、二、其人氣力精神血脈一統情形

驟減、三、瘤雖小而脚浮腫、血薄、以血內情形不合、非瘤壓

力所致。四、瘤內覺尖刺痛，並燒熱痛。五、面有慘淡病形。

六、腹包膜水脹，而查其肝並無黃痺水證，亦並無內腎病，無心病，無腹包膜發炎證。卵核微細囊變壞之病甚速，其人瘦損

亦甚快，大乏力，腹包膜水鼓脹，並其面貌失形，此表明惡毒性腹包膜水脹，爲卵核惡毒瘤常有之證據。余於此留意者，以瘤甚小，而腹包膜水脹甚大也。欲查卵核蟹癰，有二種情形相

混。一、懷孕中期或近足月，腹包膜亦有水。二、子宮肌絲瘤

加有水脹，然懷孕者必有懷孕證據，至其子宮肌絲瘤，雖外查證據與內查證據可分辨，而總不能確鑿。病情照尋常查探，

難以測度，須用放水法，或刀取以驗之，有將腹中流質取出，以

扣伸入腹包膜出水之刺孔內，摸得成病之物，以決斷剖腹取法，然此事有甚難者。余曾照此法查得蟹癰，有二人查非蟹

癰，乃是善性瘤囊，幸近時英國二名醫各相考究，用顯微鏡查驗所取之水，分別惡性善類，如屬惡毒水內，必多蟹癰種子，

肌絲瘤。卵核難得有此症，有亦不甚大，有醫生查得肌絲瘤

人如嬰孩頭，其實不是卵核肌絲瘤，係屬子宮脹料佔地步貼於卵核耳，更有子宮周圍肌絲料，通連廣筋，並子宮牽連鈎骨之肌絲，變爲瘤而接連卵核，其情形與子宮肌絲瘤同，惟生在卵核者無梗，以相貼甚密切也，其體積亦不大。

微細囊蟹癰。卵核蟹癰成流質水脹，有三種。一、微細囊生

於沙硬料、或髓形料蟹癰內、如肉瘤中有微細囊、是也。二、微細囊初起本善性、嗣囊內邊發出惡性料而變樣。三、髓形大蟹癰、或能吸引流質、而中間變壞、久卽盡變流質。是則蟹癰往往牽累微細囊變壞、或微細囊變壞而成蟹癰。微細囊蟹癰之最惡者、生長極速、數月後卽大如肉瘤、或微細囊變壞數年之久、尙無此大體積。卵核微細囊蟹癰、與卵核他項瘤症比較多寡如下。史瞰淑尼醫生查卵核症有一千八百二十三人、內卵核瘤九十三人、死而剖驗者四十一人、流質瘤二十五人、凍形料瘤九人、微細囊肉瘤五人、微細囊蟹癰不過二人。刀治法難以取效、余謂以剖腹取卵核水脹法治此症、其人

必傷命。如有能延一綫之命，醫亦必設法治之。

似細囊肌絲瘤，或微細囊肉瘤。子宮而有此二症，醫生分辨甚清。若在卵核，則尚混淆莫辨。由其講論不明耳。有初起一核，則爲肉瘤連累。又微細囊變壞，竟名之曰核微細囊肉瘤。此種瘤生必大。醫生惠爾斯治九十一人，先放其水，然後剖腹取之。統計重三十八觔。暗色薄流質內，多深綠色膽硬質油。有一瘤放流質重十三磅。取其定質亦重十三磅。其定質甚奇。囊瘤內微細囊各大小不一，排列參差。有微細囊內流質甚清。又有肌質似深綠色稠質。此囊瘤內微細囊質與肌絲料質多寡相尋。微細囊料多者，似流質瘤。肌絲料多者，似定質瘤。難分其類。

莫定名稱也。微細囊中之質，或凍形，或膿，或清水，或帶血，而

肌絲料間隔各囊，似連網有血散出，瘤囊資以生長甚速，彼微細囊肉瘤生長快者，亦以此也。刺取流質，卽得微細囊，卽用

取流質具以取之，可令病勢略退，顧此種瘤如此治法，較取流

質瘤更險，往往放血發炎，

流質一去血補其空而卽放血

且內有定質，醫生所刺

之處甚少，不比流質瘤可隨處打針以取之也，除此法外，醫惟

設法減輕其病，用襈頸帶以擡舉其瘤，經期內須十分安靜，

醫生剖腹取水脹卵核，固不及取微細囊變壞者之有效，此乃

無可如何之極思，腹上刀縫較長，而其下面又多牽連膠住各

具之物，手法極不易施展。

真皮料微細囊瘤

身體各處如眼眶上腭舌下腦髓眼睛肺

剛峽肺體腸包膜外腎卵核等往往生特式之瘤內有油膩牙

齒頭髮膽硬質油脆骨並骨瘤內邊似有汗核汗毛油管細紅

痘有薄片珠囊假皮膚

假皮膚所以保護真皮膚即生珠囊片片疊成

囊內邊看似外皮

眉一般今醫家料其懷胎時此處質料依照生真皮膚道理而

成之耳

法國醫生畢艾查有十八次照年歲派如下

十二歲以下童

女五人有此症六個月至兩歲女孩六人足期女胎四個八個

月女胎三個

真皮膚料囊瘤大小不一自雞蛋大至人頭大

瘤甚硬圓形每卵核常例祇生一瘤瘤內有油膩物毛髮牙齒

皮膚料並骨科，牙齒嵌於骨，有甚多者。斯那孛查一瘤內牙齒大小有一百餘粒。有一十七歲閨女，左邊卵核覺脹，二十一年後脹愈大，圍圓有四尺，宥下過膝，三十八歲卽斃。卵核所成囊袋，重有十四磅，其內物質重四十磅，此爲一種稠厚油膩物，形似蜜糖，內含毛髮，有大指麤卷髮，囊內多頭毛，有八塊不等形骨科，內有一塊，長七寸，一長十寸，闊二寸，又一塊多稜角，嵌有六盤牙一虎牙，似二十歲許牙齒，完全堅硬。此種硬物在內，生長甚緩，所惹厭者：一、爲外物易惹膿瘡；二、擦穿皮肉而入腹包膜；三、此真皮料囊袋有惹厭料生長膿瘡，積有流質，變爲流質料瘤。余經醫治多人，移去卵核瘤一百五十個，中

有四個爲真皮料囊，內含油膩頭髮，一個含小骨一塊，四瘤內皮膚料另成一團，不與流質相和，每無意中查得一球形塊，不痛而甚活動，小時固無礙，若有生產，卽爲阻礙，成膿後，作有盆處瘡癰醫治。

第四十八章

卵核成微細囊瘤

凡卵核內本生成有微細囊，脹大卽爲瘤，瘤無定質，不若上所說肌絲瘤或癰之有定質也。卵核各種瘤，微細囊居多，此種瘤同易醫治。生瘤緣由，醫家論說不一，大都分兩大類，一爲卵球微細囊，灌足凍形料，因囊內襯衣發出不合之料，凍形爲囊內發炎所致，一爲卵核內各囊之間隔處生微細各料太多，

卵核微細囊瘤有三明顯之事。一、所成囊在瘤祇一個、或三

四個併成。二、囊瘤有許多小間、每相間隔之料、爲細微囊質、

三、微細囊內有定質有流質。卵核血管因而大改變、此用

顯微鏡查出。一、發血脈管迴血管內邊玻璃式襯衣變壞、如

玻璃車過、不復透光。二、發血脈管料內生珠化生過多而輟、

三、發血脈管襯衣發炎消壞。四、發血脈管所嵌之槽質料、

變壞變大。五、微細血管變爲生珠囊料管子。卵核微細囊

瘤有一層腹包膜蓋之、有卵核本包衣、並一層白色堅固包衣、

有此堅固包衣核乃成式且有珠囊薄衣、腹包膜往往變繭厚、竟至有半寸之

厚。卵核微細囊瘤、有時甚大、內邊單囊所成之瘤尙小、惟數

襄合併所成之瘤有百餘磅重之水醫生有在十二個月內屢
屢放出之水重五百餘磅 卵核發病或一核或兩核最多每
仕右一邊有下表證之

醫生姓氏

總共人數

右卵核

左卵核

左右兩核

茶

九十三

五十

三十五

八

辟洛

二百十五

一百九

七十八

二十六

史瞰淑尼

四十一

十四

十三

十四

卵核囊瘤內物質

其質不一有清蛋白質流質有稠厚黏韌

料管內不能流出必以手取之重率

較重於水

最少者一千零七尋

常有一千零十八或一千零二十其中最要一料爲蛋白質又

名凍形料，在囊多者多此厚料，囊少之瘤越小，其料越濃，囊少之瘤，放出流質後，其料更濃。凍形料變爲內皮汁、胃汁、能消

化食物，以成津液。

蛋白質料，變爲蛋白質胃汁，得身內熱氣，有血脈生

料經過，瘤卽收而爲生發囊瘤之用。卵核瘤流質，一千份內

水有九百三十一·九六，生物料五十九·七七，廢料八·二七，廢

料八·二七，內有水內易消化之鹽類七·五三，如鉀養硫養_三。○

八，鉀養綠養_五·五九，鈉養六·二五，鈉養磷養_五·一一六，鈉養炭

養_二·二八，狼藉失落者約○三，有水內不消化者·七四。卵核

瘤流質，僅用目視，其式不一，以帶有血形，或膿，由瘤內邊滋出

流質，最多色樣如下：一淡色流質，如薏苡湯；一淡紫色，如胡

麻子冲湯，一暗紅色，帶血形流質，一綠黃色，半定質凍料，一帶膿流質，甚臭，似煮爛菜豆湯。一黑色流質甚少，在真皮料瘤，則有一種膠靱米粥料。流質分三種，一種本無蛋白質，惟兩種有之，尋常試驗蛋白質，但加熱度燒煮，或加硝強酸，便能變白凝結，惟此流質內之蛋白質，不能變白凝結，須以他法試驗。上所說卵核瘤流質有蛋白質，亦有無蛋白質者，阿得利醫生云，既屬卵核瘤，必有蛋白質，然則無蛋白質者，決非卵核瘤。治法須分別料理之。阿得利醫生論如下。一千八百七十年十月初，醫一五十歲婦人，數年前腹脹，放水已二十七次，每次放全後，水卽漲滿，甚快，迨末後放水後，覺骨盆處有小瘤，以熱氣

並硝強酸試驗其流質，並無蛋白質，吾乃決其非卵核瘤，度其爲廣筋間清水汁瘤。瘤在骨盆處有雞蛋大，而清水汁瘤情形決不若此，吾甚疑惑，照上法試驗，試不出蛋白質，所以不能用刀法，令其暫且歸去，復來放水，吾請一醫生查驗，醫決其爲卵核瘤。於是十月十四日照法割取其瘤，流質重十五磅，瘤之上半截流質薄似清汁，下半截瘤皮甚厚，垂宕至骨盆處，此係右邊卵核，其大瘤在腹，有一串小瘤在骨盆處。當初卵核本包衣，及白色堅固包衣繃碎，而腹包膜竟無恙，雖繃碎而流質仍聚一處，腹包膜清汁亦聚一處，流質內之定質皆從放血生珠料、油膩料變壞所致，內有膽硬質油、油膩珠、血輪、顏料生珠。

顯微鏡下，卵核瘤流質形狀如下，薄清水汁料，與凍形料相比，無大異，其中有油膩料，圓生珠，亦有生珠邊如鋸齒，凍形料入生珠，圓生珠，似膿之生珠料，有各大小圓塊，又有生珠片，成粗粒，膽硬質油暗紫色顏料，取一滴置顯微鏡下之玻璃片上，卽見極多種子生珠，如第二百五十二圖戊，有多四散之細粗粒如丙，有小油珠如乙，各式生珠片如甲，膽硬質料結長方片如丁，更有血輪如己，發炎血輪如壬，膿珠如庚辛，並血之廢料，及他種珠囊，以此種物與考究顯微鏡，及考究病情家實驗，又與考究卵核家見之，以爲此是緊要證據，試問顯微鏡見此一小件，遂可以決其爲卵核瘤特有之證據乎，如憑此以