

景岳全書卷之八須集傷寒典

會稽 張介賓 會卿著

會稽 曾 趙 謙菴訂

傷寒下

溫病暑病三十三

溫病暑病之作本由冬時寒毒內臟故至春發為溫病至夏發為暑病此以寒毒所化故總謂之傷寒仲景曰發熱不惡寒而渴者溫病也暑病則尤甚矣蓋暑病者即熱病也是雖與寒證不同然亦因時而名非謂其病必皆熱也此外如夏月中暑者亦謂之暑病則又非寒毒蓄留之證在仲景即名之為中暍義許者證門所當參閱

溫病暑病之治宜從涼散固其然也然必表裏俱有熱證方

可治用清涼若值四時寒邪客勝感冒不正之氣表邪未解
雖外熱如火而內無熱證可據者不得以溫暑之名執以爲
熱而槩用涼藥

一冬有非時之煖或君相客熱之令而病熱者名曰冬溫此與
冬月正傷寒大異法宜涼解此舍時從證也若夏有寒者其
宜溫亦然

素問刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑傷寒
論曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑此二論之言
傷寒傷暑者非卽溫病暑病之謂蓋單指夏月感觸時氣者
所當辨其爲寒爲暑而寒則宜溫暑則宜清也身寒者言受
寒憎寒身熱者言受熱發熱非曰身冷者方是傷寒身熱者
乃是傷暑也但此二論則一曰氣盛氣虛一曰脉盛脉虛詞
氣而則一曰氣盛氣虛一曰脉盛脉虛者當在本元

合而觀之則見理精矣

發斑三十例

發斑證輕則如疹子重則如錦紋其致此之由雖分數種然總由寒毒不解而然如當汗不汗則表邪不解當下不下則裏邪不解當清不清則火盛不解當補不補則無力不解或下之太早則邪陷不解或以陽證誤用溫補則陽亢不解或以陰證誤用寒涼則陰凝不解凡邪毒不解則直入陰分鬱而成熱乃致液涸血枯斑見肌表此實毒邪固結營衛俱劇之證也但斑有微甚勢有重輕輕者細如蚊迹或先紅而後黃重者成粒成片或先紅而後赤輕者只在四肢重者乃見胸腹輕者色淡而隱重者色紫而顯若見黑斑或大便自利或短氣或二便不通則十死九矣凡病傷寒而汗下溫清俱不能解及足冷耳聾煩悶咳嘔者便是發斑之候

一 成無已曰大熱則傷血熱不散裏實表虛熱邪乘虛出於皮膚而爲斑也慎不可發汗若汗之重令開泄更增斑爛也自後諸家所述皆同此說予則以爲不然蓋凡傷寒之邪本自外而入深入不解則又自內而出此其表裏相乘勢所必至原非表虛證也但使內外通達則邪必由表而解矣 卽如犀角地黃湯乃治斑之要藥人知此湯但能涼血清毒而不知此湯善於解表散邪若用之得宜則必通身大汗熱邪頓解何爲不可汗耶由此言之則凡脉數無汗表證具在者必須仍從解散

一 凡治發斑須察表裏如瘟疫不解熱入血室舌焦煩熱發斑者犀角地黃湯○內外俱熱陽明狂躁大渴發斑者白虎湯或加人參○陽毒赤斑狂言見血者陽毒升麻湯○疫癘發斑大熱而燥者三黃石膏湯○火鬱於經寒邪不解脉仍沉

數而發斑者一柴胡飲○陽明外邪陽毒不解者升麻湯○
脾腎本虛外邪不解而發斑者五柴胡飲○陽明表邪不解
溫熱發斑者柴胡白虎煎○溫熱毒盛咽痛發斑者玄參升
麻湯○陰虛水虧血熱發斑者玉女煎○陰虛血燥大熱大
渴發斑者歸葛飲○內虛外實陰盛格陽發斑者大溫中飲
○太陽陽明惡熱大便秘結邪毒在府發斑者調胃承氣湯
一片本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解尋常用大
溫中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪達多有見
赤斑風併隨汗而出隨出隨沒頃刻卽愈活者多人矣凡寒
毒爲斑卽此可見使內托無力則此毒終無出期日深日甚
難乎免矣此理甚微不可不察

發黃三十五

凡發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹

滿不痛或大便實而渴甚脉來沉實有力皆濕熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃白退矣然黃有陰證及諸治法俱詳黃疸門宜參用之

仲景曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之則爲結胸若不結胸但頭汗出小便不利身必發黃也○曰陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃○陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗際頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之○曰傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也○曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之○

傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

八曰黃疸瘰浮者當以汗解之宜桂枝加黃耆湯

發狂三十六

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂而實非
犯此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡實熱之狂本屬陽明
蓋陽明爲多氣多血之經陽邪傳入胃府熱結不解因而發狂
內經陽明脈解篇曰胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其
惡火者熱甚則惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡
人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋
者以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣
而走者以熱盛於身也其妄言罵詈不避親疎而歌者以陽盛
爲邪也又曰陰不勝其陽則脈流溲疾并乃狂又曰邪入於陽
則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令神志昏亂若此此陽狂
也然傷寒病至發狂是爲邪熱已極使非峻逐火邪則不能已

故但察其大便鞭結或腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承氣或涼膈散六一順氣湯之類下之可也如無脹滿實堅等證而惟胃火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其病自愈

一如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不解熱結胸脇其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯○又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人如狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下其血乃愈抵當湯主之按此二條以太陽熱邪不解隨經入府但未至發狂故曰如狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

二近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失情

而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其
本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證
如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之
氣內無胸腹之結滑實之脉雖或不時躁擾而禁之則止口
多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則口
無焦渴察其下則便無鞭結是皆精氣受傷神魂不守之證
此與陽極爲狂者反如冰炭而時醫不能察但見錯亂便謂
陽狂妄行攻瀉必致殺人凡治此者須辨陰陽其有虛而挾
邪者邪在陽分則宜補中益氣湯之類邪在陰分則宜補陰
益氣煎之類虛而無邪者在陽分則宜四君八珍十全大補
湯大補元煎之類在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之
類陰虛挾火者宜加減一陰煎二陰煎之類陽虛挾寒者宜
理中湯回陽飲八味湯右歸飲之類此方治之宜大畧如此

而變證之異則有言不能傳者能知意在言表則知所未言矣

一凡身有微熱或面赤戴陽或煩燥不寧欲坐卧於泥水中然脉則微弱無力此陰證似陽也名爲陰躁蓋以陽虛於下則氣不歸原故浮散於上而發躁如狂速當溫補其下命門煖則火有所歸而病當自愈若醫不識此而誤用寒涼者必死一發狂下利譫語者不治○狂言反目直視者爲腎絕死○汗出後輒復熱狂言不食者死

風濕三十七

仲景論曰太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺其人小便不利大便反快但當利其小便○曰濕家之爲病一身盡熱身色如熏黃○濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向背之身如蟻行濕小便利者如胎者以月日有熱

有寒濕欲得水而不能飲口燥煩也○濕家下之額上汗出微喘小便不利者死利下不止者亦死

論曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也○濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈○病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

論曰傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濡者桂枝附子湯主之○若其人大便鞭小便自利者桂枝湯去桂加白朮主之○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣

或身微腫者甘草附子湯主之

結胸 三十八

仲景曰病有結胸其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也○曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也○曰結胸脉浮大者不可下下之卽死○曰結胸證悉具煩躁者亦死

論曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之胃中空虛陽氣內陷心下因鞅而爲結胸大陷胸湯主之○曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞅滿而痛不可近者大陷胸湯主之○按此二條皆言太陽表證未解因誤下之而成結胸也

論曰傷寒五六日嘔而發熱者此柴胡湯證具而以他藥下之其柴胡證仍在者當復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯○按此一條以少陽表證未解因誤下之而成結胸也

論曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不入其人煩心○按此一條以太陽少陽併病二經表邪未解亦因誤下而成結胸也

論曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈○按此一條謂陽明邪氣入府者必腹滿便結今惟心下鞭以邪氣尚淺未全入府故不可攻此雖非結胸而實亦結胸之類蓋不由誤下而因陽明之邪漸深也

論曰傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者大

陷胸湯主之○按此一條不云下早而云熱實其於六七日脉沉緊而心下鞭痛者此傷寒傳裏之實邪有不因誤下而成結胸者乃傷寒之本病也

愚按結胸一證觀傷寒論所載如前數條凡太陽表邪未解而誤下者成結胸少陽證亦然太陽少陽併病者亦然此不當下而誤下之以致藏氣空虛外邪乘虛內陷結於胸膈之間是皆因下而結者也又曰傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者此不因下而邪實漸深結聚於胸者也然則結胸一證有因誤下而成者有不因下而由於本病者觀近代傷寒諸書云未經下者非結胸也豈不謬哉

一結胸證觀仲景所言惟太陽少陽二經誤下者有之而陽明一經獨無言及者何也蓋凡病入陽明胃府已實故可下之而無害也然又曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利不

此者死此豈非陽明在經表證邪未入府者亦爲不可下乎
不惟三陽爲然卽三陰之證其有發熱惡寒表邪未解者切
不可下最當慎也

結胸證治之辨凡心腹脹滿鞭痛而手不可近者方是結胸
若但滿不痛者此爲痞滿非結胸也凡痞滿之證乃表邪傳
至胸中未入於府此其將入未入猶兼乎表是卽半表半裏
之證只宜以小柴胡之屬加枳殼之類治之或以本方對小
陷胸湯亦妙今余新方製有柴陳煎及一柴胡飲之類皆可
擇而用之也至於結胸之治則仲景俱用大陷胸湯上之然
以余之見則惟傷寒本病其有不因誤下而實邪傳裏心不
鞭滿痛連小腹而不可近或燥渴譫妄大便鞭脈來沉實有
力者此皆大陷胸湯所正宜也其於太陽少陽表邪未解因
下早而致結胸者此其表邪猶在若再用大陷胸湯是旣因

誤下而復下之此則余所未敢不若以痞滿門諸法酌其輕重而從乎雙解以緩治之或外用罨法以解散胸中實邪此余之屢用獲效而最穩最捷者也罨法見新方因類第三十

陰厥陽厥三十九

附藏厥虵厥

厥有二證曰陽厥曰陰厥也陽厥者熱厥也必其先自三陽傳入陰分故其初起必因頭疼發熱自淺入深然後及於三陰變爲四肢逆冷或時乍溫其證必便結躁煩譫語發渴不惡寒反惡熱脈沉有力此以傳經熱證所化外雖手足厥冷內則因於熱邪陽證發厥故爲陽厥乃陽極似陰也其證由邪熱內結或伏陽失下之所致也凡厥微則熱亦微宜四逆散之類厥甚則熱亦甚宜承氣湯之類也○厥陰者寒厥也初無三陽傳經實熱等證而真寒直入三陰則畏寒厥冷腹痛吐瀉戰慄不渴脈沉無力者此陰寒厥逆獨陰無陽也故爲陰厥輕則理中湯重