

東醫西寶鑑

卷九



訂正東醫寶鑑外形篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

胃

胃膈之名有義

夫人之胃者呼吸之所經飲食之所過一或失節則疾病邪氣交至於胃中乃

有凶之兆故謂之胃也入式。膈膜在心肺之下與背脊胃腹周回相著如幕不漏蓋膈者隔也遮隔濁氣不使上熏於心肺故謂之膈也入門

胃膈度數

胃圍四尺五寸欽盆以下至髑髀長九寸靈樞。咽以下膈以上通謂之胃入門

胃膈部位

膈者心肺之分野也綱目。胃腹者藏府之郭也膈中者心王之宮城也靈樞。咽之下

胃腹也貫膈與肺系相並在肺系之後其上即咽門也胃脘之下即胃之上口也謂之賁門其膈膜

相貼之間亦漫脂相包也。入門。胃脘一作管貫
膈與心肺相通。膈膜相繆也。入門。心包絡在心
下黃膈膜之上。豎斜膈膜之下。與橫膜相粘。黃脂
漫包者。心也。漫脂之外。細筋膜如絲。與心肺相連
此包絡也。入門。

臟腑經脉皆貫膈

手太陰之脉上膈屬肺。手陽明之
脉下膈屬大腸。足陽明之脉下膈

屬胃絡脾。足太陰之脉上膈挾咽其支者別上
膈注心中。手少陰之脉下膈絡小腸。手太陽
之脉下膈屬小腸。足小陰之脉上貫肝膈。手
厥陰之脉下膈歷絡三焦。手小陽之脉下膈偏
屬三焦。足少陽之脉貫膈絡肝屬膽。足厥陰
之脉上貫膈布脇肋。已上十一經皆貫膈。惟足
太陽循下于背故不貫膈。銅人
脉陽微陰弦則胃痺而痛。陽微故知在上焦陰弦
故知胃痺心痛。仲景。胃痺痛寸口脉沈而遲關

脉法

上小緊而數仲景。心腹痛宜見沈細不宜見浮大得效。心腹痛脉沈細宜浮大弦長命必殂脉訣。心腹痛脉沈細宜浮大弦長命必殂脉訣。沈弦細動皆是痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然脉訣。胃痞脉滑為有痰結弦伏亦痞澀則氣劣脉訣。心痛左手脉數熱多也脉濇有外血也右手脉緊實是痰積也脉大必是久病也兩手脉堅實不大便可下之痛甚者脉必伏丹心。痞病右關脉多弦弦而遲者必心下堅正傳。心脉微急為痛微大為心痺引背痛短而數或濇者心痛正傳。

心痛與胃脘痛病因不同

心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令

心下急痛直指。真心痛即死不治其久心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不灰發作有時經久不得差也得效。胃之上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當心而痛今

俗呼為心痛者誤也夫九種心痛詳其所出皆在胃脘而實不在於心也正傳○胃脘當心而痛脾藏連心而痛局方皆云心痛蓋心痛少而脾胃痛居多心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也入門○心病者府中痛內經○諸經心痛引脊多屬風冷諸胃心痛難俛仰嘔瀉多屬熱入門

心痛有九種

一日虫二日疰三日風四日悸五日食六日飲七日冷八日熱九日去來下通用手

拈散九痛丸通靈散拈痛

丸神聖代鍼散方見前陰

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果玄胡索靈脂並沒藥酒調二三錢一似手拈却

九痛丸

治九種心痛及積冷心胃痛炮附子三兩吳茱萸人參乾薑炮巴豆去皮油各一兩狼毒

五錢右為末蜜丸梧子

大溫酒下三五丸局方

通靈散

治九種心痛蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍藥各五錢右剉五錢水煎入鹽少許服入門

拈痛丸

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當歸蓬朮各五錢右末蜜丸梧子大陳皮煎湯

下二三十

丸直指

蟲心痛

胃脘痛痛定便能食時作時止者是蟲痛也丹

虫痛之證心腹痛上下攻刺嘔噦涎沫或吐清水

面色青黃宜化虫丸化虫散妙應丸見二方並○虫

痛二陳湯方見痰飲加苦楝根煎服醫鑒

○虫痛小兒多有之當與虫部參考治之

寒心痛

卒感惡忤尸症神昏卒倒口噤不省宜藶合香丸方見氣門○備急丸方見救急○與中惡同

治入門

風心痛

因傷風冷或肝邪乘心兩脇引痛宜

麻黃桂枝湯或分心氣飲○方見氣門

悸心痛

因七情怔忡驚悸以致心痛宜四七湯味四七湯枳朮七氣湯正氣天香湯散○並見氣門加

食心痛

○心傷者勞役則頭面赤下重心中痛而自煩發熱臍上跳其脉弦宜辰砂妙香散方見神門因食生冷或食物過多以致心痛宜香薷散方見傷寒門平胃散方見五藏香砂養胃湯方見內傷

飲心痛

傷水飲聚痰涎心痛如刺宜芎夏湯方見痰飲五苓散方見寒門水飲流注胃脇痛三花神祐

丸方見神門

冷心痛

寒氣客於背俞之脉則血脉澀血脉澀則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛經內○形寒

飲冷當風取涼或腎邪來心痛則心懸若飢泄利下重宜五積散入門○寒冷心痛宜扶陽助胃湯

桂枝四七湯雞舌香散神效散卻痛

散草豆蔻丸溫胃湯抽刀散二薑丸

扶陽助胃湯

治胃脘當心而痛經日寒氣客於腸胃之間則卒然痛得熱則已此藥主之附

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻益智仁白芍藥酒炒人參甘艸炙官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮

各五分右剉作一貼薑三

片棗二枚水煎服丹心

桂枝四七湯

治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各

七分人參紫蘘葉甘草炙各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服直指

雞舌香散

治心腹冷痛丁香百枚白芍藥酒炒二兩良薑一兩甘艸炙五錢右爲末每取二錢

陳米飲調

下得效

神效散

治一切心脾疼遇冷反作引入背膺痛不可忍服之絕根本香青皮陳皮麥芽枳殼三稜

蓬朮神麴白芍藥白芷肉桂玄胡索破故紙甘草

各七分薑澄茄丁香各二分右剉作一貼入薑五

片棗二枚水

煎服得效

卻痛散

治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢生當歸肉桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分左右剉作一貼入鹽

醋各少許水煎服入門

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩草豆蔻煨白朮各一兩麥芽炒神麴炒

半夏製各五錢乾生薑青皮陳皮各二錢炒鹽五分右末蒸餅和丸某豆大白湯下五七十丸東垣

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃芪各七錢益智仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢縮砂

厚朴人參甘草各二錢右為末每三錢入薑三片水煎服東垣一名益胃散入門

抽刀散

治急心冷痛斑猫七箇胡椒四十九粒右同炒命猫焦碎去之取椒為末熱酒調下丹心

二薑丸

大治心脾冷痛炮乾薑良薑等分為末麴糊和丸梧子大橘皮湯吞下二三十丸綱目

熱心痛

積熱攻心暑毒入心面目赤黃身熱煩燥掌中熱大便秘堅宜連附六一湯金鈴子散莎芎散梔

薑飲甚者大承氣湯方見寒門下之人門○實熱心痛小柴胡湯方見寒門去人參甘草加枳殼梔

子仁赤芍藥各一錢水煎服醫鑒

連附六一湯

治熱鬱胃脘痛甚黃連六錢附子一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎熱服

金鈴子散

治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩右爲末每二錢酒調下痛止與枳朮丸方見內

傷去其餘邪保命

一名玄金散入門

莎芎散

治胃服熱藥熱物致胃脘痛久成痼疹香附子川芎各五錢黃連梔子各二錢半木香乾

薑各一錢半檳榔酒黃芩芒硝各一錢

右爲末每二錢熱薑湯調痛時下入門

梔薑飲

治胃熱作痛山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入生薑汁三匙再煎熱服或入川芎

一錢尤妙入門

去來痛

心痛或作或止久而不愈也。心包絡爲風邪冷熱所來痛故成疹不灰發作有時經久不得

差神仙九氣湯 方見氣門 吞下九痛丸 方見上一

服即止得效。心胃久痛宜用莎芎散 方見上妙

應丸 方見玉門丁香

脾積丸 方見內傷

心痛亦有六

一曰脾心痛二曰胃心痛三曰腎心痛四曰積心痛五曰厥心痛六曰真心痛類聚

脾心痛

者心下急痛也。心痛甚而至於脇下如刀割之痛者已連及於脾藏矣古方名爲脾病者是

也正傳。如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

靈樞。宜用訶子散手拈散 方見上復元通氣散

方見氣門

訶子散

治心脾冷痛不可忍一服見效訶子炮厚朴乾薑炮草果陳皮良薑炮茯苓神麴炒麥芽

炒甘草炙各等分右麴末每三錢水

一盞入鹽一捻候痛時煎服得效

胃心痛

者腹脹而心痛胃脘當心而痛上支兩脇嗝咽不通又發民病胃脘當心而痛上支兩脇嗝咽不通又

厥陰之勝胃脘當心而痛綱目。益木氣被鬱發則太過故民病有土敗木賊之候也夫胃為脾之府陽先於陰故藏未病而府先病也正傳。宜用草豆蔻丸方見上加味枳朮丸清熱解鬱湯清鬱散

加味枳朮丸

治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噎氣吞酸嘔

吐脾疼等證白朮三兩枳實蒼朮猪苓麥芽炒神麴炒半夏各一兩澤瀉赤茯苓川芎黃連東壁土同炒白鰔鯽殼煨各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁土炒青皮蘿蔔子炒乾生薑各五錢陳皮去白侵香附瓜蒌仁厚朴檳榔各三錢木香甘艸各二錢右為末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子大清米飲下百丸正傳

清熱解鬱湯

治心痛即胃脘痛一服立止山梔子炒黑一錢半枳殼川芎香附子各一錢黃

連炒蒼朮各七分陳皮乾薑炒黑甘草炙各五分
右剉作一貼薑三片水煎服戒飲食半日醫鑒

清鬱散

治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔
吐酸水惡心煩悶半夏陳皮白茯苓蒼朮使

香附神麴黃連薑汁炒梔子薑汁炒各一錢川芎
六分乾薑炒黑五分甘草炙三分右剉作一貼入

薑三片水煎服醫鑒

腎心痛

心痛與背相控善癢如從後觸其心偃僕者腎
心痛也靈樞○下重而苦泄寒中名腎心痛類

○腎傳之心病筋脉相引心下急痛病名曰癰內

經○腎之積名曰奔豚自臍下上衝心痛最甚五
苓散方見寒門去白朮倍肉桂服之入門○宜用

神保丸烏沈湯方並見氣門蟠蔥散方見前陰神

聖復

氣湯

神聖復氣湯

治腎元與膀胱經中陽氣不足致胃脇
臍腹牽引冷痛太惡風寒或上熱如火

下寒如水等證預先一日用黃柏黃連生地黃並
酒洗枳殼各三分別用新水浸又取細辛川芎蔓
荊子碎各三分別用新水浸別取羌活柴胡各一
錢藁本甘艸各八分半夏升麻各七分當歸六分
防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子炮各三分
白葵花三朶去心碎右剉作一貼水五大盞同煎
至一盞入黃芪草豆蔻煨各一錢橘紅五分同煎
至一盞乃入煎浸兩藥再煎至一大盞去渣熱服
空心東垣

積心痛

飲食積聚遇食還發名曰積心痛。凡人飲

多因飲食過度氣道窒塞或著氣惱而然急用薑
鹽湯多灌探吐之後服平胃散方見內傷六君子
湯方見痰飲。食積心痛宜用行氣香薷散煮黃
丸方見下見草豆蔻丸方見上加味枳朮丸方見上

行氣香薷散

治內傷生外感風寒又觸七情惱怒
飲食填滯胃腹脹痛紫蘇葉陳皮蒼朮

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一錢
右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服四春

厥心痛

者因內外邪犯心之包絡或他藏之邪犯心之支脉謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又

痛極則發厥也入門。厥心痛者他藏病干之而

痛也邪在心則亦心痛綱目。寒厥心痛者手足

厥逆而通身冷汗出尿清不渴氣微力弱急以木

附湯寒方見溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩躁

其脉洪大可與金鈴子散方見。吐。乍

間乍甚成疹久不灰名曰厥心痛類聚

真心痛

心痛手足青至節名曰真心痛類聚。真心痛

者手足青至節心痛甚朝發夕灰夕發朝灰靈

樞。真心痛者大寒觸犯心君或汚血衝心手足

青過節者朝發夕灰夕發朝灰正傳。心為諸藏

之主不可傷傷之而痛者為真心痛手足青至節

朝發夕灰夕發朝灰不暇復治得效。真心痛者

因內外邪犯心君一。日即从無治法入門

心腹並痛

心腹並痛宜二炒香良散二胡散厚朴湯桂靈散雞舌香散方見上蟠葱散方見前陰五

積散方見寒門備急丸方見救急蘇合香丸方見氣門

二炒香良散

治心腹痛香附子良薑等分各炒為末入鹽少許每一錢米飲調下若同炒則

無效入門

二胡散

治心腹痛玄胡索胡椒等分為末每二錢溫酒調下入門

厚朴湯

治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各二錢赤茯苓乾薑炮甘草炙各一錢右剉水煎服之東垣

桂靈散

治心腹大痛危急者桂心五靈脂良薑炒厚朴製各等分右細末熱醋湯服一錢立止心

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

七情心痛

七情者喜怒憂思悲驚恐蓋喜則氣散怒則氣上憂則氣沈思則氣結悲則氣消驚則氣

亂恐則氣下六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜則氣散所以散六情之鬱能止痛也。○息城司侯聞父歿于賊乃大悲哭哭罷便覺心痛日增不已月餘成塊狀如覆盆大痛不堪百藥無效戴人至學巫者雜以狂言以譱病者至是大笑不忍回面向壁數日心中結硬皆散戴人曰憂則氣結喜則氣散又云喜勝悲內經自有此法入門。宜用加味四七湯方見神門分心氣飲方見氣門

食積胃脘痛

飲食過多以致積滯成胃脘痛先用吐法次用香蘇散方見寒門入生薑葱白烏梅

煎服

得效

○或平胃散

方見內傷

加神麴麥芽山

查肉入門。宜用加味二陳湯方見痰飲加味枳

水丸

方見上

痰飲胃脘痛

胃中若有流飲清痰作痛腹中漉漉有聲及手足寒痛或腰膝背脇抽掣作痛宜用

小胃丹

控涎丹

方並見

三花神祐丸

方見下門芎

夏湯

方見痰飲

加味二陳湯

方見內傷加味枳