

番沙論

張氏醫通內錄出

嘗攷方書從無沙證之名。惟觸犯臭穢。而腹痛嘔逆。世俗以磁器蘸油刮其脊上。隨發紅斑者。謂之曰沙。甚則欲吐不吐。欲瀉不瀉。乾嘔絞痛者。曰絞腸沙。近時有感惡毒異氣。而驟發黑沙。俗名番沙。卒然昏倒。腹痛。面色黑脹。不呼。不叫。如不急治。兩三時即斃。有微發寒熱。腹痛麻瞋。嘔惡神昏者。或澌澌汗出。或隱隱發斑。此毒邪熖發於表也。亦有發即瀉利厥逆。腹脹無脉者。此毒邪內伏。不能外發也。所患最暴。多有

不及見斑而殂者。經謂大氣入於藏府。雖不病而卒死是也。初覺先將紙撚點焮頭額。即以蕎麥焙燥。去殼取末三錢。溫湯調服。重者少頃再服。即安。蓋蕎麥能鍊腸胃滓穢。降氣寬胸。而治濁滯。為沙毒之端藥。但服過蕎麥者。後患別病。藥中有綠礬者。切勿犯之。其毒甚面黑者。急於兩膝後委中穴。砭出黑血。以泄毒邪。蓋驟發之病。勿慮其虛。非此急奪。束手待斃。以此病起於漠北。流入中原。故以番沙目之。原夫此病與瘴癘相似。瘴則觸冒山嵐瘴氣。此則觸冒惡毒異

氣與時行疫癘不殊。但時行則沿門闔境傳染。此則一人驟感。死於一日半日之間。不似時行之可以遷延數日也。又此病與傷寒之伏氣相似。伏氣發溫熱毒自裏達表。此則遍身驟感異氣。無分表裏藏府。亦不似中寒。喝暑。本虛不勝寒暑之暴也。又此病與揮霍撩亂相似。霍亂是客邪與水穀之氣相併。此則正氣暴逆。不能與邪相亢也。又此病與關格相似。關格是上下不通。病純屬裏。此則兼有斑沙表證也。大畧與臭毒相類。然臭毒所觸穢氣。此則觸冒惡毒較之。

疫癘尤劇。初起昏憤不省。脉多沉匿不顯。或渾渾不
清。勿以腹痛足冷而與溫藥。倘蕎麥一時難得。或服
之不應。即宜理氣為先。如香蘇散。加薄荷荊芥辛涼
透表。次則辟邪為要。梔子豉湯。加牛蒡生甘草解毒
安中。表熱勢甚。清熱為急。黃芩湯。加連翹木通。分利
陰陽。如見煩擾腹脹。脉來數疾。急投涼膈散。如局方
以竹葉易生薑。則毒從下奪。熱劇神昏。雖合三黃。多
不可救。煩渴引飲。遺尿速清。陽明白虎湯。加葱豉。使
毒從表化。以上諸法。然未經誤藥。庶可挽回一二。若

病家疑信未真。慎毋輕治。脫或變生反掌。取咎未便。
曾見一商。初到吳會。暢飲酣歌。席間霎時不安。索生
薑湯一啜而逝。又有朔客到楓。覓混澡浴。忽然眩暈。
嘔逆。到舟即斃。繼有醫者。飯後寒熱腹痛。手足逆冷。
不終夕而告殂。更有文學鄉居。到郡作弔。歸即腹痛。
坐立不寧。語言不次。然見客猶能勉力作揖。診之六
脈模糊。是夜即便捐館。邇來卒患腹痛死者。比比皆
然。雖無斑現。靡不謂之番沙。近有年少新婚。陡然腹
痛麻瞶。或令飲火酒半甌。而腹痛轉劇。旋增顱脹。身

發紅點與蘆根汁得吐。廼解。復有鼻衄。口燥。胸腹畧見紅斑。啜童子小便。稍安。醫與葱白香豉濃煎。仍入童便。續續與之。得大吐。汗出而痊。若斑點深赤。毒在血分者。濃煎茺蔚。少投生蜜。放溫。恣服。取效最捷。以其專下惡血也。或加生菜菹汁半杯。總取散血之功。且有誤認傷寒。而與發散。周身焮紫如雲而死者。亦有誤認麻疹。而與檉柳櫻桃核湯。咽痛失音而死者。況有停食感冒。誤認番沙。而與寒涼解毒。反減去衣被。不慎風寒。煩熱躁擾而死者。以其卒犯惡毒異氣。

無以脉診故辨治尤難。是以近世多用火焮砭刺之法。須知因感惡毒異氣而致者。此屬外因。火焮為當。因觸臭毒穢氣而致者。屬不內外因。非砭刺不足以奪其勢。然刺之無血不可救也。

新安張承恩堂刊

痧證彙要卷四

太倉孫

珖鶴隱編輯

青浦何其偉書田校閱

備用要方

防風散痧湯 治痧有因於風者

防風

陳皮

細辛

銀花

荊芥

枳殼 各等分

頭面腫

加薄荷
甘菊

腹脹

加大腹皮
厚朴

手足腫

加歲靈仙
倍銀花

內熱

加連翹
知母

痰多

加貝母
瓜蒌仁

寒熱

加柴胡
獨活

吐不止 加童便

血滯 加茜草 丹參

食積腹痛 加山查 葛子

面黑 血瘀也加 蘇木 紅花

赤白痢 加檳榔

放痧不出 信細辛 蘇木 挑仁 荊芥

水二鍾煎七分稍冷服

荊芥湯 治痧有鬱氣不通者

荊芥 防風 各一錢 川芎 三分 陳皮

青皮 連翹 各八分

小腹脹痛 加青皮

咽喉腫 加山荳根 射干

心痛 加延胡索 蓬朮

口渴 加花粉

穢觸 加藿香 薄荷

食不消

加山查
葛子

有積

加枳柳

血壅

加桃仁
紅花

鬱悶不舒

加細辛

大便不通

加枳實
大黃

小便不通

加木通
澤瀉

咳嗽

加桑皮
兜鈴

煎服同上

陳皮厚朴湯

治痧有因於氣阻者

陳皮

紫朴

山查

烏藥

心煩熱

去川芎
黑山梔

痰多

加貝母
白芥子

氣壅

加烏藥
香附

食積

加山稜
蓬朮

暑熱

加香薷
紫朴

喉痛

去川芎
射干
大力子
薄荷

青皮分等

痰多

加白芥子

痧筋不現

加細辛

血瘀

加元胡索
香附桃仁

頭汗

加枳實
大黃

口渴

加薄荷
花粉

煎服同上

稜朮湯

治痧因食積者

山稜

藟子

蓬朮

青皮

烏藥

檳榔

枳實

各一錢

煎服同上

藿香湯

治痧因穢氣者

藿香

香附

各四分

薄荷

七分

枳殼

山查

連翹

各一錢

煎同上冷服

薄荷湯

治痧因於暑者

薄荷

香薷

連翹

各一錢

紫朴

銀花

木通

各七分

煎服同上

紫蘇厚朴湯

治痧有暑脹不已者

紫蘇

香薷

紫朴

枳殼

紅花

青皮

陳皮

蔔子

山查等分

煎服同上

防風勝金湯

治痧因於食積血滯者

防風

烏藥

桔梗

枳殼

元胡索各七分

茴子二錢

枳櫚

銀花

山查

連翹

赤芍各一錢

煎同上稍冷服

紫朴湯 治痧有食氣壅盛者

紫朴

山查

茴子

山稜

蓬朮

枳實

連翹

青皮

陳皮

細辛等分

煎服同上

必勝湯 治痧因於血實者

紅花

香附各四分

桃仁去皮

大黃

貝母

山查

赤芍

青皮

五靈脂

各一錢

煎全微溫服

獨活紅花湯

治痧因於血鬱者

獨活

紅花

桃仁去皮

蒲黃

元胡索

白蒺藜

炒為末

烏藥

各一錢

香附

分三

枳殼

分七

煎服同上

射干兜鈴湯

治痧似傷風咳嗽

射干

桑皮

兜鈴

桔梗

薄荷

元參

花粉

貝母

枳殼

甘菊

銀花

等分

煎同稍冷服

嗽甚加童便飲

當歸枳殼湯

此養血和中之劑

歸身

山查

枳殼

紅花

赤芍

青皮

茜草

連翹

丹參

續斷各一錢

煎全微溫服

荊芥銀花湯

此治血滯之劑

荊芥

紅花

茜草

丹皮

銀花

赤芍各一錢

香附三分

烏藥五分

白蒺藜

去刺搗末八分

煎服同上

桃仁紅花湯

此治血結不散之劑

桃仁

去皮共

紅花

蘇木

各一錢

青皮

八分

烏藥

四分

獨活

六分

白蒺藜

去刺搗末

錢二分