

鴻

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘳症

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒打耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃腕胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿痹

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之八

門人黃

樞齋先

陸丞清景拙

上海李惺菴先生著

姪邦俊彦章

男 謨丕文

泄瀉章

誥撰文全較

大意

濕勝則濡瀉

內經

脾土受濕不能滲化致傷闌門元氣

不能分別水穀併入大腸而泄瀉

指掌

泄者大便溏薄

瀉者大便直下略分輕重總屬脾虛

彙補

內因

胃氣和于飲食入胃精氣則輸于脾歸于肺行于百脈而成營衛若飲食起居內外之邪傷于脾胃傳化失節清濁不分上升精華之氣反下降而爲泄瀉矣

杭要

外候

泄分五種如脾泄飲食不和色黃胃泄腹脹注下食則嘔吐大腸泄食已窘迫色白腸鳴切痛小腸泄洩澁便膿血小腹痛大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛

難經

又有飧泄腸垢鴨溏濡泄滑泄之名

泄者濕兼風也故惡風自汗完穀不化腸鳴脈弦腸
垢者濕兼暑也故稠粘垢穢小水赤澁煩渴脈數鴨
漉者濕兼寒也故澄徹清冷儼如鴨糞溺白脈遲濡
泄者濕邪自甚也故瀉多清水腸鳴身重溺短脈沉
滑泄者濕勝氣虛也故所下不禁大孔如竹筒直出
不止又食積泄者瀉下腐臭噫氣作酸也痰泄者或
多或少胸悶瀉沫火泄者暴注下迫焦黃穢臭氣泄
者腹常痞滿去不通泰虛瀉者困倦無力食減微漉
必兼體瘦瀼瀼者停蓄飲食數自一瀉必兼腹脹腎
泄者五更腹痛微響乃泄必兼足冷肝泄者忿怒所

傷厥而面青必兼脇滿交腸瀉者大小便易位而出

直腸瀉者飲食入口少頃卽瀉

彙補

瀉分久暴

暴注下迫食不及化是無水也塘泄日久止發無恒

是無火也

太僕

腹痛分辨

瀉不腹痛者濕也瀉白腹痛者寒也痛一陣瀉一陣
泄復澁滯者火也痛一陣瀉一陣瀉後痛減者食也
腹中脹痛瀉不減者肝氣也腹中絞痛暴瀉煩渴者
霍亂也腹中絞痛下無休時去如蠅渤者氣食交併

也腹中覺冷隱隱微痛下如樹飲者痰也戴氏

寒熱分辨

熱者小便赤澀煩渴肛門熱穀食腐化或雖不化而色變焦黃身能動作手足溫煖寒者小便清白不渴腹中冷完穀不化色亦不變變亦白色身懶動作飲食不下手足清冷河澗

腸鳴分辨

濕多成五瀉腸走若雷奔此寒濕之患然亦有火勢攻衝搏擊水氣而鳴者必兼腹痛暴注下迫肛門澀滯小水色黃非若濕症之腹不痛也葉

完穀分辨

完穀不化其因有四曰氣虛曰胃寒曰胃火曰胃風
夫氣虛胃寒固不能傳化矣火者火性急速傳運失
常卽邪熱不殺穀也至于胃風者肝風傳脾脾受其
尅不能變化名爲殮泄乃五泄之一也

醫統

泄瀉死症

脈細皮寒少氣泄利前後飲食不入是謂五虛者死
其漿粥入胃泄注止則虛者活

素問

脈法

瀉脈自沉沉遲寒侵沉數火熱沉緩濕邪沉虛滑脫

凡泄注沉緩弱小者生浮大弦數者死

彙補

治法

凡瀉皆兼濕初宜分理中焦次則分利下焦繼以風藥燥濕久則升舉元氣滑脫不禁然後澁之其間風勝兼以解表寒勝兼以溫中虛弱補益食積消導濕則淡滲火則清涼痰則湧吐陷則升提隨症而用不

拘次序

彙補

治審虛寔

下積如稠膿者消化爲上去薄而小便短少者利水爲捷若小便如常不必再利惟燥脾而已如兼口渴

則利水與燥脾皆不可用但審溺赤爲有熱如溺短而色不變則補益無疑也

補彙

鬱結當開

憂思太過脾氣結而不能升舉陷入下焦而洩瀉者宜開鬱結使氣升而穀自化

補彙

鬱熱當清

有肺熱閉銅咳嗽胸滿誤服參朮使肺中之熱回奔大腸而瀉者當先清肺金然後和脾

補彙

泄瀉忌用

補虛不可純用甘溫大甘則生濕清熱不可純用苦

寒太苦則傷脾塊澁不可太早恐留滯餘邪淡滲不可太多恐津枯陽陷必讀

用藥

主以茯苓白朮加陳皮半夏濕加猪苓澤瀉火加黃連白芍寒加炮姜益智風加防風蒼朮食加枳實厚朴食積加查肉麥芽氣虛加人參黃芪氣陷加升麻柴胡泄久脾虛飲食難化加參芪神麴麥芽乾姜泄久腸滑加肉蓯訶子木香有夏月暴注水泄用香薷散益元散有腎脾兩虛每朝五更洞瀉用四神丸漿水散有經年脾瀉用桂香丸椒附丸有痰積肺中魄