


临床执业医师 考前冲刺必做

主 编 翟 亮



人民军医出版社

国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书

临床执业助理医师考前冲刺必做

LINCHUANG ZHIYE ZHULI YISHI KAOQIAN CHONGCI BIZUO

主 编 翟 亮

副主编 闫卓红 费 威

编 者 （以姓氏笔画为序）

于运勇	王 丹	王 巍	闫卓红
孙慧慧	李岩冰	李语玲	杨 婧
吴春虎	张 毅	张冬梅	南少奎
侯峰岩	姜小梅	姜明宇	费 威
夏文丽	高雅南	黄丽臻	满高华
翟 亮	潘科聪		



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的7月举行，医学综合笔试于9月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为2天，分4个单元；执业助理医师考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有A₁、A₂、A₃、A₄、B₁五种题型。助理医师适当减少或不采用A₃型题。医师资格考试总题量为600题，助理医师资格考试总题量为300题。

根据卫生部医考办2010年6月公布的数据，截至2009年，全国共有577万人次参加执业医师资格考试，188万人次通过，十年来的总体通过率为32.58%。全国每年参加考试总人数从1999年的不足20万人增加到目前的每年80万人左右，参考人数翻了两番，但目前每年通过考试的人数基本保持在20万人左右，通过率只有不足30%。与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，可见考试难度在逐年加大。

2009年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲(2009年)》。考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考查考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《历年考点精编》系列、《模拟试卷(解析)》系列、《考前冲刺必做》系列，每个系列8本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的4大类8个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试(含部队)的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试(含部队)推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列的突出特点，是在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述串讲考试命题点，重点、易考点一目了然。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有4~5套卷。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列。每个考试专业有3~4套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

本套考试用书对考试知识点的把握非常准确，试题与真实考试最接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

助理医师资格考试试卷一

(医学综合笔试部分)

报考类别: 临床执业助理医师

考试日期: ××××年×月

考试时间:

考生姓名_____

准考证号_____

考场号_____



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

第一单元

A₁型选择题（1~83题）

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 管理本行政区域医师工作的机构是
A. 县级以上人民政府劳动人事部门
B. 县级以上人民政府工商行政部门
C. 县级以上人民政府卫生行政部门
D. 各级医师协会
E. 各级政府
- 因为抢救危急患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应在抢救结束后几小时内据实补记,并加以注明
A. 1 小时
B. 2 小时
C. 3 小时
D. 5 小时
E. 6 小时
- 依据《传染病防治法》,我国法定的传染病共有
A. 甲、乙、丙三类 32 种
B. 甲、乙、丙三类 34 种
C. 甲、乙、丙三类 35 种
D. 甲、乙、丙三类 36 种
E. 甲、乙、丙三类 37 种
- 申请输血应由谁填写临床输血申请书
A. 主治医师
B. 经治医师
C. 主任医师
D. 住院医师
E. 副主任医师
- 我国母婴保健法的立法宗旨是
A. 保障妇女和儿童的健康,提高人口素质
B. 保障母亲和儿童的健康,提高人口素质
C. 保证优生优育,提高人口素质
D. 保障母亲和婴儿的健康,提高出生人口素质
E. 保障母亲和婴儿的健康,提高人口素质
- 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定,将不符合国家规定标准的血液用于病人的,由县级以上卫生行政部门给予的行政处罚是
A. 警告
B. 罚款
C. 吊销《医疗机构执业许可证》
D. 责令改正
E. 限期整顿
- 为保障公民临床急救用血需要,国家提倡并指导择期手术的病人
A. 率先献血
B. 互助献血
C. 自愿献血
D. 自身储血
E. 同型输血
- 未经医师注册取得执业证书的
A. 可在保健机构从事医师执业活动
B. 可在预防机构从事医师执业活动
C. 可在执业医师指导下从事医师执业活动
D. 不得在医疗机构,可在预防、保健机构,

从事医师执业活动

E. 不得从事医师执业活动

9. 高科技应用在医学中所产生的伦理负效应主要表现为下列现象, 但应除外的是

- A. 诊治依赖高科技手段
- B. 高技术—低情感
- C. 高技术手段集中于“三级医院”中
- D. 滥用高科技手段, 造成看病贵
- E. 医患关系的“物化”趋势

10. 对病人自主与医生做主之间关系的正确理解是

- A. 病人自主与医生做主是对立的
- B. 病人自主与医生做主不是对立的
- C. 强调病人自主, 也充分看到医生做主的存在价值
- D. 强调医生决定, 兼顾病人自主
- E. 强调病人自主, 目的在于减轻医生的责任

11. 食物中毒与其他急性疾病最本质的区别是

- A. 病人曾进食同一批某种食物
- B. 很多人同时发病
- C. 以急性胃肠道症状为主
- D. 潜伏期短
- E. 发病场所集中

12. 医患之间的道德关系是

- A. 主从关系
- B. 商品关系
- C. 信托关系
- D. 陌生关系
- E. 私人关系

13. 人类能创造出“猪八戒”这一并不客观存在的文学形象, 恰好说明了

- A. 心理是脑的功能
- B. 心理是对客观现实的反映
- C. 心理是极其复杂的

D. 心理是对客观现实主观能动的反映

E. 动物也有心理现象

14. 通过交谈或问卷的方法了解一些人对某一事件的感受、态度和行为, 在医学心理学的研究方法中属于

- A. 调查法
- B. 临床观察法
- C. 个案法
- D. 实验法
- E. 心理测验法

15. 最能反映血液中红细胞和血浆相对数量变化的是

- A. 血液黏滞性
- B. 血细胞比容
- C. 血浆渗透压
- D. 血液比重
- E. 血红蛋白量

16. 神经-骨骼肌接头处的化学递质是

- A. 乙酰胆碱
- B. 去甲肾上腺素
- C. 肾上腺素
- D. 5-羟色胺
- E. 神经肽

17. 睾丸间质细胞的主要生理功能是

- A. 营养和支持生殖细胞
- B. 产生精子
- C. 分泌雄激素
- D. 促进精子成熟
- E. 起血-睾屏障作用

18. 以下关于兴奋性的叙述哪项是错误的

- A. 是机体或组织的一个特性
- B. 神经、肌肉的兴奋性最高
- C. 指机体或组织对刺激产生反应的能力
- D. 兴奋性与刺激阈成正变关系
- E. 阈值是衡量组织兴奋的指标

19. 当正常人心率超过 180/min 时, 心排血

量减少的原因主要是以下哪一时相缩短

- A. 心房收缩期
- B. 等容收缩期
- C. 减慢射血相
- D. 快速充盈相
- E. 减慢充盈相

20. 关于糖皮质激素的作用, 下列哪项是错误的

- A. 促进全身各部位的脂肪分解
- B. 促进肝外组织蛋白分解
- C. 促进糖异生
- D. 促进肾保钠、保水
- E. 减少外周组织对葡萄糖的利用

21. 不能透过肾小球滤过膜的是

- A. 钠离子
- B. 氨基酸
- C. 甘露醇
- D. 葡萄糖
- E. 血浆白蛋白

22. 突触后膜对哪些离子通透性增加引起抑制性突触后电位

- A. K^+ 、 Cl^- , 尤其是 K^+
- B. Na^+ 、 Cl^- , 尤其是 Na^+
- C. K^+ 、 Cl^- , 尤其是 Cl^-
- D. Ca^{2+} 、 Cl^- , 尤其是 Ca^{2+}
- E. Na^+ 、 Cl^- , 尤其是 Cl^-

23. 兴奋性突触后电位是指突触后膜出现

- A. 极化
- B. 去极化
- C. 超极化
- D. 反极化
- E. 复极化

24. 形成血浆胶体渗透压的主要物质是

- A. NaCl
- B. 白蛋白
- C. 球蛋白

D. 纤维蛋白

E. 血红蛋白

25. 调节胰液分泌的神经体液因素不包括

- A. 迷走神经兴奋
- B. 促胃液素
- C. 促胰液素
- D. 支配胰的内脏大神经
- E. 血管活性肠肽

26. 有关胸内压的叙述, 错误的是

- A. 一般情况下是负压
- B. 胸内压 = 肺内压 - 肺回缩力
- C. 胸内负压有利于静脉回流
- D. 使肺维持一定的扩张程度
- E. 产生气胸时负压增大

27. 突触前抑制的特点是

- A. 突触前膜超极化
- B. 潜伏期长, 持续时间长
- C. 突触前轴突末梢释放抑制性递质
- D. 突触后膜的兴奋性降低
- E. 通过轴突-树突突触结构的活动来实现

28. 药物产生副作用的药理学基础是

- A. 药物的安全范围小
- B. 用药剂量过大
- C. 作用的选择性低
- D. 病人的肝肾功能差
- E. 病人对药物过敏

29. 选择性低的药物, 在治疗量时往往呈现

- A. 毒性较大
- B. 副作用较多
- C. 过敏反应较剧
- D. 容易成瘾
- E. 毒性较小

30. 阿托品用于麻醉前给药主要是因为

- A. 抑制呼吸道腺体分泌
- B. 抑制排尿
- C. 抑制排便

- D. 防止心动过缓
E. 镇静
31. 吗啡禁用于
A. 慢性消耗性腹泻
B. 脑肿瘤引起的疼痛
C. 烧伤疼痛
D. 骨折所致的疼痛
E. 心源性哮喘
32. 去甲肾上腺素外漏可选用下列哪种药物
A. 酚妥拉明
B. 氯丙嗪
C. 可托品
D. 肾上腺素
E. 多巴胺
33. 吗啡的适应证是
A. 肺源性心脏病
B. 支气管哮喘
C. 心源性哮喘
D. 分娩镇痛
E. 颅脑损伤所致颅内高压
34. 治疗十二指肠溃疡应选哪种药物
A. 阿托品
B. 泼尼松（强的松）
C. 雷尼替丁
D. 苯海拉明
E. 异丙嗪
35. 可引起股骨头无菌性坏死的药物中最常见的是
A. 氯喹
B. 雷公藤
C. 甲氨蝶呤
D. 糖皮质激素
E. 长春新碱
36. 下列可引起听神经损害的药物是
A. 环丙沙星
B. 头孢唑啉
C. 甲硝唑
D. 阿米卡星
E. 红霉素
37. 有关钠泵的叙述，错误的是
A. 细胞膜上的镶嵌蛋白质
B. 具有 ATP 酶的活性
C. 逆浓度梯度或电位传递梯度
D. 当细胞外钠离子浓度增多时被激活
E. 当细胞外钾离子浓度增多时被激活
38. 通常所说的 ABO 血型是指
A. 红细胞膜上受体的类型
B. 血浆中凝集原的类型
C. 血浆中凝集素的类型
D. 红细胞膜上特异性凝集素的类型
E. 红细胞膜上特异性凝集原的类型
39. 下列有关肺泡表面活性物质生理作用的叙述，哪一项是错误的
A. 降低肺泡表面张力
B. 稳定肺泡内压
C. 维持肺泡于适当的扩张状态
D. 维持肺的回缩力
E. 阻止血管内水分滤入肺泡
40. 吸收胆盐、维生素 B₁₂ 的主要部位是
A. 十二指肠
B. 空肠
C. 结肠升段
D. 结肠降段
E. 回肠
41. 糖皮质激素类药物不具有的作用是
A. 抗炎
B. 抗菌
C. 兴奋中枢
D. 免疫抑制
E. 抗休克
42. 下列关于条件反射说法正确的是
A. 先天遗传而获得

- B. 后天训练而建立
C. 种族共有的反射
D. 一种初级的神经活动
E. 反射弧固定不变
43. 肺换气时气体通过的部位是
A. 支气管
B. 细支气管
C. 肺泡壁
D. 肺泡小管
E. 呼吸膜
44. 心排血量是指
A. 每分钟由一侧心室所射出的血量
B. 每分钟由左右心室所射出的血量
C. 每分钟由心房所射出的血量
D. 心脏每搏动一次, 由一侧心室所射出的血量
E. 心脏每搏动一次, 由左右心室所射出的血量
45. 关于弥漫硬化性肾小球肾炎的论述下列哪项是错误的
A. 是各种类型的肾小球肾炎经久不愈发展的结果
B. 肾盂周围脂肪组织增多
C. 常继发贫血和高血压
D. 尿中含大量蛋白质, 因而比重较高
E. 肾小动脉硬化很明显
46. 影响神经纤维动作电位幅度的主要因素是
A. 刺激强度
B. 刺激持续时间
C. 阈电位水平
D. 细胞内外 Na^+ 浓度
E. 神经纤维直径
47. 下列哪一种疾病的病变最易发生血管壁的玻璃样变性
A. 溃疡底部的瘢痕组织
B. 纤维素性胸膜炎
C. 结缔组织来源的肿瘤
D. 乳腺硬癌
E. 高血压病
48. 最易发生出血性梗死的部位是
A. 脾、肾
B. 心、脑
C. 肾、肺
D. 心、肾
E. 肺、肠
49. 下述关于肺淤血的描述中, 哪一项是错误的
A. 肺泡腔内有水肿液
B. 常可见“心力衰竭细胞”
C. 可发生漏出性出血
D. 肺泡壁毛细血管扩张充血
E. 肺泡腔内中性粒细胞和纤维素渗出
50. 急性病毒性肝炎(普通型)的病变特点是肝细胞
A. 广泛坏死, 变性轻微
B. 广泛变性, 坏死轻微
C. 广泛再生, 变性较轻
D. 广泛坏死, 再生较轻
E. 变形、坏死、再生均广泛
51. 不属于继发性肺结核临床病理特征的是
A. 病变多从肺尖开始
B. 主要沿支气管播散
C. 病程较长, 渗出、增生、坏死病变并存
D. 肺门淋巴结显著肿大
E. 多见于成人
52. 下列哪种细胞不是由吞噬细胞演变而来
A. 类上皮细胞
B. 泡沫细胞
C. 心衰细胞
D. 浆细胞
E. 格子细胞

53. 哮喘中度急性发作期的治疗是
- A. 间断吸入短效 β_2 受体激动药
 - B. 规则口服长效 β_2 受体激动药
 - C. 持续吸入短效 β_2 受体激动药
 - D. 持续雾化吸入短效 β_2 受体激动药
 - E. 按需吸入长效 β_2 受体激动药
54. 贫血伴黄疸最可能的诊断是
- A. 溶血性贫血
 - B. 急性失血性贫血
 - C. 缺铁性贫血
 - D. 再生障碍性贫血
 - E. 营养不良性贫血
55. 特发性血小板减少性紫癜治疗首选
- A. 长春新碱静脉滴注
 - B. 脾切除
 - C. 输浓缩血小板
 - D. 静脉注射大剂量丙种球蛋白
 - E. 肾上腺糖皮质激素
56. 慢性支气管炎急性发作期治疗最主要的措施是
- A. 镇咳祛痰
 - B. 控制感染
 - C. 解痉平喘
 - D. 菌苗注射
 - E. 吸氧补液
57. 重症哮喘时最多见的酸碱失衡是
- A. 呼吸性碱中毒
 - B. 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
 - C. 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
 - D. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
 - E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
58. 不符合急性胰腺炎腹痛特点的是
- A. 腹痛多位于上腹中部
 - B. 可向腰背呈带状分布
 - C. 常在饱食、脂餐或大量饮酒后发生
 - D. 腹痛剧烈时，一般解痉药不能缓解
 - E. 呕吐后腹痛可减轻
59. 关于克雷伯杆菌肺炎的胸部 X 线征象，下列各项中错误的是
- A. 可见大叶实变
 - B. 可见小叶实变
 - C. 阴影密度较肺炎球菌肺炎深
 - D. 不易形成肺脓肿
 - E. 叶间裂呈弧形下坠
60. 关于心肌梗死合并心脏破裂，下列哪项不恰当
- A. 常发生在心肌梗死后 1~2 周
 - B. 是常见死因之一
 - C. 引起急性心包腔血液填塞
 - D. 左室乳头肌断裂导致急性二尖瓣狭窄
 - E. 室间隔破裂导致急性右心衰竭
61. 结核性渗出性胸膜炎，胸腔穿刺抽液时，下列哪项是错误的
- A. 严格无菌操作
 - B. 抽液不宜过快、过多
 - C. 每周可以 3 次
 - D. 穿刺发生“胸膜反应”不影响继续抽液
 - E. 抽液后胸腔内可以不用药
62. 关于艾滋病的传染途径，错误的是
- A. 传染源为艾滋病病人及人类免疫缺陷病毒携带者
 - B. 主要是血液和精液传播
 - C. 通过性接触传染
 - D. 通过输血及血制品传染
 - E. 不存在围生期传播
63. 使用环磷酰胺治疗系统性红斑狼疮的指征是
- A. 口腔溃疡
 - B. 关节炎
 - C. 肾炎
 - D. 浆膜炎
 - E. 蝶形红斑

64. 关于手术后病人早期活动的优点, 下列哪项说法不恰当
- A. 减少肺部并发症
 - B. 减少下肢静脉血栓形成
 - C. 有利于减少腹胀
 - D. 有利于减少尿潴留
 - E. 有利于减少切口感染
65. 低钾血症错误的临床表现是
- A. 肌无力为最早的临床表现
 - B. 均有典型的心电图改变
 - C. 常与镁缺乏同时存在
 - D. 严重时可发生多尿
 - E. 发生碱中毒时尿液呈酸性
66. 脑栓塞的临床表现不正确的是
- A. 病人较年轻
 - B. 多有风湿性心瓣膜病史
 - C. 起病急骤
 - D. 多有脑膜刺激征
 - E. 可有偏瘫、失语
67. 下列不是类风湿关节炎的关节表现是
- A. 晨僵
 - B. 痛与压痛
 - C. 关节肿
 - D. 骨擦音
 - E. 关节畸形
68. 希恩综合征的主要原因是
- A. 垂体脓肿
 - B. 下丘脑肿瘤
 - C. 垂体柄受压
 - D. 垂体腺瘤
 - E. 产后大出血
69. 抗甲状腺药物丙基硫氧嘧啶、甲疏咪唑最严重的不良反应是
- A. 永久性甲状腺功能减退
 - B. 药疹
 - C. 胃肠道反应
 - D. 粒细胞缺乏
 - E. 肝功能损害
70. 糖尿病最常见的神经病变是
- A. 周围神经炎
 - B. 动眼神经麻痹
 - C. 坐骨神经痛
 - D. 自主神经病变
 - E. 腕管综合征
71. 易引起严重低血糖这一不良反应的口服降血糖药物是
- A. 双胍类口服降糖药
 - B. 磺脲类口服降糖药
 - C. α 葡萄糖苷酶抑制剂
 - D. 胰岛素增敏剂
 - E. 胰岛 B 细胞保护剂
72. 大叶性肺炎的主要病理学特点是
- A. 肺泡内出血
 - B. 肺实质变
 - C. 肺组织广泛炎症并破坏
 - D. 并发支气管扩张
 - E. 肺泡腔内纤维素渗出
73. 诊断颅底骨折通常依据是
- A. 头颅 X 线摄片
 - B. 受伤机制
 - C. 剧烈头痛伴呕吐
 - D. 临床体征
 - E. 意识障碍
74. 检查继发性癫痫病因最有效的方法之一是
- A. 分析癫痫临床发作类型
 - B. 脑 MRI 检查
 - C. 24h 脑电图监测
 - D. 各种诱发脑电图
 - E. 经颅超声多普勒
75. 肾病综合征饮食治疗要保证
- A. 高蛋白低盐饮食, 给予蛋白量 1.0~1.5g/

(kg·d)

- B. 蛋白质 1.5~2.0g/(kg·d), 盐 3~5g/d
- C. 正常量优质蛋白 0.8~1.0g/(kg·d), 保证热量 30~35kcal/(kg·d), 盐 <3g/d
- D. 蛋白质以植物蛋白为主
- E. 低蛋白饮食 0.6~0.8g/(kg·d)

76. 胰头癌最主要的症状是

- A. 腹痛, 腹部不适
- B. 消瘦乏力
- C. 黄疸
- D. 消化不良、恶心、呕吐、厌食、腹泻
- E. 呕血、黑便

77. 前列腺增生所致急性尿潴留时, 最常用的方法是

- A. 服利尿药
- B. 中药、针灸
- C. 导尿
- D. 耻骨上膀胱穿刺
- E. 耻骨上膀胱造口术

78. 触觉语颤增强主要见于

- A. 肺泡内含气量增多
- B. 支气管阻塞
- C. 胸腔积液或气胸
- D. 肺泡内炎症性浸润
- E. 胸膜增厚粘连

79. 房室延搁一般发生于

- A. 兴奋由窦房结传至心房肌时
- B. 兴奋在心房肌内传导时

- C. 兴奋在房室交界区传导时
- D. 兴奋由房室束传至左右束支时
- E. 兴奋由浦肯野纤维传至心室肌时

80. 有关突触传递特征的描述, 错误的是

- A. 单向传递
- B. 突触延搁
- C. 总和
- D. 不易疲劳
- E. 后发放

81. 氯丙嗪在临床上不用于

- A. 甲状腺危象的辅助治疗
- B. 精神分裂症或躁狂症
- C. 晕动病引起的呕吐
- D. 加强镇痛药的作用
- E. 人工冬眠疗法

82. 对眼猪囊尾蚴病病人首选的治疗是

- A. 阿苯达唑
- B. 吡喹酮
- C. 氯喹
- D. 伯氨喹
- E. 手术

83. 氨茶碱治疗心源性哮喘的主要机制是

- A. 降低血压
- B. 强心、利尿
- C. 扩张支气管
- D. 扩张外周血管
- E. 兴奋中枢

A₂型选择题 (84~111 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

84. 当病人对医生所实施的诊治手段有质疑时, 医生必须详细地向病人说明、解释, 在

病人愿意时才能进行, 这属于病人的

- A. 平等医疗权

- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 社会责任权
- E. 保护隐私权

85. 某医院年终对全院职工的基本情况作调查了解, 其中有以下情况: 死亡 1 人, 医生甲因病休息 1 年多, 医生乙因医院效益不好也在家闲了不满 2 年, 医生丙出去参与经营未从事医疗 2 年多, 医生丁承包医院的第 2 门诊近 3 年, 其余大多数仍在医院坚持工作。依据执业医师法, 下列人员中, 属于应当注销注册, 收回医师执业证书的是

- A. 医生甲
- B. 医生乙
- C. 医生丙
- D. 医生丁
- E. 坚持在医院工作的医生

86. 某公共卫生医师在取得医师资格证书和执业许可证后的 1 年里, 擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断, 虽经卫生行政部门制止, 仍不改正, 并又施行终止妊娠手术。依据《母婴保健法》规定, 应对其给予的行政处罚是

- A. 处以罚款
- B. 没收违法所得
- C. 没收非法财物
- D. 吊销执业许可证
- E. 行政拘留

87. 患儿, 因发热 3d 到县医院就诊, 门诊接诊医生检查后发现患儿的颊黏膜上有考氏斑, 拟诊断为麻疹。接诊医生随嘱患儿的家长带其去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定, 该接诊医生应当

- A. 请上级医生会诊, 确诊后再转院
- B. 请上级医生会诊, 确诊后隔离治疗
- C. 向医院领导报告, 确诊后由防疫部门进行转送隔离

- D. 向医院领导报告, 确诊后对患儿就地隔离
- E. 在规定时间内, 向当地防疫机构报告

88. 一位性病患者刚刚离去, 就有人询问医生该患者得了什么病, 医生告之是性病。病人的哪项权利受到了侵犯

- A. 享受医疗服务
- B. 免除健康时的责任
- C. 保守个人秘密
- D. 及时就医
- E. 病人的经济利益

89. 14 岁女性, 中学生, 外出旅游, 夜间到室外上厕所时突感紧张恐惧, 跑步回居室途中, 不慎跌倒, 双手着地。站立起来时发现双目失明。最可能的诊断是

- A. 恐怖性神经症
- B. 焦虑性神经症
- C. 疑病性神经症
- D. 癔症
- E. 双目外伤失明

90. 女性, 55 岁, 10 年来因丈夫有外遇, 夫妻感情不佳, 总想离婚, 但又舍不得孩子, 怕丢面子。来到心理咨询门诊, 想问心理咨询师, 离婚好还是不离婚好, 此时心理咨询师最应注意采用的原则是

- A. 回避原则
- B. 中立原则
- C. 耐心原则
- D. 综合原则
- E. 灵活原则

91. 24 岁男性, 近 3 个月乏力, 面色苍白。近 1 周来反复鼻出血。查体: 贫血面容, 肝脾未触及。血红蛋白 70g/L, 白细胞 $3.5 \times 10^9/L$, 血小板 $25 \times 10^9/L$, 骨髓细胞增生低下, 巨核细胞明显减少, 首选治疗应为

- A. 肾上腺糖皮质激素
- B. 雄激素

- C. 碳酸锂
D. 硝酸士的宁
E. 抗胸腺细胞球蛋白
92. 男, 58岁, 平素健康, 近半月来夜间阵发性哮喘发作, 被迫坐位, 气短, 10min后自行缓解, 今晚加重来诊。肥胖, 血压170/110mmHg, 呼吸25/min, 脉搏110/min, 两肺底部湿啰音, 无哮鸣音, 初步诊断为
- A. 支气管哮喘
B. 心源性哮喘
C. 喘息性支气管炎
D. 运动性哮喘
E. 以上都不是
93. 男性25岁, 发作性干咳3个月伴夜间胸闷, 无发热、咯血, 双肺未闻及湿啰音。明确诊断首选
- A. 心脏彩超
B. X线胸片
C. 肺功能
D. 心电图
E. 纤维支气管镜
94. 女性, 30岁。低热伴关节肿痛3个月, 轻度贫血, 抗核抗体(+), 抗双链DNA抗体(+), 疑患系统性红斑狼疮, 治疗首选的药物是
- A. 非甾体抗炎药
B. 抗生素
C. 免疫抑制药
D. 糖皮质激素
E. 柳氮磺胺吡啶
95. 男, 40岁, 2个月来发热并右上腹痛。查体: 体温39°C, 肝肋下5cm, 中等硬度, 表面稍不平, 压痛(+). 甲胎蛋白(-)。为明确诊断, 哪项检查最有价值
- A. 白细胞计数及分类
B. 血 γ -谷氨酰转肽酶测定
C. 胸部透视
D. 放射性核素扫描
E. 腹部B型超声检查
96. 男性, 43岁。3年前确诊为Grave's病。间断用甲巯咪唑、中药、针灸治疗1年多。近半年双眼睑红肿、畏光流泪、眼球突出, 诊断为Grave's病甲状腺功能亢进症、浸润性突眼。此病人目前甲状腺功能亢进症的治疗选择是
- A. 抗甲状腺药物
B. 甲状腺次全切除术
C. 核素 ^{131}I
D. 复方碘溶液
E. β 受体阻滞药
97. 男性, 17岁, 患有糖尿病2个月, 有酮症酸中毒病史, 每日进主食量400g, 血糖波动大。身高172cm, 体重46kg。最适宜的治疗是
- A. 控制饮食
B. 加强运动
C. 胰岛素
D. 双胍类降糖药
E. 磺脲类降糖药
98. 男, 25岁, 双下肢乏力伴尿潴留10d就诊。查体: 双下肢肌力3级, 脐以下感觉缺失, 最可能诊断是
- A. 急性脊髓炎
B. 周期性麻痹
C. 吉兰-巴雷综合征
D. 亚急性联合变性
E. 脊髓压迫症
99. 女, 50岁。脐周痛12h, 扩散至全腹痛2h, 右侧腹部压痛, 反跳痛, 腹肌紧张, 以右下腹为著, 结肠充气试验(+) 白细胞数 $26 \times 10^9/\text{L}$, 应考虑
- A. 急性胰腺炎
B. 急性胆囊炎
C. 右输尿管结石

- D. 右输卵管妊娠破裂
E. 急性阑尾炎，穿孔

100. 男性，45岁，腹胀、呕吐已半年，多于午后发作，呕吐物为隔夜食物，且量较大，吐后舒服，由于长期呕吐除脱水外还会造成

- A. 低氯、高钾性碱中毒
B. 低氯、低钾性碱中毒
C. 低氯、高钾性酸中毒
D. 低氯、低钾性酸中毒
E. 低钾性酸中毒

101. 男性，55岁，进食后有胸骨后烧灼感3周。上消化道钡剂造影检查见：食管中段黏膜紊乱、中断，管壁僵硬，管腔狭窄，长约3cm，此时首先考虑的诊断是

- A. 食管裂孔疝
B. 食管囊肿
C. 食管癌
D. 食管平滑肌瘤
E. 食管憩室

102. 男性，40岁，乙型肝炎病史10年。2年前拟诊肝硬化，1周来出现腹胀及巩膜黄染，腹水检查为血性渗出液。对于明确诊断下列哪项最为重要

- A. 尿胆红素及尿胆原检查
B. 肝功能检查
C. 肝B超检查
D. 血AFP检查
E. 肝活检

103. 女性，42岁，咳嗽，胸闷，气短4个月，胸片左肺上叶前段反复出现片状阴影，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，痰结核菌涂片3次（-），经用青霉素治疗病情好转，但肺部阴影消散不完全，为确定诊断最重要的检查是

- A. 痰化脓菌培养及药物敏感试验
B. 继续查痰结核菌
C. 胸部CT检查
D. 纤维支气管镜检查

- E. 结核菌素试验

104. 28岁女性，近1年内月经量多，近10d来经常鼻出血，脾肋下未及。血红蛋白 $90g/L$ ，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ 。骨髓检查：粒红细胞系增生旺盛，巨核细胞增多，伴成熟障碍。应诊断为

- A. 特发性血小板减少性紫癜
B. 血友病
C. 过敏性紫癜
D. 弥散性血管内凝血
E. 血小板增多

105. 女性，18岁，患上呼吸道感染1周后，感心悸、气短、乏力。心率98/min，心电图示P-R间期为0.22s，应诊断为

- A. 窦性心动过速
B. 窦性心律不齐
C. 二度I型房室传导阻滞
D. 二度II型房室传导阻滞
E. 一度房室传导阻滞

106. 男，40岁，间歇性上腹痛3年，未予系统治疗，近日出现呕吐，每天呕吐3次，呕吐后自觉舒适，能继续进食，呕吐物有酸臭味。查体：上腹饱满，压之不适，有震水音，诊断考虑为

- A. 消化性溃疡合并幽门梗阻
B. 十二指肠淤滞症
C. 胃癌
D. 急性单纯性胃炎
E. 神经性呕吐

107. 男性，22岁。受寒感冒后心慌气短。端坐呼吸，面色灰白，大汗淋漓，惊恐不安，咳粉红色泡沫样痰。两肺底湿啰音、心率快、脉细数、皮肤湿冷、血压下降、心尖部闻及奔马律及舒张期隆隆样杂音，其原因为

- A. 急性心肌梗死
B. 急性左心衰竭
C. 心源性休克