



本草求真卷八

第一冊

監生臣葛敬啟訂

臣黃學義字

下血

血為人身之寶。安可言下。然有血瘀之極。積而為塊。溫之徒以增熱。涼之或以增滯。惟取

疎動走泄。苦鹹烈毒之品。以為驅逐。則血自爾不疑。按書所載。破血下血藥類甚衆。要在審症明確。

則於治方不謬。如症兼寒兼熱。內結不解。則宜用

以莪朮桃仁。鬱金母草。以為之破。取其辛以散熱。

苦以降結之意也。瘀氣結甚。則宜用以班蝥乾漆。

以為之降。取其氣味猛烈。得以驟解之意也。寒氣

既除。內結滋甚。則宜用以丹參郁李。沒藥薑黃。三

七紫苑。紫參。貫衆。以為之下。取其苦以善降。不令

內滯之意也。寒氣既除。瘀滯不化。則宜用以蒲黃。

蘇木。以為之疎。取其氣味宜泄。不令鬱滯之意也。

至有借食人血以治血。則有蟲虫水蛭可用。借其
鹹味引血下走。則有茜草血蝎瓦楞紫貝蠱虫驚
甲可取。借其質輕靈活不滯。則有蓮藕花葶石可
投。借其陰氣偏佈可解。則有螳螂蛇蛻可啖。借其
酸。滴鹹臭以解。則有皂礬五靈脂可入。惟有苦溫
而破。則又更有劉寄奴等味。但劉寄奴自然銅古
文錢三七血蝎沒藥廬虫。則於跌仆損傷而用。蚯
蚓則於解毒而用。丹參則於血瘀神志不安而用。
水蛭蟲虫桃仁則於蓄血而用。花蕊石則於金瘡
血出而用。五靈脂益母草蒲黃則於婦人血滯而
用。茜草則於婦人經閉不解而用。瓦楞子則為婦
人塊積而用。斑蝥則為惡瘡惡毒而用。鬱金則為
血瘀胞絡痰氣積聚而用。莪朮則為血瘀積痛不
解而用。郁李仁則為下氣行水破血而用。乾漆則
為鏟除老血蠱積而用。紫貝則為血蠱水積而用。
貫衆則為時行不正而用。鱉甲則為勞熱骨蒸而
用。紫參則為血痢癰腫而用。葶黃則為脾中血滯
而用。蘇木則為表裡風起而用。皂礬則為收痰殺

蠱除濕而用。生藕則為通調津液而用也。至於斑
蝥乾漆三七水蛭蠱虫麤虫螃蟹瓦楞子花蕊石
尤為諸劑中下血敗血之最。用之須當審顧
不可稍有忽畧以致損人元氣於不測中也。

三七

言三
山草

三七

端入肝胃兼入心大腸又名山漆時
珍曰或云能合金瘡如漆粘物也

甘苦微

寒而溫。世人僅知功能止血住痛。殊不知痛因血
瘀。則痛作。血因敷散。則血止。三七氣味苦溫。能於
血分。化其血瘀。試以諸血之中。入以三七。則血旋
化為水矣。此非紅花紫草類也。故凡金刃刀剪所
傷。及跌仆杖瘡。血出不止。嚼爛塗之。或為末。滲其

入陽明厥陰血
分作血
為水

血即止

時珍曰受杖時先服一二錢則血不衝杖後尤宜服之

且以吐血衄

血下血血痢崩漏經水不止產後惡露不下俱宜

自嚼或為末米飲送下即愈并虎咬蛇傷血出可

治與血同此為陽明厥陰血分之藥故能治一切血

病一種庭砌栽植者以苗搗敷腫毒即消亦取散

血之意

一種春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金

絲盤紐可愛而氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根

葉味甘治金瘡跌傷出血及上下血病甚效云是

三七而根大如牛蒡根與南中來者廣產形如人不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍
參者是時珍曰此藥近時出自南人軍中用為金瘡要藥云有奇功有節非研

用良

茜草

三言三蔓草

茜草

揣入心胞肝

味酸鹹寒色赤功用畧有似於紫草

但紫草則止入肝涼血使血自為通活此則能入

肝與心胞使血必為走泄也故凡經閉風痺黃疸

疸有黃疸穀疸酒疸黃汗疸女勞疸皆有寒濕熱

濕之別此則專就蓄血以論大抵寒濕宜用茵陳

附子茵陳四逆熱濕宜用梔子因於瘀血內阻者

大黃血瘀宜用桃仁承氣之類服之固能使瘀下行如值吐崩尿血因於血滯而

見艱澁不快者服之更能逐瘀血止總皆除瘀去

人心胞
肝行血

疸症當知

茜草根

瘀血

血之品。與於紫草血熱則涼之意。貌同實異。不可混也。但血虛發熱者忌用。根可染絳。忌鍊。

紫參

三音八四
山草

紫參

紫參入肝兼入胃
勝胱又名北蒙

味苦而辛。氣寒無毒。功端入

肝。逐瘀破血。兼入胃腑勝胱。使血自為通利。故凡

寒熱血痢。癰腫積塊。心腹積聚。因於血瘀阻滯而

成者。無不可以調治。以其味苦則泄。味辛入肝。寒

則勝熱。而使血從二便出矣。仲景治下痢腹痛。而

用紫參湯以除。亦取散其積血之意。

聖惠方治吐血不止。用紫

參人參阿膠炒等分爲末烏枚湯服一錢一方去
人參加甘草以糯米湯服普濟用五參九治面上
酒刺用紫參丹參人參苦參沙參各
一兩爲末胡桃仁杵和爲丸茶下
但市人罕識
其真用以紫苑爲代雖其寒熱不同而其疎利則
一、反藜蘆古方治婦人腸單病烏啄
丸所用北蒙卽此物也

鬱金 三金
芳草

鬱金 入心 辛苦而平諸書論斷不一有言此屬純

陰其論所治皆屬破氣下血之說有言性溫不寒
其論所治則有療寒除冷之謂究之體輕氣竅其
氣先上行而微下達凡有宿血凝積及有惡血不

堪之物。先於上處而行其氣。若使其邪其氣其痰。

其血在於膈上而難消者。須審宜溫。宜涼。同於他。

味兼為調治之。震亨曰。鬱金屬火。與土其性輕揚。上行治吐血。衄血。唾血。血暈。及經。

脉逆行。並宜鬱金末。加荊汁。薑汁。童尿。同服。其血自清。痰中帶血者。加竹瀝。又鼻血上行者。鬱金荊

汁。加四如敗血衝心。加以薑汁。童便。去心瘋癲。明

礬為丸。硃砂為衣。與受蠱毒。加以升麻之類。方經驗治

失心癰狂。用真鬱金七兩。明礬三兩。為末。薄糊丸。白湯下。又婦人顛狂十年。至人授此。初服。心胸間

有物脫去。神氣洒然。再服而甦。此驚憂痰血絲聚。心竅所致。鬱金入心去惡血。明礬化頑痰。故也。又

范石湖文集云。嶺南有桃生之害。於飲食中行厭。勝法。魚肉能反生於人腹中。而人以死。則陰投其。

家初得覺胸腹痛次日刺人十曰則生在腹中也
凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛即以
米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下若使惡血惡痰

惡痰惡淋惡痔在於下部而難消者俟其辛氣既
散苦氣下行即為疎泄而無鬱滯難留之弊矣此

藥本屬入心散瘀

傷寒論云班痘始有白泡忽搖入腹紫黑無膿用鬱金一兩甘草

草二錢半水半杯煮乾去甘草切片焙研末入冰
片五分每用一錢以生豬血五七滴新汲水下

因瘀去而金得泄故命其名曰鬱金書云此藥純

陰而寒者因性主下而言也有云是藥性溫而言

者因氣味辛香主上而言也各有論說不周以致

理難畫一耳。因為辨論正之。出川廣。圓如蟬肚。外

黃內赤色鮮微香帶甘者真。市人多以薑黃偽充。

莪朮

音六
芳草

莪朮

肝端入

辛苦氣溫。大破肝經氣分之血。蓋人血

氣安和。則氣與血通。血與氣附。一有所偏。非氣盛

而血碍。即血壅而氣滯。三稜氣味苦平。既於肝經

血分逐氣。莪朮氣味辛溫。復於氣分逐血。故凡氣

因血窒。而見積痛不解。吐酸奔豚。痞癖癥瘕等症。

者。須當用此調治。

按之應手為癥。是因傷食所得。假物成形為瘕。是因傷血所得。

瀉肝氣
分之血

痞癖癥

癥瘕症

當分

知積症當

本草求真 卷八下血義米

見於肌膚可見為痞是因積聚所得五積肝積曰肥氣在左脇下形如覆杯有頭有足如龜蟹狀心積曰伏梁起於臍上大如手臂上至心下脾積曰痞氣在胃腕覆大如盤肺積曰息奔在右脇下覆如大杯腎積曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之象或上或下亦無定時經曰大積大聚毒可犯也衰其大半而止過者死故去積須以甘溫調養又曰壯者氣行則已怯者則着而成病潔古云壯人俾氣自無積惟虛人則有之故養正則邪自除

血而順而不致閉結不解矣但蓬朮雖屬磨積之味血積宜用桃仁山甲乾漆大黃蝨虫蓬朮瓦礬子痰積宜用半夏南星白朮枳實礞石硝石風化硝白芥子海石蛤粉水積宜用大戟甘遂薤花芫花酒積宜用乾葛神曲砂仁豆蔻黃連乾薑甘遂牽牛茶積宜用薑黃茱萸椒薑癖積宜用三稜莪朮巴霜大黃肉積宜用山楂阿魏硝石蠱積宜

廣茂

破脾中
氣血下
行

用雄黃、錫灰、栴檀、雷丸、蕪荑、使君、子、鶴虱、瘧積、宜用桃仁、鱉甲、草菓、若虛人服之最

屬可危、須得參朮補助為妙、大者為廣朮、頌曰此物極堅

硬難搗、灰火煨透、乘熱搗之、或醋磨、酒磨、或煮熟用

薑黃 言七
芳草

薑黃 端入 味辛而苦、氣溫色黃、功用頗類鬱金、寒苦

赤色三稜、苦平皮蓬朮、味苦延胡索、辛苦但鬱金、色黑

心專瀉心、包之血、莪朮入肝、治氣中之血、三稜入

肝、治血中之氣、延胡索則於心肝血分行氣、氣分

行血、此則入脾、既治氣中之血、復兼血中之氣耳

綠圃齋

陳藏器曰此藥辛少苦多藏器曰性熱不冷性氣過於鬱

金破血立通下氣最速凡一切結氣積氣癥瘕瘀

血血閉癰疽並皆有效以其氣血兼理耳時珍曰古方五

痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要

訣云片子薑黃能入手臂治痛其兼理血中之氣

知若血虛腹痛臂痛而非瘀血凝滯者用之反劇

蜀川產者色黃質嫩有鬚折之中空有眼切之分

為兩片者為片子薑黃和濟方治胎寒腹痛啼哭吐乳大便色青狀若驚搐

出冷汗薑黃一錢沒藥二錢乳香二錢為末蜜丸
芡子大每服一丸鉤藤湯下經驗方心痛難忍用
薑黃一兩桂三兩為末醋湯服一錢立效廣生者質粗形扁如乾薑僅

片子薑黃

廣薑黃

可染色。不可入藥。服之有損無益。

蒲黃

音父 水草

蒲黃

肝 崙入

味甘氣平。功用無他。但以生用熟用炒

黑。分其治法耳。以生而論。則凡瘀血停滯。腫毒積

塊。跌仆傷損。風腫癰瘡。溺閉不解。服之立能宣泄

解除。時珍曰。一婦舌脹滿口。以蒲黃頻滲。比曉乃

分。搽之愈。觀此則蒲黃之涼血。可知矣。蓋舌為心

苗。心包相火。乃其臣。使得乾薑是陰陽相濟也。失

笑。散用此同五靈。以熟焦黑。則凡吐血。下血。腸風

脂。治血氣滯痛。

宜分內外

血尿。血痢。服之立能止血。然此止屬外因。可建奇

舌腫脹

生用宜
瘀滯
炒用止
血

五參五
臟

功若內傷不足之吐衄則非此所能治者矣

丹參

言九
山草

丹參

端入心包絡兼入肝

味苦色赤性平而降

時珍曰五參五色配五臟

故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎日黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參其苦

參則右腎命門藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義書載能入心包絡破

瘀一語已盡丹參功效矣然有論其可以生新安

胎調經除煩養神定志及一切風痺崩帶癥瘕目

赤疝痛瘡疥腫痛等症時珍曰按婦人明理論云

前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死

破心胞
血瘀安
神志

四物湯
亦有產
煎後
不得妄

用慮醫者勿拘死法可耳

入心胞肝逐瘀

胎止崩中帶下調經脉其功大類當歸地黃芩藥故也總皆由其瘀去以

見病無不除非真能以生新安胎養神定志也凡

妊娠無故大便不實者切忌畏鹽水忌醋反藜蘆

益母草

三百卒濕草

益母草

揣入心胞肝

一名茺蔚辛微苦寒功能入肝心

胞絡消水行血去瘀生新調經解毒為胎前胎後

要劑是以無胎而見血淋血閉血崩帶下血痛下

者因病生於帶脈之意也帶脈橫於腰間凡病人

下白則為白帶屬氣虛宜補中益氣下赤則為赤

帶屬血虛宜養血既胎而見胎漏臨產而見難產

滋陰而兼調氣