


护理学（师）考前冲刺必做

主 编 赵 阳 舒 杨



人民军医出版社

全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书

护理学（师）考前冲刺必做

HULIXUE (SHI) KAOQIAN CHONGCI BIZUO

主 编 赵 阳 舒 杨

副主编 刘延洁 杨兴芳 李穗峰 许慧荣

编 者（以姓氏笔画为序）

王小莉	王婉文	邓海军	叶旭春	叶美英
冯晓瑜	伍艳荷	伦咏桃	刘玉珍	刘延洁
刘秋月	刘露丝	江伟仪	许海燕	李玉丽
李汝霞	李燕霞	李穗峰	杨兴芳	杨秋萍
吴伟霞	吴灵霞	吴舒婷	沈彩燕	张辉燕
陈 洁	陈冬翠	陈丽愉	陈健珊	陈敏艳
林瑞妍	罗桂芳	罗晨玲	周云霞	周彩燕
郑少萍	赵 阳	赵小蓉	胡伟仪	钟敏婷
姚卫光	黄雪琼	曹宝花	梁真玮	梁银冰
梁燕华	屠 燕	彭秀儒	彭珠玲	程凤平
程彩平	储 静	舒 杨	温小红	赖少娟
黎佩莹	黎晓琼	潘 贤		



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学(师)考前冲刺必做 / 赵 阳, 舒 杨主编. — 5 版. — 北京: 人民军医出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5091-7014-4

I. ①护… II. ①赵…②舒… III. ①护理学—护士—资格考试—习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 218483 号

策划编辑: 张 晶 丁 震 文字编辑: 许泽平 黄维佳 责任审读: 王三荣

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927278

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8610

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 三河市春园印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 9.25 字数: 221 千字

版、印次: 2013 年 9 月第 5 版第 1 次印刷

印数: 62001—77000

定价: 28.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

出版说明

全国初中级卫生专业技术资格考试从 2001 年开始正式实施。考试通过后可取得相应的专业技术资格，各用人单位以此作为聘任相应技术职务的必要依据。2003 年，护士执业资格考试与护理学专业初级（士）资格考试并轨。目前，该考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，已经覆盖医、药、护、技 4 个系列近 120 个专业，每年参加考试的人数逾百万。各专业考试的通过率略有不同，一般为 50%~60%。在实际的考试中一般会有 5%左右的超大纲考题，具有一定难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套全国初中级卫生专业技术资格考试辅导用书，共 3 大系列，分别为《应试指导及历年考点串讲》系列、《模拟试卷及解析（纸质版）》系列、《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列，针对护理、药学等考生人数较多的专业，还出版了单科考试辅导、冲刺试卷等图书，共 160 余个品种，覆盖 102 个考试专业。根据全国广大军队和地方考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为全国初中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书。

《全国初中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点、难点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

《应试指导及历年考点串讲》系列共有 12 本，覆盖 36 个考试专业。这个系列的突出特点是分析了历年两千道考试题，串讲历年考点，把握考试命题方向，有针对性地对考点知识进行详尽叙述。

《模拟试卷及解析（纸质版）》系列是针对专业人数较多的 39 个专业出版的，共有 31 个品种。每个专业有 5~6 套卷，2 000~2 400 题。这个系列的突出特点是试题质量非常高，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列共有 100 个品种，对应 100 个考试专业。每个专业有 4 套卷，1 600 题。其突出的特点是专业相当齐全。考虑到部分专业每年考生数量太少，无法出版纸质书和纸质试卷的情况，《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列满足了这些专业考生的特殊需求。同时，针对从 2009 年开始临床医学、全科医学、中医类、计划生育等 65 个专业采用人机对话考试形式的新情况，《模拟试卷及解析（网络学习版）》采用了真实考试的人机对话界面，高度仿真，考生可提前感受与适应考试的真实环境，从而有助于提高考试通过率。同一个专业纸质版与网络学习版试卷中的试题不同，其复习参考价值都非常重要。为了达到互为补充、互为促进的效果，建议两者结合使用。

本套考试用书对知识点的把握非常准，试题与真实考试的符合率非常高，许多考生参加考试之后对本套考试用书的质量给予了高度认可。考生通过考试之后的无比欣喜和对我们出

版工作的由衷感谢、支持，是鼓励我们不断努力把考试产品做得更好的不竭动力。

本次印刷的版本在出版前，我们又组织了各学科的专家对所有试卷进行仔细审读，对一个版本中存在的个别错误进行了修正。但由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如仍有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

护理学初级（师）资格考试

考前冲刺卷一



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 念珠菌性阴道炎的高危人群除外
 - 孕妇
 - 高血压患者
 - 2 型糖尿病患者
 - 雌激素替代疗法的患者
 - 器官移植患者
- 属于妊娠妇女血液循环系统生理改变的是
 - 血浆蛋白含量降低
 - 血沉减慢
 - 红细胞总数减少
 - 妊娠 10 周后血容量增加
 - 处于低凝状态
- 在枕先露分娩机制中，能协助胎先露内旋转的力是
 - 子宫收缩力
 - 腹肌收缩力
 - 肛提肌收缩力
 - 产妇屏气力
 - 膈肌收缩力
- 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内，阴道出血量超过
 - 300ml
 - 600ml
 - 400ml
 - 700ml
 - 500ml
- 子宫内膜异位症最常累及
 - 直肠
 - 子宫直肠陷凹
 - 卵巢
 - 子宫骶骨韧带
 - 膀胱
- 子宫脱垂首位致病因素是
 - 盆地组织松弛
 - 长期重体力劳动
 - 长期便秘
 - 慢性咳嗽
 - 分娩损伤
- 小儿开始学会爬的月龄是
 - 5~6 个月
 - 6~7 个月
 - 7~8 个月
 - 8~9 个月
 - 9~10 个月
- 水痘患儿出皮疹时，其皮肤病变仅限于
 - 表皮
 - 真皮
 - 黏膜层
 - 皮下结缔组织及脂肪组织
 - 肌层
- 婴儿上呼吸道感染早期高热最常见的并发症是
 - 抽搐
 - 中耳炎
 - 结膜炎
 - 肺炎
 - 风湿热

10. 最易发展为结核性脑膜炎的情况是

- A. 肺部粟粒型结核经血行传播
- B. 脑膜结核干酪病变破溃
- C. 结核性胸膜炎
- D. 脑实质结核灶
- E. 干酪性肺炎

11. 6岁以下儿童每日正常尿量是

- A. 800~1 000ml
- B. 600~800ml
- C. 400~600ml
- D. <400ml
- E. <300ml

12. 法洛四联症的病情严重程度取决于

- A. 房间隔缺损
- B. 左心室肥大
- C. 主动脉骑跨
- D. 肺动脉狭窄
- E. 室间隔缺损

13. 按照公式,估算5岁小儿血压正常值是

- A. 120/70mmHg (16/9.3kPa)
- B. 100/70mmHg (13.3/9.3kPa)
- C. 90/60mmHg (12.0/8.0kPa)
- D. 90/50mmHg (12.0/6.7kPa)
- E. 80/50mmHg (10.7/6.7kPa)

14. 绒毛癌最常见的死亡原因是

- A. 阴道转移
- B. 肺转移
- C. 脑转移
- D. 肾转移
- E. 骨转移

15. 容易发生新生儿寒冷损伤综合征的情况应除外

- A. 早产低体重
- B. 新生儿败血症

C. 母乳性黄疸

- D. 新生儿体温过低
- E. 新生儿窒息

16. 细胞外液中的阳离子最主要的是

- A. Na^+
- B. Ca^{2+}
- C. K^+
- D. NH_4^+
- E. Fe^{3+}

17. 人体对水和电解质的调节机制中,最重要的是

- A. 肺调节
- B. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- C. 中央化学感受器
- D. 肾调节
- E. 体液的缓冲系统

18. 关于高渗性脱水的病理特点,叙述正确的是

- A. 体液以失钠为主
- B. 体液以失水为主
- C. 体液以失钾为主
- D. 体液以失镁为主
- E. 体液以失铁为主

19. 血钾升高最常见于

- A. 尿毒症无水肿者
- B. 剧烈呕吐
- C. 长期禁食
- D. 胃肠道引流
- E. 醛固酮增多症

20. 机体发生多系统器官功能障碍时,最易受损的器官是

- A. 肠
- B. 胃
- C. 肾

- D. 心脏
E. 肺
21. 肝素用于 DIC 早期的抗凝血治疗, 在注射前后需测定
- A. 凝血时间
B. 出血时间
C. 血小板计数
D. 红细胞计数
E. 纤维蛋白原含量
22. 护士协助医生进行局部麻醉时, 通常在 100ml 的局部麻醉药中加入 0.1% 肾上腺素的量为
- A. 0.2ml
B. 0.3ml
C. 0.6ml
D. 0.7ml
E. 1ml
23. 最容易引起心脏停搏的心脏疾病是
- A. 病毒性心内膜炎
B. 风湿性心脏病
C. 高血压性心脏病
D. 冠心病
E. 心包炎
24. ICU 基础监护的内容除外
- A. 血氧饱和度
B. 持续心电图监护
C. 出入量
D. 血压
E. 测瞳孔, 每 2 小时 1 次
25. 软组织化脓感染中, 具有接触性传染特点的是
- A. 疖
B. 疔
C. 丹毒
D. 脓肿
E. 急性淋巴管炎
26. 下列损伤类型中, 不属于开放性损伤的是
- A. 裂伤
B. 挫伤
C. 撕脱伤
D. 砍伤
E. 火器伤
27. 对损伤愈合不利的因素是
- A. 营养状况好
B. 伤口血液循环良好
C. 长期使用类固醇激素
D. 无感染
E. 创面边缘整齐
28. 中厚皮片包含的皮肤结构有
- A. 表皮
B. 表皮及部分真皮
C. 表皮及真皮
D. 表皮、真皮及皮下组织
E. 表皮、真皮及少量皮下组织
29. 关于开放性气胸, 说法正确的是
- A. 吸气时伤侧负压进行性下降
B. 伤侧胸膜腔负压变化不大
C. 伤侧胸膜腔负压消失
D. 伤侧胸膜腔内压力大于大气压
E. 纵隔会向伤侧移位
30. 构成腹外疝疝环的结构是
- A. 腹壁薄弱处
B. 壁腹膜
C. 疝囊颈部
D. 进入疝囊的腹内脏器和组织
E. 疝囊外各层组织
31. 最易发生嵌顿的腹外疝是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 股疝
- C. 脐疝
- D. 切口疝
- E. 白线疝

32. 最易发生胃癌的部位是

- A. 胃小弯
- B. 胃大弯
- C. 胃体
- D. 胃窦
- E. 幽门

33. 急性阑尾炎术后最易发生的并发症是

- A. 切口感染
- B. 腹腔感染
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 阑尾残株炎
- E. 盆腔脓肿

34. 急性阑尾炎患者，主诉麦氏点剧痛，其疼痛性质属于

- A. 躯体性疼痛
- B. 牵涉性疼痛
- C. 内脏性疼痛
- D. 神经性疼痛
- E. 中枢性疼痛

35. 最易并发粘连性肠梗阻的是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 脾切除术后
- D. 阑尾切除术后
- E. 先天性肠管发育异常

36. 肝门-腔静脉吻合术的目的是

- A. 减少腹水形成
- B. 降低肝门静脉压力
- C. 消除脾大

- D. 改善肝功能
- E. 减少交通支扩张

37. 关于开放性骨折，不正确的是

- A. 耻骨骨折合并膀胱破裂
- B. 骶尾骨骨折合并直肠破裂
- C. 开放性骨折感染的风险大
- D. 开放性骨折断端外露不宜立即回纳
- E. 骨折处有皮肤擦伤出血，应属开放性骨折

38. 属于不完全性骨折的是

- A. 横断骨折
- B. 凹陷性骨折
- C. 青枝性骨折
- D. 螺旋形骨折
- E. 嵌入性骨折

39. 导致骨折延迟愈合的因素除外

- A. 血浆胆固醇过高
- B. 骨折处血液供应差
- C. 局部固定不良
- D. 患者有糖尿病
- E. 年龄大

40. 呼吸系统疾病最常见的诱发因素是

- A. 吸烟
- B. 大气污染
- C. 感染
- D. 肿瘤
- E. 免疫性疾病

41. 结核病最主要的传播途径与方式是

- A. 饮用未经煮沸消毒的牛奶
- B. 吸入患者排出的带菌飞沫
- C. 皮肤外伤
- D. 用了没有刷洗消毒过的碗筷
- E. 泌尿生殖器外伤

42. 引发慢性风湿性心脏瓣膜病的主要病原

菌是

- A. 真菌
- B. 韦荣球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 流感病毒
- E. 溶血性链球菌

43. 消化性溃疡的主要诱发因素是

- A. 焦虑
- B. 非甾体消炎药
- C. 吸烟
- D. 饮酒
- E. 幽门螺杆菌感染

44. 急性胰腺炎发病的解剖基础是

- A. 胆石症与胆道疾病
- B. 两个器官同属迷走神经支配
- C. 大量饮酒和暴饮暴食
- D. 胰管与胆总管共同通道及开口
- E. Oddi 括约肌存在

45. 肾单位的组成是

- A. 肾小球、肾小体
- B. 肾小体、髓襻
- C. 肾小球、肾小管
- D. 肾小体、肾小管
- E. 皮质、髓质

46. 主要诱发肾盂肾炎的疾病是

- A. 心力衰竭
- B. 肺炎球菌性肺炎
- C. 慢性消耗性疾病
- D. 缺铁性贫血
- E. 糖尿病

47. 急性白血病患者突发高热的主要原因是

- A. 营养不良
- B. 机体代谢亢进
- C. 白细胞浸润

D. 微生物感染

E. 化疗药物的不良反应

48. 慢性肺源性心脏病发病的关键环节是

- A. 肺不张
- B. 肺部感染
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

49. 多见于女性的肺癌类型是

- A. 肺泡细胞癌
- B. 腺泡细胞癌
- C. 小细胞未分化癌
- D. 大细胞未分化癌
- E. 非小细胞癌

50. 不属于 II 型呼吸衰竭主要临床表现的是

- A. 上消化道出血
- B. 右心衰竭
- C. 球结膜水肿
- D. 精神神经症状
- E. 呼吸深快

51. 心绞痛发作最主要的原因是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 全身小动脉痉挛
- D. 冠状动脉狭窄或畸形
- E. 肺动脉痉挛

52. 冠状动脉粥样硬化性心脏病的主要危险因素是

- A. 运动量过少
- B. 饮酒
- C. 高血压
- D. 家族史
- E. 肥胖

53. 急性心肌梗死患者发生休克的主要原因是

- A. 细菌感染
- B. 心律失常
- C. 心脏前负荷加重
- D. 心脏后负荷加重
- E. 左心室排血量下降

54. 引起病毒性心肌炎最常见的病原菌是

- A. 艾柯病毒
- B. 柯萨奇 A 组病毒
- C. 柯萨奇 B 组病毒
- D. 腺病毒
- E. 呼吸道合胞病毒

55. 急性下壁心肌梗死易发生心律失常的类型是

- A. 室上性心动过速
- B. 快速室性心律失常
- C. 心房颤动
- D. 心室颤动
- E. 房室传导阻滞

56. 关于高血压脑病的病理特点正确的是

- A. 脑小动脉严重痉挛致脑水肿
- B. 血液黏稠致脑血栓形成
- C. 脑血管内压高而破裂
- D. 腔隙性脑梗死
- E. 短暂性脑缺血发作

57. 不属于肝性脑病诱发因素的是

- A. 感染
- B. 上消化道出血
- C. 反复放腹水
- D. 高蛋白饮食
- E. 抑制细菌生长

58. 白血病最主要的致死原因是

- A. 高尿酸血症肾病
- B. 化疗毒性反应

C. 内脏出血

- D. 感染发热
- E. 严重贫血

59. 有机磷农药中毒后出现毒蕈碱样症状的原因是

- A. 交感神经兴奋
- B. 乙酰胆碱积聚
- C. 锥体束受损
- D. 阿托品中毒
- E. 农药直接作用

60. 下列因素中与原发性癫痫的发生有关的是

- A. 脑膜炎
- B. 中毒
- C. 高血压
- D. 颅脑外伤
- E. 遗传因素

61. 再生障碍性贫血的发病机制是

- A. 营养缺乏
- B. 骨髓造血功能低下
- C. 失血过多
- D. 严重感染
- E. 溶血导致红细胞破坏增加

62. 急性白血病患者发生贫血的最主要原因是

- A. 骨髓造血受白血病细胞干扰
- B. 脾功能亢进，红细胞破坏过多
- C. 化疗后胃肠功能紊乱，营养不良
- D. 严重皮肤黏膜及器官出血
- E. 产生抗红细胞抗体

63. 急性一氧化碳中毒最先受累的器官是

- A. 心脏
- B. 脑组织
- C. 肺
- D. 胰腺
- E. 眼睛

64. 患者，女性，33岁。育有一子，既往月经正常。近半年经常转换工作地方，发生“闭经”。护士分析其最可能的原因为
- 宫颈炎
 - 卵巢性
 - 垂体性
 - 下丘脑性
 - 子宫内膜异位
65. 患儿，女，9岁。家长诉患儿常出现四肢不自主抖动及挤眉弄眼，持物不稳，但是睡眠时症状消失。查体：体温36.9℃，脉搏118/分，扁桃体二度肿大，心尖部可闻及Ⅱ级收缩期杂音，初步诊断为风湿性心脏病伴舞蹈病。最合适的药物治疗组合是
- 阿司匹林、青霉素
 - 肾上腺皮质激素、镇静药、丙种球蛋白
 - 青霉素、肾上腺皮质激素、镇静药
 - 阿司匹林、肾上腺皮质激素、丙种球蛋白
 - 青霉素、阿司匹林、肾上腺皮质激素、镇静药
66. 产妇，30岁。孕2产0，孕38⁺³周，临产急诊入院。产科检查：宫缩规律，宫口开大10cm，胎心144/分。护士判断该产妇的情况是
- 临产先兆
 - 进入第一产程活跃期
 - 进入第二产程
 - 进入第三产程
 - 进入第一产程潜伏期
67. 孕妇，29岁。第一胎产后未复经，哺乳期妊娠。产科检查：子宫底于脐上1指。护士估计孕周为
- 12周末
 - 18周末
 - 24周末
 - 28周末
 - 32周末
68. 女性各阶段的生理特点正确的是
- 儿童期卵巢有少量卵泡发育，并排卵
 - 青春期是卵巢生殖内分泌功能最旺的时期
 - 月经初潮标志生殖器官发育成熟
 - 绝经过渡期一般历时1~2年
 - 绝经过渡期的突出表现为卵巢功能逐渐衰退
69. 初产妇，妊娠合并心脏病，分娩时出现“胎儿窘迫”，考虑为
- 胎盘老化
 - 胎儿先天性心脏病
 - 母体血氧含量不足
 - 羊水浑浊
 - 脐带血运受阻
70. 产妇，30岁，正常阴道分娩。查房时护士告知新生儿呼吸次数的正常范围是
- 70~80/分
 - 60~70/分
 - 40~60/分
 - 30~40/分
 - 20~30/分
71. 患儿，7岁。家长诉该儿3天前出现发热，曾达39.6℃，并伴刺激性干咳。护士查体发现呼吸音增粗。X线胸片示大片密度增高影；血清冷凝集试验呈阳性。最可能引起该患儿肺部病变的病原体是
- 肺炎链球菌
 - 肺炎支原体
 - 流感嗜血杆菌
 - 金黄色葡萄球菌
 - 流感病毒
72. 患儿，9个月。食欲缺乏，每日排便数次，持续2个月余。护士判断患儿最可能发

生的营养不良是

- A. 血钙过低
- B. 铁丢失过多
- C. 血糖过低
- D. 铁摄入不足
- E. 铁吸收减少

73. 新生儿，日龄 1 日。诊断为缺血性脑病，父母询问预后情况，护士介绍对判断预后具有参考价值的检查是

- A. 脑电图
- B. 头颅 X 线片
- C. 头颅 CT
- D. 脑血流图
- E. 脑血管造影

74. 患者，女性，25 岁。外伤致左大腿骨折，伴休克。护理措施不正确的是

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 输液抗休克
- C. 保温，必要时可用热水袋加温
- D. 密切观察尿量
- E. 伤口用无菌敷料包扎

75. 患者，女性，44 岁。右腰部撞伤、肿痛 2 小时。患者神志清，面色苍白，脉细速，血压 66/46mmHg (8.8/6.1kPa)，右脊肋角下方肿胀、压痛、腹软，无肌紧张，无移动性浊音，肠鸣音正常。经导尿引出黄色透明液约 210ml，给予快速输液 1 000ml、血浆 500ml、全血 400ml，病情无好转，血压继续下降，考虑患者最可能出现

- A. 肝破裂
- B. 膀胱破裂
- C. 肾挫伤
- D. 肾全层裂伤
- E. 肾蒂断裂

76. 患者，女性，52 岁。车祸导致胸部多根

肋骨多处骨折，出现反常呼吸，是因为

- A. 疼痛
- B. 胸壁软化
- C. 肋间隙变小
- D. 血气胸
- E. 血胸

77. 患者，女性，32 岁，因外伤出血导致休克。入院后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，血压下降、伤口渗血，其原因是

- A. 血镁升高
- B. 血磷降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠升高

78. 患者，女性，54 岁。突发右下肢动脉栓塞，该栓子最可能来源于

- A. 主动脉
- B. 上腔静脉
- C. 心脏
- D. 中动脉
- E. 中静脉

79. 患者，男性，60 岁。艾滋病病毒感染者，外伤手术后。为其伤口换药，血性敷料的正确处理是

- A. 单独清洗，过氧乙酸浸泡
- B. 煤酚皂浸泡后，再单独清洗
- C. 漂白粉浸泡后，再清洗
- D. 直接煮沸消毒
- E. 焚烧处理

80. 患者，女性，68 岁。高血压病史 28 年。3 天来，患者自觉疲乏、胸部不适，胸前区持续疼痛。今晨感觉胸前区持续疼痛加剧，来急诊就诊。查 ECG 示，急性心肌梗死。引起该病最可能的原因是

- A. 肺动脉栓塞
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 冠状动脉闭塞
- D. 上腔静脉受压
- E. 主动脉瓣狭窄

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(81~82 题共用题干)

患者，男性，41 岁。维修家电时不慎触电，心搏、呼吸骤停来院急诊，需迅速心肺复苏。

81. 心脏复苏按压的部位，正确的是

- A. 胸骨角
- B. 胸骨上半段
- C. 胸骨中、下 1/3 交界处
- D. 胸骨下半段
- E. 胸骨剑突

82. 心脏复苏时，应使胸骨下陷

- A. 1~2cm
- B. 2~3cm
- C. 至少 5cm
- D. 6~8cm
- E. 9cm

(83~85 题共用题干)

患儿，2 岁，腹泻 2 天。3 小时前突然剧烈腹痛、哭闹、呕吐、腹胀，20 分钟前有少量果酱样粪便，右侧腹可触及香肠样肿物，长约 6cm。

83. 患儿最可能出现了

- A. 肠道肿瘤

- B. 肠梗阻
- C. 肠套叠
- D. 肠扭转
- E. 肠结核

84. 为明确诊断，应采用的最佳检查方式是

- A. 空气灌肠造影
- B. 口服钡剂造影
- C. X 线腹部平片
- D. B 超
- E. CT

85. 患儿尚在患病早期，最佳的治疗方法是

- A. 腹部按摩，手法复位
- B. 手术切除肠管
- C. 应用抗生素
- D. 空气灌肠
- E. 观察，暂不处理

(86~88 题共用题干)

患者，男性，68 岁。风湿性心脏瓣膜病，二尖瓣狭窄 10 余年。3 天前受凉后出现咳嗽，咳黄色黏痰，伴发热，伴胸闷、心悸、气短，上 5 层楼梯需中间休息 5 分钟，自服感冒药后未见改善，急诊以“风湿性心脏瓣膜病、心力衰竭、肺部感染”收入院。

86. 引起该患者发生心衰的基本病因是

- A. 原发性的心肌损害
- B. 右心房代偿性扩张
- C. 心室后负荷过重
- D. 心室舒张充盈受限
- E. 心室前负荷过重

87. 导致患者发生心衰的主要诱因是

- A. 肺部感染
- B. 心律失常
- C. 缺乏休息
- D. 恶劣的气候

E. 用药不当

88. 护士根据患者目前的情况, 判断患者心功能分级属于

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

(89~91 题共用题干)

患者, 女性, 38岁, 上腹部疼痛2个月。腹痛多于餐后3~4小时发生, 进食后可缓解。过去2年每到秋冬季均有发作, 经胃镜检查确诊为十二指肠溃疡。

89. 引发本病的主要因素是

- A. 促胃液素过高
- B. 胃酸过高
- C. 促胰液素过高
- D. 胆汁反流
- E. 促胰酶素过高

90. 本病主要的致病菌是

- A. 溶血性链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 伤寒杆菌
- E. 大肠埃希菌

91. 采用三(四)联疗法进行治疗, 其主要目的是

- A. 减少胃痉挛
- B. 促进溃疡的愈合
- C. 减少胃酸分泌
- D. 消灭幽门螺杆菌
- E. 减轻疼痛

(92~93 题共用题干)

足月新生儿, 出生体重3000g, 身长50cm, 母乳喂养。

92. 哺乳后竖抱起婴儿并轻拍其背是为了

- A. 增强食欲
- B. 促进消化
- C. 安慰婴儿
- D. 防止溢乳
- E. 亲子接触

93. 喂奶后婴儿应采取的卧位是

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位
- E. 半坐卧位

(94~96 题共用备选答案)

- A. 孕母贫血
- B. 用未加热的牛奶喂养
- C. 青春期的少年缺铁
- D. 饮食不均衡
- E. 婴幼儿长期排便次数过多

94. 儿童生长发育快可导致

95. 婴幼儿铁丢失过多见于

96. 先天性铁储存不足见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 坏死组织多, 脓液多的创面
- B. 口腔炎症
- C. 肉芽水肿创面
- D. 肉芽生长过高的创面
- E. 炎性肿胀创面

97. 3%氯化钠溶液适用于

98. 攸琐溶液适用于