

R26
19

加白芥子 脹滯多者勿用芍藥

安胃 飲 陳皮同麥芽木通荅斛澤山查上衝胃火誠

堪泄呃逆不平自可差

治胃火上衝呃逆不止

陳皮

山查

麥芽

木通

澤瀉

黃荅

石斛

如胃火熱甚脉滑實者加石膏

玉女煎方熟地膠麥冬知母石膏集水虧火盛脉浮

洪煩熱渴乾微效必頭痛牙疼失血除少陰不足陽

明實若然大便泄而澹此劑非宜臨證悉

治水虧火盛六脉浮洪滑大小陰不足陽明有餘
煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神若大便秘澹泄
者乃非所宜

生石膏

熟地

麥冬

知母

升麻

如火之盛極者加梔子地骨皮之屬如多汗多

渴者加北五味如小水不利或火不能降者加

澤瀉或茯苓亦可如金水俱虧因精損氣者加

人參九妙

太清飲用通知母石斛石膏相配偶胃熱狂斑嘔吐
煩肅清其火斯無咎

治胃火煩熱狂斑嘔吐等證可與白虎湯酌用

知母

石斛

木通

石膏

或加麥門冬

綠豆飲能解熱毒勞蒸諸火俱堪逐除煩止渴悉伊
功和蜜或鹽隨所欲

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日三四次不拘此物性非苦寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小水乃淺易中之最佳最捷者也玉泉散治陽明熱甘草石膏無別物煩渴頭疼便秘除斑黃瘟疫熱痰泄

亦名一六甘露散

治陽明內熱煩渴頭痛二便

閉結溫疫斑黃及熱痰喘嗽等證

此益元散之

變方也其功倍之

生石膏 粉甘草

石爲細末每服二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下 若加硃砂亦妙

雪梨漿

味美氣清香切片甘泉水浸良解熱除煩陰

火退生津止渴飲其漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

用清香甘美大梨削去皮別用大碗盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其粗退陰火極速也

滋陰八味丸非別六味更加知柏合火盛陰虛濕熱
兼變丸亦可作湯液

治陰虛火盛下焦濕熱等證

此方變丸爲湯卽

名滋陰八味煎

山藥

丹皮

熟地

白茯苓

澤瀉

山茱萸

知母

黃柏

煉蜜搗丸桐子大或空心或午前用滾白湯或淡

鹽湯送下百餘丸

約陰

丸

歸地芍丹參苓朮地榆續斷芩白石脂須兼

五味先期經水便紅淋

治婦人血海有熱經脉先期或過多者或兼腎火而帶濁不止及男婦大腸血熱便紅等證

當歸

白朮

生地

白石脂

茯苓

地榆

黃芩

北五味

芍藥

丹參

川續斷

右爲末煉蜜丸

火甚者倍用黃芩

兼肝腎之

火甚者仍加知母黃柏

大腸血熱便紅者加黃

連防風

服蠶煎是入心肝地麥菖蒲芍牡丹知母木通陳斛
茯鬱開氣化自神安

此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱
結通神明養正除邪大有奇妙

生地

麥冬

芍藥

石菖蒲

石斛

茯神

丹皮

陳皮

木通

知母

如痰勝多鬱者加貝母 痰盛兼火者加膽星

陽明火盛內熱狂叫者加石膏 便結脹滿多熱

者加玄明粉 調服或暫加大黃亦可 氣虛神

困者加人參

約營煎 芍草地榆梅續斷槐花刺芥灰生地黃芩清

血熱便紅無論自何來

治血熱便血無論脾胃大小腸膀胱等證宜用此

生地

芍藥

甘草

續斷

地榆

黃芩

槐花

刺芥穗

烏梅

如下焦火盛者可加梔子黃連龍膽草之屬 如

約營煎 四味湯飲 六味湯飲

寒陣

氣虛者加人參白朮

如氣陷者加升麻防風

熱陣

四味回陽

飲

用理中以朮易附力加雄元陽虛脫垂

危頃溫服徐徐定有功

治元陽虛脫危在頃刻者

人參

製附子

炙甘草

炮乾薑

武火煎溫服徐徐飲之

太味回陽飲又增地歸薑附草人參諸虛劇甚陰陽

此劑扶危力可任

治陰陽將脫等證

人參

製附子

炮乾薑 炙甘草

熟地

歸身

如肉振汗多者加炙黃芪或冬白朮 如泄瀉者

加烏梅或北五味亦可 如虛陽上浮者加茯苓

如肝經鬱滯者加肉桂

理陰煎 歸地草乾薑此治真陰虛弱方痰飲惡心陰

噦嘔腹疼脹滿忌寒涼婦人血滯經遲妙倦客邪侵

景岳新方歌
溫托良或補命門加附子陽衰添桂信堪嘗

此理中湯之變方也 凡脾腎中虛等證宜剛燥

者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營
之類欲知調補當先察此 此方專治真陰虛弱

脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等

證 又凡真陰不足或素多勞倦之輩因而忽感

寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤舌焦

或雖渴而不喜冷飲或背心肢體畏寒但脉見無

力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用

此湯照後加減以溫補陰分托散表邪連進數服
使陰氣漸充則汗從陰達而寒邪不攻自散此最
切於時用者也神效不可盡述

熟地

當歸

乾薑

炙甘草

或加桂肉

此方加附子卽名附子理陰煎再加入參卽名六
味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證 若風寒
外感邪未深入但見發熱身痛脈數不洪此內無
火證素稟不足者但用此湯加柴胡連進一二服

其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃
散心用之或不用柴胡亦可恐其清利也此寒邪
初感溫散第一方惟仲景獨知此義但仲景之溫
散首用麻黃桂枝二湯余之溫散卽以理陰煎及
大溫中飲爲增減此雖一從陽分一從陰分其跡
若異然一逐於外一托於內而用溫則一也學者
當因所宜酌而用之若陰勝之時外感寒邪脉
細惡寒或背畏寒者乃太陽少陰證也加細辛甚
者再加附子真神劑也或并加柴胡以助之亦可

若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛
不能解者宜去薑桂單以三味加減與之或止加
入參亦可 若治脾腎兩虛水泛爲痰或嘔或脹
者於前方加茯苓或加白芥子以行之 若泄瀉
不止及腎泄者少用當歸或并去之加山藥扁豆
吳茱萸破故肉豆蔻附子之屬 若腰腹有痛加
杜仲枸杞 若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁
之屬

養中煎用草人參山藥乾薑扁豆苓中氣虛寒爲嘔

泄溫中補氣此方珍

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參

山藥

炙甘草

白扁豆

茯苓

乾薑

如噤腐氣滯者加陳皮或砂仁

如胃中空虛覺

餒者加熟地

溫胃飲

中寒食少思吞酸嘔吐瀉兼資參歸扁朮薑

陳草胎氣不安臟冷宜

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔