

醫統正脈全書

六五

丹溪心法卷五

元 丹溪朱震亨著

癰疽八十五

癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有
少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害
處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經
惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉
難長瘡久未合必成死症遽用驅毒利藥以伐其陰分
之血禍不旋踵 陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉

沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之 人中年以
後不可生癰纔有痛腫參之脉証但見虛弱便與滋補
氣血可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之
禍如指諸掌 內托之法河間治腫炊于外根盤不深
形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵於內急
須內托以救其裏宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如
或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯
如微利及煩熱已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱
行邪氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若

用之於些小瘡與冬月時令卽可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚杖一婦年七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉緊急且濇急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已失此內托之意又一男子年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附瓜蒌子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此正內托之法

非精要內托散乳香萊豆等藥想此方專爲服丹石而發疽者設不因丹石而發恐非必用之劑 瘡先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所觸宜和解風寒逼者宜溫散

腸癰 大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加連翹秦艽近肛門破入風者難治防風之類

乳癰 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不

行故竅不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而
化膿亦有所乳之子隔有滯痰口氣熅熱含乳而睡熱
氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令
汁透自可消散失此不治必成癰癰治法踈厥陰之滯
以青皮清陽明之熱細研石膏行汗濁之血以生甘草
之節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金
銀花當歸或湯或散或加戒隨意消息然須以少酒佐
之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針
刀必至危困若不得於夫不得於舅姑憂怒鬱悶昕夕

積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大棋子不痛不
痒數十年後方爲瘡陷名曰妳岩以其瘡形嵌凹似岩
穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清
神安然後施之治法亦有可安之理

乳癰方

青皮

瓜蔓

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節

破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰妳勞焮腫

石膏煨

樺皮燒

瓜蒌子

甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蒌各一兩

連翹半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節

乳岩小破加柴胡川

芍

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥 一錢

甘草 三錢

當歸 三錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹妳

金銀花

大薔麥

紫葛藤 等分

右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦可

乳栗破

少有破必大補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節

右以水煎服

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破當養
此初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四十八
粒作二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黃栢之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加

條子芩體虛者加牛膝以生甘草爲使大料煎入姜汁帶辣食前飲之病深者恐木栢桂枝十數貼發不動加少麻黃二三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下截使熱氣重蒸腠理開氣血暢而愈

鉄圍散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥

半兩

大黃

黃栢

黃連

南星

半夏

防風

皂角刺

木鱉子

瓜萸

甘草節

草烏

阿膠

右爲末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

圍藥 諸般癰疽傳上消散

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃栢

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺

右研爲細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

圍藥鉄并欄

貝母

南星

各七錢

連翹

五倍子

經霜芙蓉葉

各一兩

右碾爲細末用水調傅四向腫處止留中間一竅出

毒氣

隔皮取膿法

馱蹄

細切一兩

蕎麥麵

一兩

白鹽

半兩

草烏

四錢去皮

右爲末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋

調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

用大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水
盡爲末入皂角炭少許作四服湯調頓服效

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

敷疽癰方

草烏

黃連

紫荊皮

白芷

大黃

芙蓉皮

朴硝

粳米

各等分

右爲末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡穴
大小前後敷前藥末

一人肛門生瘡久不收口有針竅三孔勞力則有膿

黃芪

條芩

連翹

秦艽

右爲末神麴糊爲丸

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煨
通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟
大以紙撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸 五分

瓜蒌仁 三錢
代赭石 一錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌

桃仁

草龍膽

右咬咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方 白殭蚕槐花爲末酒調服一方加酒大黃

附方

消毒飲

治便毒初發三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

瓜蒌仁

等分

効

機要內托復煎散

癰疽托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

白芍

人參

黃芪

白朮

桂枝

甘草

防己

當歸

各一兩

防風

三兩

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前