


增廣本草綱目

錦章圖書局

印行



熱瘡大瀉諸實熱不通除下焦溼熱

時

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚

志然心下停氣得消石紫石英桃仁

不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心何也答曰若小氣不足則當不吐衄此乃洲熱因

實而已震亨曰大黃苦寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輸以致溼溫

行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一自矣肺與肝俱各

受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足

厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足

吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉

心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之溼

熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉

神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一

切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁

元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之

遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉

曰本草稱大黃推陳致新其效最

神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一

切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁

元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之

遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉

熱譎語黃疸諸火瘡

珍仁療女子血閉宗奭曰張仲景治心氣不足

不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心何也答曰若小氣不足則當不吐衄此乃洲熱因

實而已震亨曰大黃苦寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輸以致溼溫

行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一自矣肺與肝俱各

受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足

厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足

吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉

心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之溼

熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉

神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一

切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁

元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之

遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉

曰本草稱大黃推陳致新其效最

神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一

切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁

元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之

遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉

曰本草稱大黃推陳致新其效最

神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一

切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁

元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之

遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉

曰本草稱大黃推陳致新其效最

附方

舊十四新仲景傷寒論

三十七吐血衄血

芩各一兩水半盞

煎一合水半盞

仲景傷寒論

熱病譎狂

川大黃五兩炒微赤爲散用臘雪水五升煎如膏每服半匙

仲景傷寒論

腰脚風氣

空心以水三

大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡

物卽痛止崔

一切壅滯

經驗方治風熱積壅化痰涎治痞悶渴食氣導血用大黃四兩牽牛子半

溫服仲景傷寒論

宿平旦煎汁一升入芒硝一兩

仲景傷寒論

緩服須臾當利下

傷寒類要

腰脚風氣

空心以水三

大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡

物卽痛止崔

一切壅滯

生四兩爲末煉蜜丸如梧子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一二

十九○衛生寶鑑用阜筭燒膏和丸名墜瘻丸

瘻爲百病

滾瘻丸治瘻爲百病惟水瀉胎前產後不可服

半兩青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和丸梧子大常服一二

丸小病五六十丸緩病七八十九急病一百二十丸溫水吞下卽臥勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟

柏枝下痰涎未下再服王隱君歲合

男女諸病

無極丸治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血

四十餘斤愈疾數萬也養生主論

五臟產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱

元亮海上方

一切壅滯

經驗方治風熱積壅化痰涎治痞悶渴食氣導血用大黃四兩牽牛子半

溫服仲景傷寒論

宿平旦煎汁一升入芒硝一兩

仲景傷寒論

緩服須臾當利下

傷寒類要

腰脚風氣

空心以水三

大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡

物卽痛止崔

一切壅滯

生四兩爲末煉蜜丸如梧子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一二

十九○衛生寶鑑用阜筭燒膏和丸名墜瘻丸

瘻爲百病

滾瘻丸治瘻爲百病惟水瀉胎前產後不可服

半兩青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和丸梧子大常服一二

丸小病五六十丸緩病七八十九急病一百二十丸溫水吞下卽臥勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟

柏枝下痰涎未下再服王隱君歲合

男女諸病

無極丸治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血

四十餘斤愈疾數萬也養生主論

五臟產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱

等證其效甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分用童屎一盃食鹽二錢浸一日切曬一盃用醋酒一盃浸一日切曬再以巴豆仁三十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盃浸

一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去歸切曬為驗未下同服此武當高士孫爲碧雲方也醫林集要心腹諸疾三物備服五十丸空心服當歸取下惡物為驗未下同服此武當高士孫爲碧雲方也醫林集要心腹諸疾三物備

心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡中客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉卽瘥此乃仲景

方司空裴秀改爲散用不及丸也

圖經本草腹中痞塊每服三十丸生薑湯下吐利爲度外臺祕要

腹脹積塊風化石灰末半斤瓦器炒極熱稍冷人大黃末一兩炒熱入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏

以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服若不

忌口不如勿服小兒無辜

門癰癧癰或頭乾黃聾或乍痢乍癰諸狀多者大黃煎主之大黃九兩錦紋新

聖濟總錄實者若微軟卽不中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置瓦盤中於大鑄

內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七丸大黃煎主之大黃九丸太日再服以下出青赤膿爲度若

不下或下少稍稍加丸若下多又須減之病重者七歲以上人行五里再服廣利方

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

利也須禁食毒物乳母亦禁之大黃燶熟黃芩各一兩爲末煉蜜丸麻子大每服五錢

加木香一兩半崔知悌方小兒諸熱大黃連名三黃丸錢氏小兒方骨蒸積熱

漸漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合煎取四合酒服無厭冷五心煩蜜湯服劉河間保命集

人各一兩水煎服取利或加

大黃一兩浸酒半日去滓空腹分爲二服如人行五里再服廣利方

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

可安危相火祕結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服二錢有厥冷者

人各一兩水煎服取利或加

大黃一兩頭醋半升熬膏丸梧子大

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

氏得效方食已卽吐胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水

仲景金匱玉函方婦人血癖十沸頓服取利或加

大黃末一兩頭醋半升熬膏丸梧子大

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

大黃溫醋化下良久當下千金方

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

大黃每服五丸溫醋化下良久當下千金方

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

乃調經仙藥也或加香附董氏集驗方婦人嫁痛升煮一沸頓服

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

當者酒炒大黃爲末茶清服二

人藥攬兜蒸熱空心食之不過三服愈

大黃酒煎服之傳信適用方

胃火牙痛口含冰水一口以紙燃蘸大黃末隨左右噙鼻立止

儒門事親性爲末早晚揩牙漱去都下一家專貨此藥兩

宮常以數千顆之其門如市也干金家藏方風蟲牙痛生地黃各旋切一片合定貼上一夜卽愈未愈

大黃酒煎服之

宏景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能去尸鬼見鬼神其寶子亦入神藥花名蕎花尤良頃曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根竹筐盛掛屋東北角陰乾百日搗篩井華水調服云神仙所秘法也時珍曰商陸苦寒沉也降也陰也其性下行專於行水與大戟甘遂蓋異性而同功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利者以赤根搗爛入麝香三分貼于臍心以帛束之得小便利卽腫消又治溼水以指畫肉上隨散不成文者用白商陸香附子炒乾出火毒以酒浸一夜日乾爲末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾嘉謨曰古讚云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言盡之矣

附方 舊九新六溼氣腳軟飯每日食之以瘥爲度最效斗門方水氣腫新六溼氣腳軟飯每日食之以瘥爲度最效斗門方水氣腫

滿心 外臺祕要用白商陸根去皮切如豆大一大盞以水二升煮一升更以糯米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食一千金散用白商陸六兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取效

梅師方 用白商陸一升羊內六兩水一斗煮取六升去滓和葱豉作臠食之蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷卽易晝夜勿息孫真

人千瘡癬如石 在脇下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如泥以商陸汁煎產後腹大堅滿喘

金方 痘瘍如石杏泥火煎如餳每服棗許空腹熱酒服以利下惡物爲度聖惠方

白聖散 用草柳根三兩大戟一兩半甘遂炒一兩爲末每服二三錢熱湯調下大便宣利爲度此乃主水聖藥也潔古保命集

壯良○外一切毒腫

商陸根和鹽少許搗傅日石癰如石

堅硬不作膿者

商陸根搗炙布裹熨之

臺松要

再易之

孫真人千金方

石癰如石

取軟爲度亦治溼漏諸癰

張文仲方

瘡傷

商陸切根炙熱隔布熨之

圖經本草瘡癰喉痺

攻痛生商陸根搗作餅置旁攻兩脇痛或瘡塊涌起用商陸根熬以囊盛更互熨之取效

肘後方

商陸根和鹽少許搗傅日石癰如石

堅硬不作膿者

商陸根搗擦之燥卽易取軟爲度亦治溼漏諸癰

張文仲方

瘡傷

葛花主治人心昏塞多忘喜臥取花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事卽於眼中醒悟

也蘇頌

狼毒 本經下品釋名時珍曰觀其名知其毒矣

集解

別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良宏景曰若昌亦出之乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太山

者今用出漢中及建平云與防葵同根但置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀爲療腹內要藥耳

恭曰

今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說謬矣志曰狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者爲貞輕者爲力

秦亭在隴西奉高是太山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足爲信假使防葵秋冬采者堅實

陳也

保昇曰根似玄參惟虛浮者爲劣也

頌曰

今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼

毒出秦晉地今人往往以草得水皆沉狼毒春夏者浮得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸爲六

蘭茹爲之誤矣見蘭茹下也

根氣味辛平有大毒

天明曰苦辛有毒之才曰大豆爲之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯密陀僧也

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡

抱朴子附

鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸

本經除胸下積癖別錄治瘻飲癥瘕亦殺鼠

明日合野葛納耳中治聲子

方舊四心腹連痛作脹用狼毒二兩附子半兩搗節蜜丸梧子大一日服一丸二日

九種心痛三蟲二蛀

新六心腹連痛二丸三日三丸止又從一丸起至三丸止以瘥爲度時後方

五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證九痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩爲末煉蜜丸梧子大每空腹溫酒

下第一丸水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲用狼毒三兩附子一兩和劑局方腹中冷痛旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下日三服○肘後方

死丸縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩搗末每

末蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下肘後方兩脇氣結冷痛方

同腹中一切蟲病服一錢用鈎一

阜子大沙糖少許以水化開臥時空腹服之次早卽下蟲也○集效方

乾溼蟲疥狼毒不拘多少搗爛以豬油馬油調搽患處方睡勿以被蒙頭恐藥氣傷面此維揚潘氏所傳方

蘭氏經驗方

積年疥癩狼毒一兩一半生研一半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化爲末同以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清遇夜不見燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥蓋上吸

氣取效氣取效

積年乾癩生痴搔之黃水出每逢陰雨卽聖惠方惡疾風瘡狼毒秦艽等分爲末每服方寸

永類方積年乾癩發用狼毒末塗之

千金方

防葵本經釋名房苑別錄

梨蓋本經利茹似葵花子根香味似防風故名防葵

農果慕曰莖葉

根暴乾普曰莖葉如葵上黑黃二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根

曰此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之興州者乃勝南者爲隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中幹其端開花如荷花景天輩而色白六月開花卽結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水內乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣時珍曰唐時隴西成州貢

之蘇頌所說正誤宏農曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而詳明可據

狼毒陳久者亦不能沉矣斂曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異故又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生蛇用之惟輕爲妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因而用之將以防葵破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊爲謬誤

根脩治敷曰凡使須揀去艸未用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒至汁盡用

氣味辛寒無毒別錄曰甘苦桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無毒權曰有小毒主治疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溼瘡癰癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身經療五臟虛氣小腹支滿廬脹口乾除腎邪強志中火者不可服令人恍惚見鬼

別錄久服主邪氣驚狂恭主痃癖功今古因循遂無甄別殊爲謬誤

氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盜者悉能消散治鬼瘻百邪鬼魅精怪通氣

權發明時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷

根爲狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃輩根無漿汁

根氣味辛寒有小毒

別錄曰酸普曰神農辛岐伯酸鹹有毒李當之大寒之才曰甘草爲之使麥門冬主治蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡

血除大風熱氣善忘不寐

本經去熱病破癥瘕除憲肉別發明日素問治婦人血枯痛用烏鵲骨蘆茹丸服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾孟說必效方治甲疽生于腳趾邊爛用蘆茹二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合日塗之卽消又聖惠方治頭風旋眩鳴頭丸中亦用之

咽痛

毒攻作腫真蘆茹爪甲大納口噙汁善忘不禁蘆茹三分甘草炙二兩消石爲末每

瘡

突厥爲佳張文仲備急方中焦熱痞附方新二緩症腫痛服二錢七聖惠方傷寒服一錢雞鳴時溫酒下以知爲度

瘡瘍

蘭茹末入輕粉香油聖惠方傷寒

瘡瘍瘻

蘭茹末入輕粉香油多能鄙事

瘡瘍瘻

蘭茹末入輕粉香油多能鄙事

大戟

本經下品釋名卽鉅爾雅下馬仙綱曰時珍曰其根辛苦戟人咽喉故名今俚人呼爲下馬仙言利人甚速也郭璞注爾雅云蕷卽鉅卽大戟也

根

陰乾保昇曰苗似甘遂而高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃白五月采苗二月八月采根用

根

頤曰近道多有之春生紅芽漸長叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三四月四月開黃紫花圓圓似杏花又似蕪荑根似細根冬采根陰乾淮甸出者苦圓高三尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥時珍曰大戟生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不圓其梢葉密攢

根

頤曰近道多有之春生紅芽漸長叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三四月四月開黃紫花圓圓似杏花又似蕪荑根似細根冬采根陰乾淮甸出者苦圓高三尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥時珍曰大戟生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不圓其梢葉密攢

根

柔韌如錦甚峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知

根脩治

敷曰凡使勿用附生者誤服令人洩氣不禁卽煎蕷芒湯解之采得後于煖砧上細剉與海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用時珍曰凡采得以漿水煮軟去骨曬乾用海芋葉麻而有毒恐不

氣味

苦寒有小毒別錄曰甘大寒權曰苦辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損真氣時珍曰

氣味

苦寒有小毒別錄曰甘大寒權曰苦辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損真氣時珍曰

氣味

苦寒有小毒別錄曰甘大寒權曰苦辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損真氣時珍曰

毒藥泄天行黃病溫瘡破癰結

大下惡血癥塊腹內雷鳴通月水墮胎孕藥治隱瘻風及風毒腳腫並煮

水日日熱淋取愈

蘇發明成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也古曰大戟與甘遂同爲泄水之藥溼勝者苦燥除之也時珍曰癰癰之爲物隨氣升降無處不到入于心則

迷竅而成癰癰妄言妄見入于肺則塞竅而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔

寒熱往來入于經絡則麻痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰膝手足牽引隱痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇效此乃治療之本病之本水也溼也得氣與火則凝滯而爲痰爲飲爲涕爲癰大戟能泄臟腑之水溼甘遂能行經隧之水溼白芥子能散皮裏膜外之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎爲眞水有補無瀉而復云痘瘻變黑歸腎一證用百祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自

不實愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

不實愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則濁其子也醫邪實而寫其肝也大戟味苦澆浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而能吐
青綠水木青綠者少陽風木之色也仲景亦云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者十棗湯主之其中亦有
大戟夫乾嘔脇痛非少陽之病乎則百祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補況瀉青瀉黃皆瀉其
子同一瀉也何獨腎只瀉膽乎潔老人醫變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋毒勝火
敗則水益固風火大勢則上多攻少止利口鼻也

所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺故濁腎扶脾者非也腎之真水不可瀉其陷伏之邪毒爾附方十

百祥膏治喉而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下紅芽大戟不拘多
少陰乾漿水煮極軟去骨日乾復納原汁盡焙爲末水尤粟米大每服一二十丸研赤脂麻湯下

三。潔古活法機要棗變百祥丸治痘瘡變黑大便閉結用大戟一兩棗一盞同煮暴乾去大戟以棗肉陪丸服從少至多以利爲度

爲膏肓或堅硬膿腫者不可舉或垂中流延或丈步而止之不可誤作風氣風毒及瘡疽施治須痛不可忍筋骨牽引鈎痛走易及皮膚痺似乎癱瘓又因氣血凝滯而生寒氣

白芥子微炒各一兩爲末薑汁打麪糊丸梧子大每服七粒重喘急小便濇及水蠱大戟炒二兩乾薑

大便一十粒以津液嚥下若取利則服五六十九三因方力壯呻急炮半兩爲散每服三錢薑湯下小便利爲度水病重者不問年月淺深大戟當歸橘皮各一兩切以水二升煮取七合頓服利下水一

聖濟總錄力症脚滿半勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作此方出張尚客

水氣脛腹補之忌鹹物○**小便**方用大戟燒存性研末每空心酒服一錢七水腫腹大浮腫用棗二枚切水煎服

牽牛木香等分爲末每服一錢以豬腰子一對批開摻末在內溼紙煨熟空心食之左則塌左右則塌右

牙齒搖痛 大朝咬於痛處 中風發熱 煮熟洗之寒乃止
牙齒 張昌古要 摩大朝咬於痛處 發熱苦參四兩白醋漿一斗
牙齒 滋養良 生生編 千金方

澤漆本經下品。釋名塗莖本經貓兒眼睛草。綱目綠葉綠花草。綱目五鳳草。宏景曰是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦蠶人除見下。

漆大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日采莖葉陰乾大明日此卽大戟花也川澤中有莖梗小花

莧綠葉如苜蓿葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青
莧綠葉如苜蓿葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青

綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草梢莖有白汁黏人其根白色有硬骨或以此爲大較苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂膠此則驛麥是貓兒眼睛草非大較苗也今方家

用治水蠱脚氣有效尤與神農本文相合自漢人集別錄誤以爲大戟苗故諸家襲之爾用者宜審視

莖葉氣味苦微寒無毒之才曰小豆爲之使惡薺蕷主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不

足經 大小腸明目輕身別主蠱毒主蠱毒 止瘡疾消痰退熱大 **明** **發明** 時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以爲大戟然大戟根苗

皆有毒澀而利水，根硬不可用。苗亦無毒，可作菜食，而利水尤陰氣盛，不相伴也。

附方

沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水斗煮取一斗五升去滓入半夏半升紫

參白前生薑各五
取五升每服五合日二服

張仲景金匱要略方

心下伏瘕

大如盆不得食者澤漆四兩大黃芩慈然

葛洪後方

十種水氣

如稀餳入瓶內收每日空心溫酒調下一匙以愈爲度

聖惠方

水氣蠱病

生鮮貓

臘乾爲末棗肉丸彈子大每服二丸白湯化下

日二服覺腹中暖小便利爲度

乾坤秘韻

腳氣赤腫

行步腳痛貓兒眼睛草鴛鴦藤等分每服一兩水五碗煎三碗薰洗之

牙齒疼痛

貓兒眼睛草一搦研爛湯泡取

男婦瘰癧

貓兒眼睛草熬至一桶去滓澄清再熬至一碗瓶收每以椒葱槐油調搽之

枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏

癬瘡有蟲貓兒眼睛草臘乾爲末香

數次愈便民圖纂方

衛生易簡方

甘遂本經釋名甘藷

別陵藷吳陵澤錄

別甘澤普重澤錄

苦澤吳白澤吳主田錄鬼醜

吳曹時珍曰諸集解錄

根脩治

用東流水淘六七次令水清爲度漉出于土器中熬脆用之

時珍曰今人多以麵煨熟用以去其

日甘遂生中山川谷二月采根陰乾普曰八月采宏景曰中山在代郡第一本出太山江東比來用京口

者大相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋屬僞者也恭曰甘遂苗似澤漆其根皮赤肉

白作連珠實重者良草甘遂乃是蜜休療體全別苗亦不同俗名重臺葉似鬼臼莖麻根皮白色大明曰

西京者上汴滻吳者次之形似和皮甘草節頌曰今陝西江東亦有之苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮

赤肉白作連

赤如指頭

根脩治

用東流水淘六七次令水清爲度漉出于土器中熬脆用之

時珍曰今人多以麵煨熟用以去其

毒氣味苦寒有毒

別錄曰甘大寒普曰神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有

素曰純陽也之才曰瓜蒂爲之使惡遠志反甘草

主治大腹疝腹滿面目浮腫

留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

經下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿

別錄能瀉十二種水疾去痰水

權瀉腎經及隧道水溼腳氣陰囊腫墜痰迷癰瘍噎膈痞塞

時珍曰此藥專于行水攻決爲用

宗奭曰此藥專于行水攻決爲用

素曰味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達

水氣所結之處乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用

時珍曰不可過服但中病則止可也張仲景

腎主水凝則爲痰飲溢則爲腫脹甘遂能泄腎經溼氣治痰之本也不可過服

但中病則止可也劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹

遺臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選方云腳氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調

傅腫處卽濃煎甘草汁服其腫卽散二物相反而感應如

附方舊三新水腫腹滿

甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半爲末水煎時

此時呻之

附流韓諺病腳疾用此一服病去七八再服而愈也

附方舊二錢生研爲末以豬腎一枚分

普濟方膜外水氣

甘遂末大麥麪各半兩水和作

身面洪腫七錢入末在內溼紙包煨令熟食之日分

服至四五服當覺腹鳴小腿膝攀急四肢腫痛卽上方加木香四錢每用二錢

正水脹急

大小便

便利是其效也

附方葛洪後方

水煮令浮淡食之

大小便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服

普濟方

小兒疳水

珠子甘遂炒

死甘遂五錢半生半炒胭脂坏子十文研勻每以一錢白麵四兩水和作

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

水煮令浮淡食之

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

葛洪後方

五二二草部甘遂

續隨子

上海錦華書局石印

爲未三歲用一錢以麥芽湯下以利爲度忌酸鹹三五日名水寶散總微論水鹽喘脹甘遂大戟各一兩慢火炙研每服一字水腫喘急大便不通十棗丸用甘遂大戟梔子花等分爲末以棗肉和丸梧子大每服四十丸侵晨熱湯下利去黃水爲度否則次午再服三因方妊娠腫滿氣急少腹滿大小便不利山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸水大每服五十丸得微下仍服豬苓散不下再服之猪苓散見豬苓下小品方心下留飲堅滿脈伏其人欲自利反快甘遂二個以水一升煮半升去滓入芍藥五枚甘草一節水二升煮半升同煎八合頓服取利○張仲景金匱玉函腳氣腫痛半兩木鼈子仁四個爲末猪腰子一個去皮膜切片用藥四錢摻在內溼紙包煨熟空心食之米飯下服後便伸兩足大便行後吃白粥二三日爲妙湯以通爲度又太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服日一服取利聖惠方小便轉脬甘遂末以生麵糊調傅膚中門事婦人血結婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此爲水與血俱結在血室大黃半兩阿膠各一兩水一升半煮半升頓服其血當下○張仲景方病證發熱盜汗胸背疼痛甘遂麵包漿水煮十沸去麵以細糠火炒黃爲者五分水酒調下怪病奇方怪病奇方病證發熱盜汗胸背疼痛甘遂麵包漿水煮十沸去麵以細糠火炒黃爲末大人三錢小兒一錢冷蜜水臥時服忌油膩魚肉普濟方消渴引飲甘遂炒半兩黃連一兩爲末蒸餅丸綠豆油一小點抄藥在上沈下去漿灌之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用甘遂二兩乾麻子仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯草湯元方耳卒聾閉甘遂半寸綿裹插入兩耳內口中嚼滴元方耳卒聾閉甘草耳卒自然通也示類方

續隨子

宋開

釋名千金子

開

華菩薩豆

日

拒冬

開

步

履

故名

冬月

始長

故又名拒冬

集解

志曰續

隨子生

葉

中

出

葉數數

相續

而生

生

葉

數

相

似

主

療

亦

相

似

其

功

皆

長

于

利

水

惟

在

用

之

得

法

亦

皆

要

藥

也

附方

舊二

小便不通

脾

腹

脹

痛

不

可

忍

諸

藥

不

效

者

研

壓

去

研

壓

研

壓

研

壓

研

壓

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

去油重研分作七服每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人荆芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補之頻吃益善忌鹽醋一百日乃不復作聯步即續隨子也

子炒去油二兩大黃一兩爲末酒水丸綠豆大每白湯下五十丸以去陳莝 滴元方 涵積癥塊飯丸芥子大每服一丸打破以大棗一枚燒熟皮核同嚼冷茶送下半夜後取

下積聚惡物爲效 聖濟錄 蛇咬腫闊欲死用重臺六分續隨子仁七粒搗篩爲散酒服方寸匕兼唾和少許塗咬處立效 崔元亮海上方 黑子疣蕡

續隨子熟時塗之

自落 普濟方

葉及莖中白汁主治創人面皮去點黯

開

寶傳白癩癰瘍明搗葉傅蠍蟄立止

時珍

蕡若

音浪蕩○

釋名 天仙子 圖橫唐本經行唐

時珍曰蕡若一作蕡蕩其子

服之令人狂放宕故名

集解 別錄曰蕡若子生海濱川谷

及雍州五月采子

宏景曰今

處處有之子形頗似五味核而極小保昇曰所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細毛花白色王不留下紅

結實扁細若粟米大青黃色六月七月采子日乾頑曰處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅

藍等而閼如三指四月開花紫色莖葉有白毛五月結實有殼作瞿子狀如小石榴房中子至細青白色

如粟米粒

教曰凡使勿用蒼蕡子其形相似只是微赤服之無效時人多以雜之

時珍曰張仲景金匱要

略言菜中有水蕡若葉圓而光有毒誤食令

人狂亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子脩治

穀曰修事蕡若子十兩以頭醋一錠煮乾爲度卻用黃

牛乳汁浸一宿至明日乳汁黑即是真者曬乾搗篩用

氣味苦寒無毒

別錄曰甘權曰苦辛微熱

火頑曰溫有毒服之熱發畏綠豆蟹甘草升麻犀角並解之

穀曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生惺

火頑曰本經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川王美人懷子不乳飲以蕡藥一撮以酒飲

旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主

主治齒痛出蟲肉癆拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益力

卒顛狂亦多單用蕡若果性寒耶

通神見鬼多食令人狂走

本經療癲狂風癇顛倒拘攣別

安心定志聰明耳目除邪逐風變白主痃癖取子

洗曬隔日空腹下一指捻亦可小便浸令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂

藏器炒焦研末治

下部脫肛止冷痢主蛀牙痛咬之蟲出

甄燒熏蟲牙及洗陰汗

大發明宏景曰入療癲狂方用然不可過

益而仙經不見用權曰以石灰清煮一伏時掏出芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸服去一

切冷氣積年氣痢甚溫暖也不可生服傷人見鬼拾鍼狂亂

時珍曰蕡若之功未見如所說而其毒有甚

焉煮一二日而芽方生其爲物可知矣

蕡若雲實防葵赤商陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義

者蓋此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視聽故耳

唐安祿山誘奚契丹飲以蕡若酒醉而坑

之又嘉靖四十三年二月陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯問呼其全家同

坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其奸污復將魔法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆是妖鬼盡

行殺死凡一十六人並無死迹官司執柱囚之十餘日柱吐痰二盞許問其故乃知所殺者皆其父母兄

嫂妻子姊姪也柱與如香皆論死世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是蕡若之流爾方其痰迷之時

視人皆鬼矣解之

附方

舊二十一卒發癲狂 薦若三升爲末以酒一升漬數日絞去滓煎令可丸如小豆三

並是瘥候也未知再服取

風痹厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭甘草半兩五靈脂一兩爲末糊丸梧子大

盡神良 陳延之小品方

有膿血 薦若子五錢淘去浮者煮令芽出炒研真酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取

久嗽不止

棗日食三枚。又方薦若子三撮吞之日五六度光祿李丞服之神驗

唧噥

紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之 崔行功纂要方

水腫蠭脹

方見獸部 積冷痃癖 不思飲食羸

三分水淘去浮者

大棗四十九個水三升煮乾只取棗核每空心食一個米飲下覺熱卽止 聖濟錄

冷疳痢下

薦若子爲末臘猪脂和丸綿裹棗許導下部內 痘出更納新者不過三度瘥○孟說必效方

赤白下痢

炒黑一撮爲末每服一錢米飲下

下血

黃芩煎用薦若實一升暴乾搗篩生薑半斤取汁銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎如稠鴆卽

旋投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸

時黏手則以荒絲粉襯隔之火候忌緊繫焦則失力也

初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利亦止絕有效 篓中方

牙齒宣落

風痛 薦若子末綿裏咬之有汁勿嚥 必效方

牛匙

清水一盞服之不得嚼破○外臺秘要

石癰堅硬

不作膿者 薦若子爲末醋和根卽拔出 千金方

羊脂調薦若子末

惡犬咬傷 薦若子七枚吞之 傷之

千金方

了當便出也

子和儒門事親方 張

根氣味苦寒有毒主治邪瘡疥癬殺蟲時

附方 新瘡疾不止 薦若根燒灰水服一合量人強弱用

之 千趾間肉刺

黃芩根搗汁塗之○雷公炮炙論序云脚生肉刺搣若根謂繫于裡帶上也

煮汁浸之冷卽易

神方也 千金方箭頭不出生你卻在這裏道罷用柴灰自東南起圍了以木牌子掘取根下周迴土次

日日未出時依前不語用鐵頭取出洗淨勿令雞犬婦人見于淨室中以石臼搗如泥丸彈子大黃丹爲

衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中綿兜肚繫

雲實本經

釋名貢實別錄雲英別錄大豆吳馬豆經羊石子經苗名草雲母唐本臭草經櫟刺綱目時珍曰貞亦音其義未詳豆以子

形名羊石當作羊矢其子肖之故也集解別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾曹曰莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩亦類荳若燒之致鬼未見其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝閒微刺俗謂苗爲草雲母陶云似蕁華者非也保昇曰所在平澤有之葉似槐花黃白色其實青黃色大若麻子五月六月采實頤曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草實名麻豆三月四月采苗十月采實過時即枯落也時珍曰此草山原甚多俗名歸刺赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿枝子五六粒正如鵝豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣

實脩治

穎稼曰凡采得粗搗相對拌漚顆株實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒小溫黃帝鍼雷公苦

王治

泄病腸澼殺蟲蠭毒去

邪惡結氣止痛除寒熱

本經消渴別錄治瘡多用蘇主下臘膿血

新臘下不止

雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩爲末蜜

下日三服

丸梧子大每服五丸水

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之

時珍曰殺精物下水燒之致鬼

本經殺精物下水燒之致鬼

別錄發明時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂豈有

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經殺精物下水燒之致鬼

別錄發明時珍曰雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩爲末蜜

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之

時珍曰殺精物下水燒之致鬼

本經殺精物下水燒之致鬼

別錄發明時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂豈有

朶麻

音卑。

釋名

頤曰葉似大麻子形宛如牛蝶故名時珍曰朶亦作蠻蠻牛虱也其子有麻點故名朶麻

集解恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結子如牛蝶今胡中來者莖亦

高丈餘子大如阜莖核用之亦可保昇曰今在處有之夏生苗葉似葎草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褶夏采莖葉秋采實冬采根日乾用時珍曰其莖有赤有白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋開莖裏抽出花穗纍纍黃色每枝結實數十顆上有刺擴簇如蠅毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蝶再去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者貞子有刺者毒

子脩治

教曰凡使勿用黑天亦利子綠在地莖上是顆兩頭尖有毒其朶麻子節節有黃黑斑凡使以鹽

沫盡乃止去水以沫煎至點燈不注滴水不散爲度

氣味甘辛平有小毒時珍曰凡服朶麻者一生不得食炒豆犯之必脹死其油能伏丹砂粉霜

主治水癥以水研二

十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡瘍浮腫尸疰惡氣椎取油塗之

唐研傅瘡瘍疥癬塗手足心催生

明治癰癧取子炒熟去皮每臥時嚼服二三枚漸加至十數枚有效

宗夷

本研傅瘡瘍疥癬塗手足心催生主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痹齁喘腳氣毒腫丹瘤湯火傷城刺入肉女人胎衣

不下子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒

時珍發明

震亨曰：龍麻屬陰，其性善收，能追膿取毒，亦外科要藥。能出有形之滯物，故取

胎產胞衣刺骨臘血者用之。時珍曰：龍麻仁甘辛有毒，熱氣味類近巴豆，亦能利人，故下水氣。其性善走，能引藥氣入煎，龍麻油能拔病氣出外，故諸膏多用之。一人病偏風，手足不舉，時珍用此油同羊脂、麝香、鯉魚甲等藥煎作摩膏，日摩數次，一月餘漸復，兼服搜風化痰養血之劑，三月而愈。一人病手臂一塊腫痛，亦用龍麻搗膏貼之一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛，用此同乳香食鹽搗，矯太陽穴一夜痛止。一婦產後子腸不收，搗仁貼其丹田一夜而止。此藥外用，累奏奇効。但內服不可輕率，爾或言搗膏以筋點于驚馬六畜舌根下，卽不能食，或點肛內，卽下血死。其毒可知矣。

附方

舊九新半身不遂，失音不語，取龍麻子油一升，酒一斗，銅鍋盛油，著酒中，一日煮之，令熟細細服之。外臺秘要口

目喝斜

龍麻子仁搗膏左貼右，右貼左，卽正。婦人貞方用龍麻子仁七七粒研作餅，右喝安在左手心。

巴豆十九粒，麝香五分，作餅如上，用紙捲筒插入鼻中，下清涕，卽止。八種頭風

龍麻子剛子各四十九粒去殼，研成膏子，塗蓋內，後將灰火燒前藥，烟起以蓋之，待烟盡，以百沸葱湯點盞，內茶葉服。之後以綿被裹頭，臥汗出避風。祐珍方

倒籠

小兒瘡疾及諸病，後天柱骨倒，乃體虛所致，宜生筋散貼之。木籠子六個去殼，研勻，先包頭，擦頑上，令熱以津調藥貼之。鄭氏小兒方

仁二兩，黃連一兩，石膏水一盯，武火煮之，乾，添水二十段，食後荆芥湯下。日二服，終身忌食豆，犯之必腹脹死。

偷生寶鑑舌

急喉痺塞

牙關緊急，不通，用此卽破，以龍麻子仁研爛，紙卷作筒，燒烟熏吸，卽通。或只取油作擦，尤妙。名聖煙筒。

塞之一日一易，三十日聞香臭也。

聖濟錄天柱骨

上出血

龍麻子油紙撚燒烟熏，鼻中自止。摘元方

舌服塞口

龍麻仁四十九粒去殼，研油塗紙上，作擦燒烟熏之，未退，再熏以

急喉痺塞

牙關緊急，不通，用此卽破，以龍麻子仁研爛，紙卷作筒，燒烟熏吸，卽通。或只取油作擦，尤妙。名聖煙筒。

塞之一日一易，三十日聞香臭也。

聖濟錄天柱骨

三服效。

三因方用龍麻仁、荆芥穗、蜜丸，綿包噙嚥之。千金水氣脹滿，龍麻子仁研水解得三合，清旦頓服，盡日中當

等分，為末，蜜丸，每服五粒。外臺秘要腳氣作

痛

龍麻子七粒去殼研，同蘇合香等分，為末，安紙上，托入，仍以

插入鞋中，卽通。

摘元方

咽中瘡腫

杜任方用龍麻子仁一枚，朴消一錢，同研，新汲水服之，連進二

炒豆

衛生易簡方，催生下胞。崔元亮海上集驗方，取龍麻子七粒去殼研膏，塗腳心，若胎及衣下便速

麻子十四枚，每手各七枚，須臾立下。也。

子宮脫下

龍麻子仁十四枚研膏，塗頂心，卽入。

摘元方

盤腸生產

塗頂方

催生下胎

不拘生胎，死胎，龍麻二個，巴豆二個，麝香一分，研貼，隨

服，見效，終身不可食也。

冬五日後，取龍麻子一枚，镑破，面東以浸藥水吞之，漸加至四五枚，微利，不妨，瓶中水盡，更添兩月後喫。

中并足心。又下生胎，一月一粒，溫酒吞下。集簡方

節，開痛不可忍，漸至斷落，用龍麻子一枚去皮黃，連一兩剉豆大，以小瓶子入水一升，同浸春夏二日，秋

冬五日後，取龍麻子一枚，镑破，面東以浸藥水吞之，漸加至四五枚，微利，不妨，瓶中水盡，更添兩月後喫。

常山氣味苦寒有毒

別錄曰辛微寒。普曰神農岐伯苦桐君辛有毒。李當之大寒。權曰苦有小毒。炳曰得甘草吐瘧之才。曰畏王札。大明曰忌葱菜及菘菜。伏砒石。

熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆

本經療鬼疧往來水脹洒洒惡寒鼠瘻。別錄治諸瘧吐痰涎治項下瘤癰。

蜀漆氣味辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒。元素曰辛純陽炳曰桔梗爲之使才。曰栝樓爲之使惡貢眾。

主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞積

權破血洗去腥與苦酸同

用導膽邪素

元發明數曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之。頤曰常山蜀漆爲治瘧之最要外臺乃用三兩作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒。時珍曰常山蜀漆有劫痰散表邪及提出陽分之後用之得宜神效立見用失其法真氣必傷夫瘧有六經瘧五臟瘧溼食積瘧鬼

邪諸瘧須分陰陽虛實不可一槩論也

常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則下行必泄不致吐也。得甘草則吐得大黃則利得烏梅鱗鯉甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨

附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或停諸心下或結澼脇間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用

水在上焦則常山能吐之水在腸下則常山能破其澼而下其水但須行血藥品佐助之必收十全之功

其有純熟發瘧又蘊熱內貫之證投以常山大便點滴而下似泄不泄者須用北

大黃爲佐泄利數行然後獲愈也。又待制李燾云嶺南瘴熱所感邪氣多在營衛皮肉之間欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可但氣吐人惟以七寶散令服之卽不吐且驗也。

附方

舊三新二十五

截瘧諸湯

粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡○養生主論王隱者嘔瘧湯云予用此四十年奇效不

能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮鹽乾知母貝母草果各一錢半水一鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服

截瘧諸酒三日分作三服平旦一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服之。宋沈經心錄醋醡湯治閑日瘧支太醫云乃桂廣州甚驗。恒山一錢

二分大黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半曰醇發日五更溫服再以水一盞煎滅半曰醃未

發時溫服○虞搏醫學正傳治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香

截瘧諸丸千金方恒山丸治數年不瘥者兩劑瘥一月以

來者一劑差恒山三兩研末雞子白和丸梧子大瓦器煮熟殺腥氣則取鹽乾收之每服二十丸竹葉湯

下五更一服天明一服發前一服或吐或否卽止○肘後丹砂丸恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵

百下丸梧子大先發時三丸少頃再服三丸臨時服三丸酒下無不斷者○曾世榮活幼心書黃丹丸治

大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅搗核瓦焙一兩爲末橘米粉糊丸梧子大每服三五十丸涼酒下隔

一夜一服平旦一服午後方食○葛洪肘後方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜丸梧子大先發

時服十六次服七丸後服五六丸以瘥爲度○和劑局方治療仰丸治一切瘧常山四兩炒存性草果二兩

炒存性爲末傅糊丸梧子大每臥時冷酒服五十九丸五更服忌燭羊熱物○又勝金丸治一切瘧胸膈

停滯發不愈者常山八兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小雞骨恒山雞心橫榔各一兩生研鰓鯉甲煨焦一兩半爲末橘粉糊丸菜豆大黃丹爲衣每服三五十丸如上法服

厥陰肝瘻

寒多熱少喘息如死狀或少

不拘遠近大小雞骨恒山雞心橫榔各一兩生研鰓鯉甲煨焦一兩半爲末橘粉糊丸菜豆大黃丹爲衣每服三五十丸如上法服