

景岳全書卷之五十八宙集

古方八陣

會稽 張介賓

會卿著

會稽 魯超

謙菴訂

熱陣

仲景理中丸

即名人參理中湯○治太陰即病自利不渴陰

寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘧疾瘴氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參

白朮

炒

乾薑

炒

炙甘草

各三兩

右四味搗篩為末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫

服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法

以四物依數切用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

○原論加減法詳在霍亂門述古條中實按右方兩數乃漢

時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯

治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房

腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯有芍藥茯苓

即前方加制附子一二三錢隨宜用之其有寒甚勢急者

無甘草乾薑

附子理中丸

治陰寒腎氣動者

即前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯

治中脘停寒喜辛物入口即吐即噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢○

若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯

治脾肺俱虛欬嗽不已

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味 等分

右咀每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局胡椒理中湯 治脾胃虛寒氣不宜通欬喘逆氣虛痞噎

悶脇腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮 五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

萆撥

陳皮

細辛

欬冬花 去梗各四兩

右咬咀每服五錢水一鍾半煎七分食遠溫服○或煉蜜

丸桐子大每服三五十九白湯溫酒米飲任下無時每日二

服

選八味理中丸 七

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐

泄瀉

人參

乾薑炒各一兩

白朮四兩炒 白茯苓

麥芽炒二兩 甘草炙

神麴炒

砂仁炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一九薑湯嚼下

枳實理中丸八 治傷寒寒實結胸

人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑各二兩枳實十六片

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三

服

理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不

實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統澹歸源也

人參

白朮炒

乾薑炮

茯苓各二兩

炙甘草一兩半夏制三兩

薑湯煮麴糊丸桐子大每服四五十丸白湯送下

治中湯

治脾胃不和嘔逆

亂中滿虛痞或泄瀉○此即

理中湯加青皮陳皮也

人參

白朮

乾薑炮

炙甘草

青皮

陳皮等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香溫中湯

治同前

即前治中湯加丁香去半夏

良溫胃湯

治憂思結聚脾

肺氣凝元陽受損大腸與胃

氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊滿

附子制

厚朴

當歸

白芍藥

人參

甘草炙

陳皮

各一錢

乾薑

炮一錢

用椒

去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣溫胃湯十三 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻

人參

澤瀉各三分

益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃

各四分

黃芪

陳皮

各七分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

仲景

四逆湯十四

又名通脈四逆湯

○治傷寒陰症自利裏寒

外熱脈沉身痛而厥

甘草

炙二兩

乾薑

炮三兩

附子

一枚破八片生用

右咬咀以水三升煮取一升二

合分二次溫服其脈即出者

愈○面色赤者加葱九莖○腹中痛者去葱加芍藥二兩○

嘔者加生薑二兩○咽痛者加桔梗一兩○利止脈不出者

加人參一兩

仲景

四逆加人參湯十五

治傷寒

惡寒脈微而復利

即於前方內加入參一兩

仲景四逆加豬膽汁湯十六 治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘

急脉微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

仲景茯苓四逆湯十七 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

一茯苓六兩 人參一兩 甘草炙二兩 乾薑一兩半

附子一枚生用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去渣溫服七合日三服

茱萸四逆湯十八 治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸湯泡 附子炮 乾薑各二錢 炙甘草錢半

水一鍾半煎七分熱服

韓氏茵陳四逆湯十九 治發黃脉沉細遲肢體逆冷腰已上自

汗

茵陳 二兩

炙甘草 一兩 乾

薑 炮兩半 附子 一個炮作八片

右分四貼水煎服

仲景當歸四逆湯 二十

治傷寒手

足厥寒脉細欲絕者或下利

脉大腸鳴者虛也及其人內有

久虛者宜當歸四逆加吳茱

萸生薑湯主之

當歸

桂枝

芍

藥

細辛

各三兩

甘草

通草

各二兩

大

棗

二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去

滓溫服一升日三服

四逆散 二一

方在散陣二八

治陽邪亢熱血脉不通四肢厥

逆

仲景附子湯 二二

治少陰病得之

一二日口中和其背惡寒者

當灸之附子湯主之并治少陰

病身體痛手足寒骨節痛脉

沉者

附子

二枚去皮破八斤

人參

二兩

芍藥

茯苓

各二兩

右五味以水八升煮取二升去渣溫服一升日三服

三附子湯

二三 治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著

四肢緩縱

附子

生用

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參

乾薑

各三兩

白朮

一兩

右咬咀每服四錢水煎服

生附湯

二四

治寒溼腰痛

附子

生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾薑

炙甘草

各一錢

蒼朮

杜仲

薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯 二五

方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

景仲術附湯 二六

方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯 二七

方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生術附湯 二八

方在補陣四三

治寒溼腰冷重痛小便自利

金匱桂枝附子湯 二九

治傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不

能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者

桂枝

四兩去皮生

薑 三兩切

附子

三枚炮去皮各破八斤

甘草

三兩炙

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

金匱白朮附子湯 三

治傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉虛浮而滿若大便堅小便自利者去桂枝此方主之

白朮二兩

附子

一枚泡

甘草

炙一兩

生薑

一兩半切

大棗

六枚

右五味以水三升煮取一升去渣分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿性卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯 三

治風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快惡風不欲去衣或身微腫者此主之

甘草

炙

白朮

各二兩

附子

二枚炮

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服初服得

微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服六七合

爲妙

良方薑附湯 三二

治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

用此藥救之 此卽仲景乾薑附子湯

乾薑 一兩

附子 一兩生用

右每服半兩水煎

外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯 三二

治嶺南瘴厲內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼主卒中

風

附子 一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微溫服

乾薑附子湯 三四

治瘴毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻大冷

身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐汗出惡風

大附子 一枚製分四服

右每服加炮乾薑同煎溫服熱甚者冷服

^{寶鑑}羌活附子湯 三五

治呃逆

羌活

附子

乾薑 炮

茴香 各一錢

木香 五分

水鍾半棗二枚煎服 三因方木香作丁香

附子藥甘草附子湯 三六

治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥

甘草 炙各三兩

附子

一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去渣分溫服

活附子八味湯 三七

治氣虛中寒脚氣等症

附子 炮

去皮

人參

乾薑 炮

芍藥

茯苓

甘草 炙

桂心

各二兩白朮 四兩

右每服五七錢水一鍾半煎七分食前溫服 又方去桂心

加乾熟地黃三兩

六物附子湯

三八

方在外科三五

治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小水不利

小建中湯

二九

方在補陣二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢酸疼咽乾口燥等症

大建中湯

四一

方在補陣二四

治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛

八味大建中湯

四一

方在補陣二五

治中氣不足厥逆嘔吐攣急陰縮腹痛虛火等證

三建湯

四二

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大

小便數滑凡中風潮涎不省人事傷寒陰證皆可用之

大附子

大川烏

天雄各製用三錢

右用水二

鍾薑十片煎一鍾不拘時或溫服或冷服○目汗

加桂浮小麥○氣逆加沉香○胃冷加丁香胡椒

^{仲景}炙甘草湯

四三

一名復脈湯

治傷寒脈結代心動悸

炙甘草

四兩

生薑

桂枝

去皮各三兩

人參

阿膠各

二兩

生地黄

一斤

去心

牛麻子

仁半斤

大棗

十二枚劈

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣內膠烱盡溫服一升日三服

^{仲景}桂枝甘草湯

四四

治發汗過多其人叉手自冒心心下悸

欲得按者

桂枝

皮四兩

甘草

二兩

右二味以水三升者取一升去渣頓服

^{陶氏}

回陽逐本湯

四五

治陰盛格陽陰極發躁渴而面赤欲坐

泥水中脉則無力或脉全微欲絕者○服後脉微出者生頓

出者死

人參

制附子

炮薑

炙甘草

五味子

麥冬

陳皮

臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗爲效

華陀救脫陽方

四六

治寒中三陰口噤失音四肢強直攣急

疼痛似中風及厥逆唇青囊縮無脉或卒倒屍厥脫陽等證

先急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨濟下以二包更替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸溫乃可生也

次用附子一個重一兩者切八片白朮乾薑各五錢木香二錢同用水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾又進一服或煎