

東醫西寶鑑

卷六



訂正東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫憲勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小便

小便原委

靈樞曰水穀者常並居胃中成糟粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉。內經註曰水液自迴腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而為尿以泄出也。難經註曰水穀自小腸盛受於闌門以分別也其水則滲灌入於膀胱上口而為溲便詳此三說則小便即泌別之水液滲入膀胱以出者也內經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則小便又似水飲精微之氣上升脾肺運化而後成者也夫溲尿者水也水之下流其性則然也飲入於胃其精氣雖上升其本體固不能上升則豈可謂小便獨為氣化所成

哉內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣且水者氣之子氣者水之母氣行則水行氣滯則水滯或者謂小便純由泌別不由運化蓋不明此理故也

東垣

脬爲尿管

膀胱雖曰津液之府至於受盛津液則又有脬而居膀胱之中焉故內經曰脬移熱於膀胱

靈樞曰膀胱之脬薄以懦類纂曰膀胱者脬之

室也夫脬之居於膀胱也有上口而無下口津液

既盛於脬無由自出必因乎氣化而後能漸漬浸

潤於胞外積於脬下之空處遂爲尿以出於前陰

也若曰脬下無空處則人尿急時至廁安能即出

乎夫惟積滿脬下之空處而不可再容故急急則

至廁即出

矣

東垣

辨尿色

水液渾濁皆屬於熱。小便黃者小腹中有熱也。肝熱病者小便先黃。足陽明之脈病氣

盛則尿色黃。內經。疸證小便如黃柏汁。仲景。

小便有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之自

脉法

色乃下元虛冷資生。下焦無血小便澀數而黃正傳。小便不禁赤者有熱白者氣虛丹心。

少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋。腎脉

滑實為癰癰仲景。遺精白濁當驗於尺結乳動

緊二證之的脉訣。小便血則乳動則赤黃實脉癰

閉熱在膀胱脉訣。兩尺脉洪數必便濁遺精正

傳。淋脉盛大而實者生虛細而澀者少脉經。

癰病脉細不治綱目。淋病之脉細數何妨少陰

微者氣閉膀胱女人見之陰中醫鑑。

生瘡大實易愈虛澀則亡醫鑑。

小便難外候

候其鼻頭色黃者小便必難仲景。候其鼻準色黃者知其小便難也正傳。

小便不利

陰虛則小便難仲景。小便澀者血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜

補陰降火四物湯方見血門加知母黃柏丹心。

下焦無血小便澀數而黃四物湯加知母黃柏牛

膝甘脾丹心。小便澀難者出不快也經曰陽入

陰分則膀胱熱而小便澀難惟陰分虛而陽熱乘之

若小便黃赤則萬全木通散利之入門。小便數而不利者有三若大便泄瀉而津液澀少者一也宜利而已若熱搏下焦津液不能行者二也必滲瀉乃愈若脾胃氣澀不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而由宜茯苓琥珀散目。○上盛下虛小便赤澀或欲成淋宜清心蓮子飲方見消渴導赤散方見五藏。得效。○腎虛小便數而澀如欲滲之狀宜平補丸直指

萬全木通散

治膀胱有熱小便難而黃滑石二錢木通赤茯苓車前子炒瞿麥各一錢右為

末水煎服或取末

三錢水調服入門

茯苓琥珀散

治小便澀數宜滲泄分利之澤瀉一兩滑石七錢赤茯苓白朮琥珀猪苓各五

錢肉桂甘艸各三錢右為末每三錢以

長流甘爛水一盞調下以美饌壓之綱目

平補丸

治小便數而澀如欲滲漏或遺尿不禁兔絲子酒製山茱萸酒浸煨當歸益智仁各五錢

川鍊肉牛膝胡蘆巴炒杜仲薑汁炒巴戟肉茯苓

酒浸各三錢半乳香二錢右為末糯米糊和丸梧

子大棗湯或鹽湯下五十丸直指

一方治心經蓄熱小便赤澀梔子仁大黃煨連

翹甘艸各等分右剉五錢水煎服湯液

小便不通胞移熱於膀胱則癃尿血內經○膀胱不利

為癃內經八正散加木香主之丹心○足厥

陰之脈過陰器所生病遺尿閉癃者尿者女子人

繫其孔其孔尿孔之端也其生病癃者遺尿三焦

者足大陽之別也入絡膀胱約下焦實則癃閉虛

則遺尿綱目○閉癃令而言之病也分而言之

有暴久之殊蓋閉者暴病為尿點滴不出俗呼小

便不通是也癃者久病為尿澀淋瀝點滴而出一

日數十次或百次名為淋病是也綱目○熱在下

焦與塞不便其證小便閉塞而不渴時見躁者是

也元素○小便不通有氣血之異如渴而小便不

通者熱在上焦氣分宜清肺散如不渴而小便不

通者熱在下焦血分宜滋腎丸東垣小便不通
臍下狀如覆碗痛悶難堪治法有二如氣不能化
而不通則陳皮茯苓湯調木香沈香末二錢空心
服兼用吐法以提之如血汚於下而不通則用桃
仁承氣湯之類方見寒門以破之綱目。夫熱則
不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絕無其熱微
者小便難而僅有直指。小便不通乃血澀致氣
不通而竅澀宜導氣除燥湯東垣。○小便不通宜
五苓散方見傷寒導赤丸地膚子湯宣氣
散通關丸猪苓湯加味五苓散透泉散
八正散治膀胱熱積小便癰閉不通大黃木通瞿麥
篇蓄滑石施子車前子甘艸各一錢右剉作
一貼入燈心一錢
空心水煎服局方
清肺散治渴而小便閉猪苓通艸各一錢半赤茯苓
澤瀉燈心車前子各一錢篇蓄木通瞿麥各
七分琥珀五分左右剉作
一貼空心水煎服東垣

滋腎丸

治不渴而小便閉黃柏知母並酒洗焙各一兩肉桂半錢右為末水丸梧子大空心自湯

下百丸

東垣一名泄腎丸。一人病小便不通腹

脹腳腫雙睛凸出晝夜不眠苦痛不可言且苦嘔

噦寒醫無效東垣曰膀胱者津液之府氣化則能

出矣小便癰閉是無陰而陽氣不化者也此人奉

養太厚膏梁積熱故膀胱者腎之府久而乾澀小

便不化今內關外格之病悉具矣在朝夕但治下

焦其疾自愈遂處此方服

之須臾尿出如涌泉即差

導氣除燥湯

治小便不通赤茯苓一錢半黃柏一錢二分滑石知母澤瀉各一錢右剉作一

貼入燈心一錢空

心水煎服東垣

導赤丸

治膀胱有熱小便不通大黃一兩半炒梔子一兩二錢木通生乾地黃各八錢赤芍藥赤

茯苓滑石各四錢右為末蜜丸梧子大以導赤

散方見五藏煎水空心吞下三五十九直指

地膚子湯

治下焦熱結小便不通地膚子一錢知母

藥各七分右剉作一貼空心水煎服。女人房勞後小便不通脉沈細用猪腎半隻同煎服最效。

宣氣散

治癰閉急痛甘艸梢木通各三錢梔子二錢葵子滑石各一錢右末二錢燈心湯調下。

通關丸

治小便不通黃柏知母並酒炒滑石各二兩木通一兩肉桂三錢右為末水丸梧子大空

心自湯下百丸 醫鑑

猪苓湯

治熱結小便不通猪苓木通澤瀉滑石枳殼黃柏酒浸半膝麥門冬瞿麥篇蓄車前子各

一分甘艸三分右剉作一貼入燈心一錢空心水煎服 同春

加味五苓散

治虛寒小便不通五苓散料等分加當歸枳殼牛膝木通甘艸梢亦等分右剉

入燈心一撮空心同煎服 同春

透泉散

治小便赤澀不通滑石一兩芒硝甘艸各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心

煎湯調下
總錄

老虛人癰閉

年老人小便不通多是氣短血虛四物湯加黃芪煎水吞下滋腎丸空心回春

○老人氣虛小便不通四物湯加黃芪人參吞下滋腎丸正傳○老人虛人小便不通琥珀末以人

參赤茯苓煎湯調空心服丹心

癰閉宜吐

小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋

氣承載其水也氣虛用參朮升麻血虛用四物痰多二陳皆先服後探吐之實熱當利之用八正散方見上○一人病小便不通諸藥無效丹溪曰此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞比如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之病如失溺

○痰多阻滯水道不通二陳湯加香附子木香木
通煎之先服一盞以餘渣探喉中吐之以提其氣
氣升則水自降○實熱不通砂糖水
調黑牽牛未一二錢服探吐之入門

癃閉宜瀉

實熱癃閉用八正散蓋大便動則小便自
通矣方心○水道不行其本在腎合用牽

牛澤瀉其未入肺合用葶藶桑皮夏以木通滑石
佐之又能透達雖然大使小便使脉絡相貫人有多
日小便不通但用神僦丸方見氣門輩大瀉數行
小便自通直指○實熱尿閉宜用導水丸三花神
口門祐丸並見

轉脬

證轉脬證候脬下急痛小便不通凡強忍小便或
尿急疾走或飽食忍尿或飽食走馬或忍尿入

房便水氣上逆氣迫於脬故屈戕而不得舒張也
脬落即殂直指○轉脬證候孕婦多有之患在忍
縮小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸
之氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀

膀胱淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻
 併似痢非痢必以手按臍下庶可立出小便甚者
 因此腹脹浮腫治法用涼藥疎利小腸中熱仍與
 通泄大腸迨其腹中攪痛大便大下則尿管隨卽
 歸正小便復自然順流直指。胎婦轉脬之病稟受
 弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古
 方用滑利疏導藥鮮有應效因思脬爲胎所墮展
 在一邊脬系了戾不通爾胎若舉起懸在中央脬
 系得疏水道自行一婦患此診之兩手似濇重取
 則弦此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲遂以
 四物湯加參朮半夏陳皮甘艸生薑空心煎服隨
 以指探喉中吐出藥汁痰少頃又與一貼次早亦
 然如是與八貼而安此法恐偶中後歷用數人皆
 驗丹溪。轉脬宜二石散加木通車前子等分煎
 服仍施陰陽熨法入門。轉脬用蒲黃散滑石散
 蔥白湯。老人脬轉困篤欲灸六味地黃丸倍澤
 瀉服之效。方見虛勞。
 孕婦脬轉宜參朮飲。不引外氣動母寒水不引胎氣

二石散

治脬轉八九日不得尿滑石寒水石葵子各一盞水十盞煎至五盞空心分二服入門

蒲黃散

治脬轉不得尿蒲黃滑石各等分爲末每二錢雞子清調下總錄

滑石散

治脬轉不得尿寒水石二兩滑石亂髮灰車前子木通各一兩葵子一合右剉水一斗煮

取五升每服一升日三次即通得效

蔥白湯

治小便卒暴不通小腹膨脹氣上衝心悶絕欲死此因驚憂暴怒氣乘膀胱鬱閉而脬系

不正陳皮三兩葵子一兩蔥白三莖右剉水五升煮取二升分三服得效

參朮飲

治孕婦轉脬小便不通四物湯料加人參白朮半夏陳皮甘艸各一錢右剉作一貼入生

薑三片大棗二枚水煎空心服服後探吐之丹溪

一方葵子梔子炒滑石各五錢木通三錢右剉

作一貼水煎空心服外以葵子梔子滑石爲細末

入田螺肉麝膏或生蔥汁調貼臍中立通正傳○

關格證

一孕婦九月轉胎尿閉脚腫形瘁脉左稍和而右
溫此必飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱
故閉而不通以人參白朮當歸芍藥陳皮半夏甘
艸煎服四升次早煎渣頓服探吐小便大通皆黑
水丹溪○一孕婦轉胎脉細氣弱胎壓膀胱下口
用補藥恐加急滿令產婆以香油抹手入產門托
起其胎尿出如注丹溪○又法將孕婦倒
豎起胎自墜轉其尿注出勝於手托丹溪
邪在六府則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣
留之則陽脉盛矣邪在五藏則陰脉不和陰脉
不和則血留之血留之則陰脉盛矣陰氣太盛則
陽氣不得相營故曰格陽氣太盛則陰氣不得相
營故曰關陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者
不得盡其命而灰矣靈樞○關則不得小便格則
吐逆關者甚熱之氣格者甚寒之氣無出曰關無
入曰格寒在胃中過絕不入熱在下焦填塞不便
潔古○陰陽易位病名關格寒在胃中水漿不下
故曰格熱在丹田小便不通故曰關雲岐○關者

不得小便格者吐逆上下俱病也綱目。內經曰

人迎脈大於氣口四倍名曰格氣口脈大於人迎

四倍名曰關。兩寸俱盛曰關格其證嘔逆而小

便不通者是也正傳。此證多夾寒在上熱在下

死也丹心。大小便不通亦謂之陰陽關格乃三

焦約之病也凡大小便不通內經謂之三焦約約

者不行也長流水煎八正散服之類聚。胸格者

謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降欲食不食

此為氣之橫格也醫鑑。關格宜芒硝湯大承氣

湯方見寒門中虛者補中益氣湯加檳榔以升降

之痰格者枳殼二陳湯

芒硝湯治關格不通芒硝二兩半滑石三兩冬葵子

至半入芒硝一錢再炒三合右以滑石葵子為麤末取五錢水煎

一沸空心服總錄

枳縮二陳湯治關格上下不通此痰隔中焦也服此

出痰枳實一錢川芎八分縮砂白茯苓

貝母陳皮蘇子瓜萐仁厚朴優香附子各七分木
香沈香各五分甘艸三分右除二香剉作一貼薑
三片同煎入竹瀝及沈香木醫鑑

關格宜吐瀉

關格必用吐以提其氣之橫格不必在
出痰也有痰者二陳湯方見痰飲探而

吐之中氣虛而不運者補中益氣湯加木香檳榔
以升降之升心○陰陽關格前後不通大便快利

則小木自行鉤支○關格死在朝夕但治下焦可
愈宜大承氣湯方見寒門○入門○一婦人忽吐

逆大小便不通煩亂四肢漸冷無脉與大承氣湯
一劑至夜半漸得大便通脉漸和翌日乃安此關

格之病極為難治垂死而活只此一人耳孫兆○
關格忌用淡滲利小便之藥入門○一小兒小溲

不通號跳旋轉下則成砂石大便祕肛門脫出一
二寸戴人曰此下焦塞也不吐不下則下焦何以

開不令飲水則小溲何以利以調胃承氣湯一兩
加牽牛子頭末三錢河水煎服又用瓜蒂末糊丸

芥子許六十丸吞下上吐下瀉一時齊出有濃有
血涌泄既定令飲新水二三十次每次飲一盞其
病如失
子和

洗熨法

陰陽熨法又名冷熱熨法治脬轉及二便不通
先以冷物熨小腹幾次後以熱物熨如前

數又以冷物熨之自通
生薑蔥白紫蘇葉各一握煎湯密室內熏洗小腹
外腎肛門等處再溫再洗拭乾於綿襖仰坐垂腳
自舒其氣次用赤茯苓赤芍藥白芍藥各五錢蜀
葵子二錢半右剉一兩煎水調蘇合香丸方見氣
門三丸并青鹽末半錢空心溫服即效
便難小腹脹不急治殺人蔥白三斤細剉炒熱以
帕子包分兩裹更替熨臍下即通
半片囊盛熨臍下亦通
脹如鼓悶亂不省此由產時尿脬運動不順用鹽
填臍中蔥白十餘根細切厚鋪鹽上用大艾
炷灸之覺熱氣直入於腹內即通神驗