

活人慈航

八十

家藏 小兒科書 目錄

望色審苗竅

面色

唇爪

鼻舌

目神

形體

聲音

問症

小兒救時

決死生

五臟補瀉法

三陰三陽

三焦

藏衣法

初生胎疾

初生不啼

眼不開

目胞赤爛

不乳

吐不止

不小便

不大便

大小便不通

肛門外合

禁口

臍溼臍瘡

臍風

胎瘤

胎赤

初生無皮

吐乳

咽喉

內吊

龜胸

五軟

二驚

一白

撮口

臍突

胎驚

胎黃

赤遊丹

夜啼

口舌病

天吊


盤腸氣痛

龜背

五硬

解顛

一白



驚

癰症

天鈞

疔 附勞瘵

震亂

泄瀉

疝氣偏墜

腹脹

傷風中風傷寒中寒

夾食

溫病 溫病冬溫

暑病

燥邪

驚

瘧病瘧癰

驚癰發搐

吐瀉

嘔吐

腹痛

積塊

水腫

夾痰

夾驚

風溫溫瘧溫毒溫疫時疫

淫邪

身熱



瘡疾

氣喘

熱目冷目

黃痘

大小便

風痺

咳嗽

癰疹癰痧

失血

自汗盜汗

痿病

平素或偶發時疫人人皆病或只數人而已或只在某方
或只在一家皆是也各有成法照專門調治其中有最甚
者如大頭瘟蝦蟆瘟楊梅瘟瘟黃烏痧例於後

大頭瘟者憎風壯熱體重面目紅腫目不能開口乾舌燥咽
喉不利是也先宜荅連消毒飲次服普濟消毒飲主之清
散已後可加大黃以微下之則愈外用紫金皮荊芥白芷
歸尾花粉苦參甘草煎湯薰洗神效

蝦蟆瘟者憎寒發熱喉痺頸大腹脹是也宜荊防敗毒散主
之

楊梅瘟者憎寒發熱遍身紫塊忽然發如楊梅瘡是也宜清
熱解毒湯送下人中黃丸並刺塊出血

瘟黃者卒起憎寒發熱頭痛煩渴小便赤通身面目俱黃是
也死人最急宜雙解散加茵陳形衰脈虛者除溼湯加茵

陳梔子主之

烏痧者卒起脣爪色黑是也有烏痧閉肺氣緊喘促脣爪色黑宜痢痧丸有烏痧閉竅忽然卒倒不知人事脣爪色黑外吹通關散內服痢痧丸有烏痧閉氣卒發心腹疼痛痛極難忍脣爪色黑舌生黃胎宜痢痧丸十香散主之

暑病

夏至以後處暑以前炎暑司令傷之者為暑病暑邪傷心從口鼻吸氣而入當時發病為傷暑當時不即發病暑毒內伏至秋涼風引動而出發為伏暑瘧疾然秋主涼而反熱名曰秋暑治同

暑病輕者謂之冒暑重者從三焦發出三陽肌肉之分謂之傷暑甚者入五臟謂之中暑受暑熱又受寒冷寒閉其暑熱謂之閉暑因暑熱而乘涼冒風飲冷而得病謂之陰暑

暑有夾熱夾溼夾風夾寒以及夾驚夾食夾痰傳變如六經同暑邪忌汗忌下

治暑之法首別暑盛溼盛為要暑盛者自有陽熱之症候溼盛者自有陽氣衰弱之情狀有發揚於表者有相搏於裏者發揚於表則頭痛身熱惡寒相搏於裏則吐瀉痞脹腹痛

暑邪發揚於表則身熱煩心自汗口渴小便赤脈虛是也宜竹葉通草益元散主之暑盛者大熱大渴大汗出小便赤脈虛而兼洪宜人參白虎湯主之汗大者不可利小便身熱煩渴小便赤自汗出脈虛手足厥冷者此熱極反化也名熱厥宜人參白虎湯主之身熱煩渴小便赤自汗其脈沈疾者宜蒼朮白虎湯此暑熱夾溼也身熱煩渴小便赤惡寒無汗皮膚乾燥脈浮者此暑夾風寒也無汗者不可

用白虎湯宜柴葛湯加黃連香茹主之或身熱自汗手足
搐搦名曰暑風宜香茹飲加羌防全蝎主之有暑邪發揚
於表而溼盛者大熱水瀉煩心口渴自汗小便赤宜黃連
香茹飲發熱大渴小便赤少一身疼痛舌白脣淡者宜五
苓散主之有暑熱傷氣者身熱煩心口渴小便赤大便溏
四肢困倦精神減少胸滿氣促自汗惡食面脣痿黃脉虛
宜清暑益氣湯主之有暑熱傷津液者必氣短似喘口渴
渴或脉欲絕宜生脉散主之

暑邪相搏於裏者則吐瀉霍亂煩渴腹痛均宜香茹飲主之
吐甚者香茹飲調益元散瀉甚者香茹飲調五苓散吐瀉
霍亂寒熱交作倦怠嗜臥宜六和湯主之或吐瀉煩躁口
渴身熱肢冷脣色淡者六和湯主之或吐瀉煩渴身熱自
汗頭重小便赤者五苓散主之若身熱吐瀉煩渴自汗困

倦神昏頭重者宜十味香茹飲此暑溼傷氣也有閉暑者吐瀉霍亂煩躁不甯四肢厥冷汗出如雨脉虛口渴引飲小便赤宜黃連香茹飲冷服此冷水閉遏暑熱也或吐瀉痞脹煩躁肢冷寒熱不能分辨者宜來復丹此寒暑相搏也凡傷暑症皆煩渴舌白脣淡脉虛為徵

陰暑者因受暑熱又感寒冷而傷陽氣也其症身熱煩躁吐瀉厥冷口渴但以舌白口不乾燥脣爪淡白脉虛汗出有此陽虛之症則不可用香茹黃連矣宜大順散寸金丹甚者漿水散

冒暑者咳嗽鼻塞流涕頭痛身熱汗出煩渴小便赤是也此暑風傷上焦肺經宜香茹杏仁滑石竹葉通草連喬桔梗甘草花粉熱渴盛加石膏無汗加薄荷痰多氣喘佐枳殼丸主之

中暑者卒然昏不知人手足不搐是也此暑熱夾痰壅閉心
包絡所致先用通關散吹鼻以開其竅醒後用香茹飲調
蘇合香丸

伏暑者內伏暑毒至秋又感涼風寒水引動伏邪發為瘧疾
先寒後熱煩渴小便赤或日早或日晏或間日初起無汗
皮膚乾燥者宜柴葛湯加細辛以發汗有汗出者柴葛湯
加桂枝知母若無汗便閉宜雙解散汗下之寒多者柴胡
桂枝湯熱多者桂枝白虎湯腹滿便閉者大柴胡湯汗下
已透宜清脾飲青蒿散截之瘧疾日久不止浮腫脹滿者
宜清脾飲加麻黃以發汗脉微肢冷更加附子伏暑有相
搏於裏寒熱瘧來吐瀉煩躁宜六和湯寸金丹

溼邪

溼邪四時皆有惟夏秋為盛溼土司令雨溼流行溼從口鼻

吸氣而入幼小亦有感溼稍大之兒涉溼飲水內外更有傷溼

有風溼 寒溼 溼熱 溼溫

溼邪為病一身盡痛身重骨節疼痛在幼小不知一身疼痛但觀其面黃脣淡四肢不舉不能轉側啼哭愛人懷抱是也溼邪忌汗忌下宜利小便

溼盛則濡泄其症水瀉小便不利腹滿身重口渴脣淡宜胃苓湯主之泄瀉小便不利口渴脣淡者宜五苓散

風溼者必身熱骨節疼痛掣痛不能屈伸惡風或身微腫者宜除溼湯加桂枝主之或身熱惡風汗出四肢不舉不能轉側小便不利者宜五苓散主之風溼在表通身浮腫身熱惡風脉浮者宜五皮飲加麻黃紫蘇車前仁米杏仁以發汗

寒溼者泄瀉不渴嘔惡腹痛脣爪青白脉沈微是也宜理中湯主之肢冷术附湯若寒熱吐瀉不渴宜寸金丹主之溼熱者身熱心煩口渴泄瀉自汗小便短赤脉滑數者宜桂苓甘露飲主之若身熱面目黃爪甲黃小便黃宜除溼湯加梔子茵陳黃柏或茵陳五苓散主之若身熱煩渴小便赤少泄瀉者柴苓湯主之

溼溫者先傷於暑後中於溼暑溼相搏發為溼溫切忌汗下其症壯熱二足逆冷妄言多汗腹滿頭重宜蒼朮白虎湯主之溼溫但二足脛冷而手不冷為辨

燥邪

秋主燥凡傷寒時疫溫病熱病每多化燥故四時皆有燥病秋燥從口鼻吸氣而入只傷上焦肺胃而無傳變

燥病必口渴咽乾氣逆喘急咳嗽連聲不已咳痰難出胸膈

引痛是也治法必用甘潤以滋津液為主

有風燥 熱燥 虛燥

風燥者頭痛鼻塞流涕乾咳無痰咽乾口燥是也宜敗毒散
加天冬麥冬玉竹沙參花粉胡麻若有汗出者宜天冬麥
冬桔梗玉竹沙參花粉虫退甘草胡麻去風潤燥為主
熱燥者身熱煩渴鼻塞咳嗽不能已咳痰難出氣喘胸滿唇
紅宜加減雙解散潤肺丸主之有汗出者加味瀉白散清
肺湯主之

虛燥者必因傷寒時疫溫熱病過服汗下消食消痰藥或熱
病大汗痘瘡癩瘍之後必有咳嗽咽乾口燥咳痰難出身
熱或肺痿吐痰不食等病宜阿膠散麥門冬湯主之
敗毒散

羌活 獨活 前胡 枳殼 桔梗 薄荷 川芎

甘草

紫蘇

常用效

本方無紫蘇有柴胡茯苓

杏蘇散

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

甘草

乾葛

杏仁

前胡

枳殼

桔梗

本方有木香人參

華蓋散

四時風寒氣喘

麻黃

杏仁

甘草

石膏

前胡

枳殼

黃芩

紫蘇

陳皮

柴葛湯

柴胡外半

乾葛外半

黃芩外半

羌活外半

防風外半

花粉外半

薄荷

不重退不甘草外半

有汗去薄荷加桂枝白芍

羌活湯

羌活

防風

細辛

白芷

川芎

黃芩

知母

蒼朮

甘草

本方無知母有生地

大柴胡湯

柴胡

黃芩

花粉

枳實

大黃

甘草

生薑

大棗

調胃承氣湯

大黃

朴消

生甘草

四順清涼飲

白芍

當歸

甘草

大黃

等分

三歲兒用二錢煎服

理中湯

人參

白朮

乾姜

炙甘

四肢冷加附子

四逆散

枳實

白芍

柴胡

甘草

為末白湯調服

烏梅丸

烏梅

脂大三百枚

細辛

六兩

乾姜

六兩

黃連

十六兩

當歸

四兩

附子

六兩

川椒

四兩

桂枝

六兩

人參

六兩

黃柏

六兩

用醋浸烏梅一宿去核蒸搗和藥加蜜丸如小豆大每服

十九日三服

涼驚丸

用祖方退潮丸神效

抱龍丸

祖方同功

藿香正氣散

蒼朮 厚朴 陳皮 半夏 茯苓 藿香 紫蘇
白芷 腹皮 桔梗 生姜 宜真藿香乃效

小承氣湯 大黃 枳實 厚朴

瀉白散 泉骨皮 兩桑白皮 兩甘草 桑葉 粳米
每服二錢煎服

加減雙解散 麻黃 石膏 甘草 防風 荊芥

薄荷 前胡 桔梗 花粉 連翹 枳殼 黃芩

梔子 身熱加大黃 痰多加朴消 氣喘加杏仁 桑皮

清燥救肺湯 桑皮 枇杷葉 生石膏 未麥冬 胡麻

杏仁 阿膠 生甘草 棗肉

雙解散 防風 荊芥 麻黃 黃芩 梔子 連翹

薄荷 大黃 朴消 桔梗 甘草 石膏 乾葛

川芎 加生姜葱白