

草綱目

竹



本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下三十九種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡

本經

防風

本經

獨活羌活

本經

土當歸

綱

都管草

圖經

升麻

本經

苦參

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

冰仙

會編

白茅

本經

地筋

州錄

芋

拾遺

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

本經

及已

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白薇

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

欽子股

海藥

吉利草

綱目

硃砂根

綱目

辟虺雷

拾遺

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新一百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二

山草類下三十九種

黃連

本經上品

釋名王連

本經

支連

藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解

別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽

二月八月采根

弘景曰巫陽在建平今西關

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣

者不准用之當布搜去毛令如連珠

孫昇曰苗似珠

茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江

左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州

柳州者佳

顧曰今江湖荆夔州郡亦有而以

宣城九節堅重相擊有聲者爲勝施點者次之東

陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色赤黃江左者

根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根紫如連珠療癆大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州荊州者爲良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍

淡各有所宜

根脩治

穀曰凡使以布拭去肉毛用漿水蘆二伏時瀘出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟

六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經爲治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以米

萸湯浸炒治血分寒中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸洪不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒

別錄曰

微寒普曰

神農岐伯黃帝

雷公苦無毒李當之

小寒之才曰

才曰

黃芩龍骨理石爲之使惡

黃芩
白僵蠶
畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權

巴豆毒權曰

忌豬頭解巴豆毒權

巴豆毒權曰

忌豬頭解巴豆毒權

巴豆毒權曰

忌豬頭解巴豆毒權

肉惡冷水穀曰

服此藥至十兩不得食

豬肉若服

至三年一生不得食也

周珍曰道書言服

黃連花

黃連花

豬肉令人泄瀉而方家有豬肚

黃連丸

豈只忌肉而不忌臟腑乎

主治熱氣

目痛皆傷泣出明日腸澼腹痛下痢婦人陰中腫

痛久服令人不忘

本經

主五臟冷熱久下洩澼膜血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療目瘡

別錄

主五臟冷熱久下洩澼膜血

主五臟冷熱久下洩澼膜血

主五臟冷熱久下洩澼膜血

主五臟冷熱久下洩澼膜血

主五臟冷熱久下洩澼膜血

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸爲丸治

小兒疳氣殺蟲

大明

羸瘦氣急

藏器

治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿

元素

主心病逆而盛心積

伏梁

好古

去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒

時珍

發明

元素曰

黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

陰中陽也入手少陰經其用有六泻心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘧必用三也去風濕四

也赤眼暴發五也止中熱見血六也張仲景治心

種心下痞五等瀉心湯皆用之成無巳曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱孰得

甘則動得苦則安黃連黃蘖之苦以安魄也好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也

實則瀉其子也震亨曰

黃連去中焦濕熱而瀉心

火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之

以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下

痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日

呻之如吐再強飲但得一呻下呻便好

劉完素曰古方以

黃連爲治痢之最益治痢惟宜辛苦寒藥辛能發

散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已

諸苦寒藥多泄惟黃連

黃檗性冷而燥能降火去

濕而止瀉痢故治痢以之爲君

宗奭曰今人多用

黃連治痢蓋執以苦燥之義

下俚但見腸虛滲泄

微似有血便卽用之又不顧寒熱多步惟欲盡劑

由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止

不必盡劑虛而冷者慎勿輕用

某曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸爲君甘草黃芩

爲佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以

酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒亦目花翳用以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘蒸熱洗也韓悉曰火分之病黃連爲主不但瀉心火而與芩蘖諸苦藥列稱者此也此目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣白芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五疳此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢爲要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上晏不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使蕭殺之令常行而伐其生發冲和之氣平素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王水註云酸入肝爲溫苦入心爲熱辛入肺爲清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣爲用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝卽有偏絕則有暴天之道是以經粒服餌之人

不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連若參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熟肝與心爲子母心火也肝亦火也腎孤臟也人憲一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連卮蘖四珠餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言爲法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊

新四十

心經實熱

湯

黃連七錢水

薦半煎一盞食遠溫

一盞半煎一盞食遠溫

水煎

服小兒感之和劑局方

卒熱心痛

黃連

八錢咬咀水煎

外臺秘要

肝火

爲痛

黃連薑斗炒爲末粥糊丸梧子大每服三粒
或白湯下○左金丸用黃連六兩茱萸一兩

同炒爲末

神麌糊丸梧子大每服三四十九白湯下丹溪方

伏暑發熱

作渴嘔惡及赤

白痴

消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

主之川黃連

一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊

九梧子大每服五十丸熟

陽毒發狂奔走不定宣水

下日三服

和劑局方

陽毒發狂

奔走不定宣

等分爲末每服三錢濃

煎甘草湯下易簡方

骨節積熱

漸漸黃瘦黃連

小便五大合浸經宿微煎三四

沸去滓分作二服廣利方

骨節積熱

身瘡蝕

或潮熱肚脹

作渴猪肚黃連丸用豬肚一箇洗淨

梗米上蒸燭石臼搗于杵或入少飯同杵丸綠豆

大每服二十丸朱飲下仍服調血清心之藥佐之

益小兒之病不出于痧則出

于熱常須識此直指方

三消骨蒸

黃連末以冬瓜自然

汗浸一夜晒乾又浸如此七次爲末以冬瓜升和

丸梧子大每服三四十九大麥湯下尋常渴只一

服見効。

易簡方

消渴尿多

肘後方用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下。寶

鑑用

黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒

爲末

水丸梧子大每服五十丸溫水下。崔氏治

消渴

小便滑數如油黃連五兩桔梗根五兩爲末

生地黃

丹丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌

冷水

豬肉、總錄用黃連末入猪

肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下

濕熱水病

黃連末蜜丸梧子大每服二丸至四五丸飲下日三四服

汪方

破傷風病

黃連五錢酒一盞煎

七分入

黃蠟三錢擦化熱服

小便白澀

因心腎氣不足思想

之高文虎蓼花洲閣錄

無窮所致黃連白芍芩等分爲末酒糊丸梧子大

每服三十九煎補骨脂湯下日三服普濟方

水木二升煮取半升露

臥將息一二日即止

熱毒血痢

宣黃連十二兩空腹熱服

水二升煮取半升露

臥將息一二日即止

金方赤痢久下

累治不瘥黃連一兩雞子白和爲餅炙紫爲末以漿水三升慢火煎成膏

每服半合溫米飲下一方只

以雞子白和丸服

勝金方

熟毒赤痢黃連二兩焦當歸一兩焙爲末大麝香少許每服二錢陳

木飲下佛智和尚在闈以此濟人

本事方

赤

白久痢

並無寒蒸只日久不止用黃連四十九箇鹽梅七箇入新瓶內燒烟盡研每服二

錢鹽水湯下。

楊子建護命方

赤白暴痢如鷺鴨所者痛不可忍用黃連黃芩各一兩水

次蒸服

經驗方

冷熱諸痢

不問冷熱赤白穀滯

休息久下

悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半

龍骨如棋子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一

兩半膠一兩半細切以水五合着銅器中去火三

寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九

上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上

九上九下度可得一升類服即止

圖經本草

下痢腹痛

赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行膚綴綻痛以黃連一升酒五

升煮取一升半分再服

肘後方

治痢香連丸

李絳兵部手集治赤白諸

當止綻痛也

蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其

瘻裹急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白

蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其

効如神久者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰孺

皆効○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麵煨一

兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟調子肉○又治小兒濕痢加煨熟肉豆蔻一

錢熟調子肉○又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子吳

劉河間

治久痢加龍骨○朱丹溪治禁口痢加石蓮肉

王氏治痢渴加烏梅

五疳八痢

四治黃連丸用連珠黃連一斤分作

肉以阿膠化和爲丸

四分一分用酒浸炒

一分用自然薑汁炒一分則

吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智研末

白芍藥酒煮切焙用兩使君子仁焙四兩廣木香

二兩爲末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸水飲食

前下日三服忘猪肉

傷寒下痢

不能食者黃連一升烏梅二十枚去

冷水

韓氏醫通

梅

核

灸燥爲末

蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧子

大一服二十丸日三服

又方黃連二兩熟艾如

鴨子大一團水三升煮取一升

頓服立止並附後方

氣痢後重

裏急或下泄杜玉方

薑連散用宣連一錢

乾薑半兩各爲末收每用連

一錢

半錢和勻空心酒下或米飲下

神妙。

濟生方祕傳香連一錢

砂鍋底次鋪香新汲水三盞

四兩以薑鋪砂鍋底次鋪香新汲水三盞

連上鋪香新汲水三盞

煮焙研醋調倉米糊

丸用黃連四兩木香二兩生薑

四兩以薑鋪砂鍋底次鋪香新汲水三盞

連上鋪香新汲水三盞

煑和蜜日服五六次

小兒下痢

赤白多時體弱不

堪以宣連用水濃

爲丸如常日服五六

次

諸痢嘔泄

藏毒下血雅州黃連

子母祕錄

半斤去毛切裝肥豬

大腸內紫定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末

揭腸和丸梧子大每服百粒朱湯下極効

揭腸和丸梧子大每服百粒朱湯下極効

直指

濕痢腸風

百一選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風下血

鴨糞黃連去毛吳茱萸

湯泡過各二兩同炒香鹽蜜各爲末以粟米飯和
丸梧子大各數每服三斗丸赤痢甘草湯下黃連
丸白痢薑湯下茱萸丸朱白痢各用十五丸米湯
下此乃漸西河山繞老方_{良人甚効}○局方皮已
丸治脾胃受濕下痢腹痛朱穀不化用積熱下血
一味加白芍藥同炒研末餅和丸服
聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉
弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一
分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩
爲末麵糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼
水食前送下冬月加酒蒸
大黃一兩楊氏家藏方
丸梧子大每空心陳米酒煮下血黃連酒浸煮熟
飲下四十丸濟生方酒煮下血爲末酒糊丸梧
子大每服三四十九白湯下一方雞冠痔疾黃連
用自然薑汁浸焙妙醫學集成未成未傳
之加赤小豆末用此寬腸黃連枳殼等
尤良斗門方痔病祕結用此末糊丸梧子大每