

百病辨證錄 卷伍
共八本

孫孫氏

增補百病辨證錄總目

卷之一

傷寒門 四十三則

中寒門 七則

卷之二

中風門 二十五則

痺證門 十一則

心痛門 六則

腸痛門 五則

頭痛門 六則

腹痛門 六則

腰痛門 六則

卷之三

咽喉門 七則

牙齒門 七則

口舌門 二則

鼻淵門 三則

目痛門 十二則

耳痛門 七則

血症門 二十一則

遍身骨痛門 四則

卷之四

五鬱門 六則

咳嗽門 八則

喘門 四則

怔忡門 三則

驚悸門 二則

虛煩門 二則

不寐門 五則

健忘門 四則

癲癇門 六則

狂病門 六則

呆病門 三則

呃逆門 五則

卷之五

關格門 五則

中滿門 四則

翻胃門 五則

脰脹門 八則

厥症門 七則

春溫門 三十三則

卷之六

火熱症門 十六則

暑症門 十一則

燥症門 十五則

瘡症門 八則

卷之七

消渴門 五則

瘻瘍門 十一則

汗症門 五則

五癰門 十則

大瀉門 九則

痢疾門 十三則

癰瘕門 八則

虛損門 十二則

癆瘍門 十七則

卷之八

瘧疾門 十則

陰陽脫門 五則

淋證門 七則

夢遺門 七則

小便不通門 六則

內傷門 二十三則

卷之九

大便閉結門 九則

陰瘻門 五則

瘻症門 二十一則

疝氣門 附奔豚八則

小便不通門 六則

瘻症門 二十一則

卷之十

鶴膝門 二則

癘風門 二則

遺尿門 三則

脫肛門 二則

強陽不倒門 二則

發斑門 三則

火丹門 二則

離魂門 三則

瘡夏門 二則

脚氣門 一則

中邪門 六則

中妖門 六則

中毒門 十二則

腸鳴門 三則

自笑門 附自哭 三則

惱怒門 二則

瘡啞門 三則

瘡沒門 一則

種嗣門 九則

……

……

婦人科

卷之十一

帶門 五則

血枯門 二則

血崩門 七則

調經門 十四則

受娠門 十則

妊娠惡阻門 二則

卷之十二

安胎門 十則

小產門 五則

鬼胎門 一則

難產門 六則

血嘔門 三則

胞衣不下門 二則

產後諸病門 十一則

下乳門 二則

卷之十三 外科

背癰門 七則

肺癰門 四則

肝癰門 二則

大腸癰門 三則

小腸癰門 三則

無名腫毒門 二則

對口疽門 一則

腦疽門 一則

囊癰門 二則

臂癰門 一則

乳癰門 四則

疔瘡門 一則

多骨癰門 一則

惡疽門 一則

擎疽門 一則

楊梅瘡門 五則

腰疽門 一則

疔瘡門 一則

脚疽門 二則

鬚疽門 一則

疔瘡門 二則

瘰疬門 二則

痔漏門 四則

疔瘡門 三則

接骨門 二則

金瘡門 一則

疔瘡門 一則

癩門 一則

刑杖門 一則

疔瘡門 一則

卷之十四 幼科

驚疳吐瀉門 七則

便血門 二則

痘瘡門 十五則

疹症門 三則

噤泥門 一則

胎毒門 一則

辨證錄卷之九

山陰陳士鐸敬之甫號達公又號未華子著述

會稽陶式玉尚白甫號布菴又號

聚訥

大便閉結門

人有大便閉結者其症口乾舌燥咽喉腫痛頭目昏暈面紅煩躁人以為火盛閉結也誰知是腎水之涸乎夫腎水為肺金之子大腸與肺為表裏肺能生子豈大腸獨不能生水乎不知金各不同金得清氣則能生水金得濁氣不特不能生水反欲得水以相養故大腸得氣之濁無水則不能潤也雖然大腸之開闔雖腎水潤之亦腎火主之也而腎火必得腎水以相濟無腎火而大腸洞開矣無腎水以濟腎火則大腸又固結而不得出故腎虛而大腸不通不可徒瀉大腸也瀉大腸愈損其真陰矣此等之症老人最多正以老人陰衰乾燥火有餘而水不足耳治法但補其腎中之水則水足以濟火大腸自潤矣方用瀉腸飲熟地二兩當歸一兩肉蓯蓉一兩水洗澹水浸一日換水五次水煎空腹服一連數劑無不通者此方用熟地補腎用當歸生血潤腸用蓯蓉性動以通便補陰而非亡陰於老人尤宜而少年腎虛之輩亦何獨不利哉

此症用瀉腸湯亦效
熟地當歸各一兩升麻五分牛膝三錢水煎服

人有大便閉結小腹作痛胸中噯氣畏寒畏冷喜飲熱湯人以為火衰閉結也誰知是腎火之微乎夫大腸屬金金宜畏火之刑何無火而金反閉耶不知頑金非火不煅所以大腸必得火始能開

闔大腸者傳道之官也有火則轉輸無碍無火則幽陰之氣閉塞其輸輓之途如大溪巨壑霜雪
堆積結成冰凍堅厚而不可開倘得太陽照臨則立時消化非大腸有火則通無火則閉之明驗
乎然而大腸本經不可有火也火在大腸則大腸有太熱之虛火在腎中則大腸無大寒之懼倘
腎中無火則大腸何以傳化水穀哉治法必須補腎中之火不必通大腸之結也方用溫腸開閉
湯巴戟天一兩白朮一兩熟地一兩山茱萸五錢附子二錢水煎服此方用巴戟熟地山茱萸以
補腎至陰之中仍有至陽之氣又用白朮以利腰臍因附子直通其腎迅達於膀胱則火氣薰蒸
陽回泰谷雪消冰泮何至固結閉塞哉

此症用煖陽湯亦效
白朮肉桂各一兩附子一錢水煎服

人有大便閉結煩躁不寧口渴舌裂兩目赤突汗出不止人以為火盛閉結也誰知是胃火之沸騰
乎夫陽明胃火一發必有燉乾腎水之禍大便不通正胃火燉乾腎水也似宜急救息其火但火
性炎上若以細微之水潑之則火勢愈烈而不可止必得滂沈大雨傾盆倒甕淋漓澆灌則燎原
之火庶几盡息方用竹葉石膏湯石膏一兩知母三錢麥冬一兩甘草一錢茯苓二錢人參五錢
竹葉一百片粘米一撮水煎服一劑火瀉二劑便通改用清肅湯玄參一兩麥冬五錢白芥子三
錢竹葉三十片甘菊花二錢生地三錢陳皮五分丹皮二錢水煎服十劑大便永無閉結之苦前
用白虎湯以火勢太盛不得已暫救腎中之水也但石膏辛散而性又猛烈頻用多用反致損耗
真陰真陰一耗則前火雖消後火又將復起況火之有餘水之不足也與其瀉火以損陰何若補

以水制陽之為得所以改用清肅湯補水以息陽火之餘燄耳

此症用潤胃丹亦效
石膏五錢知母一錢玄參一兩生地五錢牛膝三錢甘草五分水煎服

人有大便閉結胸中飽悶兩脇疼痛嘔酸作吐不思飲食人以為火之作祟也亦知為肝火之故乎夫肝屬木木易生火火旺似宜生脾胃之土土又生金何至大腸無津成閉結之症不知肝中之火乃木中之火半是雷火也雷火最能燦水試看連陰久雨必得雷電交作始散陰霾正燦水之明徵也故肝火不動則已動則引心包而沸騰引陽明之火而震動火多而水有不涸者乎水涸而大腸安得不閉結哉故欲開大腸之閉必先瀉肝木之火則肝氣自平不來尅土胃脾之津液自能轉輸于大腸而無阻滯之苦矣方用散火湯白芍一兩當歸一兩炒梔子三錢柴胡三分大黃一錢地榆二錢水煎服一劑大便通二劑肝火盡散不再閉結也此方專入肝以瀉火又能舒肝之鬱蓋肝不鬱則肝火必不旺肝火一散各經之火無不盡散豈獨留大腸一經之火哉況方中原有地榆又專解大腸之火者也

此症用丹黃湯亦神
炒梔子丹皮各三錢白芍五錢甘草黃芩各一錢水煎服

人有大便閉結口乾唇裂食不能消腹痛難忍按之益痛小便短澁人以為大便之火閉也誰知是脾火之作祟哉夫脾乃濕土得火則燥宜為脾之所喜何反成閉結之症不知土太柔則崩土太剛則燥土崩則成廢土土燥則成焦土也然而土焦非陽明之缺下逼必命門之火上炎二火合攻脾之津液涸矣水穀之入僅足供脾之用何能分潤于大腸乎大腸無津液之潤則腸必縮小

不能容物安得不閉結哉治法必急救脾土之焦又必先瀉陽明命門之火始脾土得養自易生陰陰生而津液自潤何必通大腸之多事哉方用救土通腸湯玄參二兩當歸一兩生地一兩知母一錢厚朴一錢升麻五分大麻子三十粒水煎服二劑大便必通減去大麻子與知母再用四劑脾火盡散大便不再結矣此方玄參生地補脾土之陰又是瀉命門脾胃之火當歸取以潤腸知母厚朴取其下行以解熱升麻提脾土之氣則陽升而陰自降大麻子最潤大腸而引火下行不使陰氣上升正助升麻以提陽氣陽既生而陰又降則津液無乾澀之虞何患大腸之不通哉

此症用助陰湯亦效
玄參當歸生地各五錢知母一錢牛膝三錢水煎服

人有大便閉結古下無津胸前出汗手足冰冷煩悶發燥大皆紅赤人以為大便之火閉也然亦知是心火之焚燒乎夫心與小腸為表裏未聞心與大腸有妨碍也然大腸雖不與心為表裏實與肺為表裏心火之盛刑肺即刑大腸矣蓋大腸屬金心火太盛則心不能受自分其火與大腸而大腸又畏心火火盛燶金可立而待也雖肺能生水肺與大腸有表裏之關切豈無津液之降以救大腸之枯渴無如肺先受心火之刑自救不得親子如腎尚不能分潤安有餘波以及兄弟來援救大腸乎此大腸之所以不通也治法宜急瀉火但徒瀉其大無汪洋甘澤之降恐不足以濟大旱之渴也必須以大雨淋之則旱魃之氣頓除而河渠盡通矣方用掃氛湯黃連三錢玄參三兩沙參一兩當歸一兩麥冬一兩丹皮一兩瓜蔞二錢水煎服一劑心火降大便即通不必二劑此方用黃連以直解其心中之熱然徒用黃連不益之玄參則黃連雖寒而性燥火雖解而大腸

之燥如故也得玄參之潤以助勸黃連則浮遊之火不特盡除且潤以去燥不啻如夏熟之時忽
得大雨既去火炎又沾漫渥也至於沙參生陰當歸生血麥冬涼肺丹皮涼腎無非斷四路之氣
使其不來助心中之熱加入瓜簷使火存于心中者盡隨濡潤之藥下降而消滅之也大減水生
則大腸之炎氣頓掃欲不通得乎所以一劑而奏功也

此症用散襟湯亦效

黃連丹皮各三錢當歸麥冬各一兩天花粉二錢水煎服

人有大便閉塞不通咳嗽不寧口吐白沫咽喉乾燥兩脚冰令人以為集之火旺也誰知是肺經之
火旺乎夫肺屬金大腸相表裏最為關切者也肺火之旺何竟傳入于大腸不知肺乃嬌臟僅可
微火薰蒸不可猛火煅煉故一遇火生即移其熱于大腸也且肺皮毛肺氣少虛風寒襲之則肺
中正氣與邪氣相戰寒變熱而風變邪肺因生火自燃其津肺與大腸既相唇齒肺之津涸大腸
之液亦竭矣治法但宜輕治肺火而不可重施以輕清下降之味少抑其火庶胃中之火不來助
炎心中之火不來添旺則肺火自散陰液自生大腸不必通而自通也方用抑火湯山豆根二錢
黃芩三錢麥冬一兩天門冬五錢當歸一兩升麻五分水煎服二劑肺火清又服二劑大腸之閉
開再服二劑全愈此方抑肺金之火又不傷肺金之氣肺金得養津液通而大腸潤矣

此症用芩麻地冬湯亦效

麥冬二兩黃芩天門冬各三錢

升麻甘草各一錢生地五錢水煎服

人有大腸閉結不通飲食無碍并無火症之見亦無後重之機有至一月不便者人以為腎中之無
津也誰知是氣虛而不能推送乎夫大腸無津固不能潤而氣弱亦不能行陽氣一衰則陽不能

通陰而陰與陽相隔水穀入于腸各消各化不相統會故留中而不下也治法不可滋陰以降之亟宜助陽以升之也方用升陽降濁湯人參五錢黃芪五錢白朮五錢當歸五錢柴胡三分荆芥五分麥冬五錢肉桂一錢附子一分水煎服一劑大通此方純是補陽分之藥止麥冬當歸少益其陰則陽氣勝陰始有偏旺之勢又得附子肉桂直入于至陰之中引柴胡荆芥升題其陽氣也陽氣一升陰氣立降安能阻塞之哉

此症用潤輸湯亦效
黃芪五錢當歸一兩川芎五錢升麻五分紅花五分麥冬肉桂各五錢水煎服

人有大便閉結不通手按之痛甚欲死心中煩躁坐卧不寧似乎有火然小便又復清長人以為有鞭屎留于腸中也誰知有畜血不散乎夫畜血之症傷寒多有之今其人並不感風寒之邪何亦有畜血之病不知人之氣血無刻不流通于經絡之中一有拂抑則氣即鬱塞不通血即停住不散于是遂遏于皮膚而為癰留于腸胃而成痛搏結成塊阻住傳化之機隔斷糟粕之路大腸因而不通矣治法宜通大腸佐之逐穢之味然而草木之藥可通無形之結不能通有形之結也血乃有形之物必得有形相制之物始能入其中而散其結方用抵當湯治之水蛭三錢剪碎如米粒大炒黑豆蟲二錢各為末桃仁十四粒研碎大黃五錢水煎調服一劑而大便通瀨失痛楚矣蓋大黃泄下其勢最猛得水蛭豆蟲桃仁破血之味相佐其破堅逐穢之效更神此等閉結不速通利必有發狂之變但何以辨其為畜血之病乎全在看其小便之利與不利耳蓋畜血之病小便必利以血不能入于膀胱之中故膀胱之氣能行能化無害其下出之水道耳故見小便利而

大便結者用抵當湯萬無差謬耳

此症用大黃散瘀湯亦神

水蛭炒黑三錢大黃丹皮各三錢當歸一兩紅花一錢桃仁十四個生地五錢水煎服

小便不通門

人有小便不通點滴不能出急悶欲死心煩意躁口渴索飲飲而愈急人以為小腸之熱極也誰知是心火之亢極乎夫心與小腸為表裏小腸熱極而癃閉乃熱在心而癃閉也蓋小腸之能開闔者全責于心腎之氣相通也今心火亢熱則清氣不交于小腸惟烈火之相迫小腸有陽無陰何能傳化乎小腸既不能傳化膀胱何肯代小腸以傳化耶况心腎之氣既不入于小腸亦何能入于膀胱以傳化夫水哉治法瀉心中之火兼利其膀胱則心腎氣通小便亦通矣方用涼心利水湯麥冬一兩茯神五錢蓮子心一錢車前子三錢水煎服二劑水出如注四劑全愈此方補心之藥即涼心之藥也在心既無太亢之虞在小腸又寧有大乾之患況又有滑利滲滲之味以通其水則心氣自交於腎腎氣自交于膀胱氣化易于出水豈尚有不通之苦哉

人有小腸不通眼睛突出面紅耳熱口渴引飲煩燥不寧人以為上焦之火盛也誰知是膀胱之火旺乎夫膀胱與腎為表裏膀胱必腎氣相通而後能化水是膀胱之火即腎中命門之火也膀胱無火不能化水何火盛反閉結乎不知膀胱得正火則水易分消得邪火而水難通利蓋膀胱乃太陽之經也太陽最易入邪一入邪而寒變為熱熱結于膀胱乃邪將散之時也邪既將散宜火隨溺而泄矣何反成閉結之症蓋因邪將出境惟恐截殺去路故作威示強屯住于膀胱耳治法

後人病
袁已為
前領體會而
得之是真善於

必泄腎火但利膀胱則邪去如掃方用導水散王不留行五錢澤瀉三錢白朮三錢水煎服一劑通達如故不必二劑此方逐水至神因王不留行性速善走故用之以祛除耳閉原在膀胱利膀胱而閉自開何用張皇輕投迅利之劑耶

人有小便閉結點滴不通小腹作脹然而不痛上焦無礙之形胸中無悶亂之狀口不渴舌不乾人以為膀胱之水閉也誰知是命門之火寒乎夫膀胱者決瀆之官腎中氣化而能出此氣即命門之火也命門火旺而膀胱之水通命門火衰而膀胱之水閉矣或曰小水之勤者由于命門之火衰也火衰正宜小便大利何反至于閉塞耶不知命門之火必得腎水以相養腎水衰而火乃旺火旺者水無力以制之也無水之大火雖旺而實衰無火之水水欲通而反塞命門火衰而小水勤衰之極者勤之極勤之極者閉之極也人見其閉錯疑是膀胱之火及用寒劑愈損其命門之火膀胱之氣益微何能化水改投利水之藥轉利轉虛矣治法必須助命門之火然徒助命門之火恐有陽旺陰消之慮必須于水中補火則火生于水之中水即通於火之內耳方用八味地黃湯熟地一兩山茱萸五錢丹皮三錢山藥五錢澤瀉三錢茯苓五錢肉桂二錢附子一錢水煎服一服即如注八味湯乃水中補火之聖藥也水中補火而火大炎之懼火中通水而水無竭澤之虞即久閉而至于胞轉以此方投之無不奏功于眉睫况區區閉結哉

此症用行水湯亦效
熟地二兩巴戟天茯神艾葉各一兩內桂二錢水煎服

人有小便不通目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲裂飲食不下獨口不渴服甘淡滲泄之藥

皆無功效人以為陽盛之極也誰知是陰虧之至乎夫陰陽不可離也 淡甘滲泄之藥皆陽藥也病是無陰而用陽藥宜乎陰得陽而生矣然而無陰者無陰中之至陰也陰中之至陰必得陽中之至陽而後化小便之不通膀胱之病也膀胱為津液之府必氣化乃能出是氣也即陽中至陽之氣也原藏于至陰之中至陽無至陰之氣則孤陽無陰何以化水哉治法補其至陰而陽自化也方用純陰化陽湯熟地一兩玄參三兩肉桂二分車前子三錢水煎服一劑小便如湧泉再劑而閉如失此方又勝于滋腎丸以滋腎丸用黃柏知母苦寒之味以化水不若此方用微寒之藥以化水也論者謂病勢危急不宜用補以通腎且熟地濕滯不增其閉塞之苦哉詎知腎有補無瀉用知母黃柏反瀉其腎不虛其虛乎何若用熟地純陰之品得玄參濡潤之助既能生陰又能降火攻補兼施至陽得之如魚得水化其亢炎而變為清涼安得不崩決而出哉或謂既用熟地玄參以生陰則至陽何必又用肉桂車前子多事然而藥是純陰必得至陽之品以引至于至陽而又有導水之味同羣共濟所以既能入_于陽中又能出于陽外也矧肉桂止用其氣以入陽而不用其味以助陽實有妙用耳

此症用生化腎湯亦神
熟地四兩生地二兩肉桂三分水煎服

人有小便不出中滿作脹口中甚渴投以利水之藥不應人以為膀胱之火旺也誰知是肺氣之乾燥乎夫膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣上焦之氣不化由于肺氣之熱也肺熱則金燥而不能生水投以利水之藥益耗其肺氣故愈行而愈不得水也治法當益其肺氣助其秋令

水自生焉方用生脉散治之人參一兩麥冬二兩北五味子一錢黃芩一錢水煎服二劑而水通矣生脉散補肺氣以生金即補肺氣以生水是矣何加入黃芩以清肺不慮伐金以傷肺乎不知天令至秋而白露降是天得寒以生水也人身肺金之熱不用清寒之品何以益肺以生水平此黃芩之必宜加入于生脉散中以助肺金清肅之令也

此症用參冬茯苓湯
麥冬三兩茯苓五錢水煎服

人有飲食失節傷其胃氣遂致小便不通人以為肺氣之虛也誰知是胃氣下陷於下焦不能升舉之故乎夫膀胱必得氣化而始出氣升者即化之驗也氣之升降全視乎氣之盛衰氣盛則清氣升而濁氣降氣衰則清氣不升而濁氣不降矣若胃者多氣之府也羣氣皆統之胃氣之盛衰尤為眾氣之盛衰也所以胃氣一虛各經眾氣多不能舉故脾胃虛而九竅皆為之不通豈獨前陰之閉水哉治法必須提其至陽之氣而提氣必從胃始也方用補中益氣湯人參二錢黃芪三錢白朮三錢當歸二錢甘草一錢陳皮三分柴胡一錢升麻五分水煎服一劑而小便通矣再剉全愈此方用參芪甘溫之味補其胃氣以升麻柴胡從化原之下而升提之則清升濁降而肺氣不虛自能行於清肅之令何至有閉結之患哉

內傷門

人有好食肥甘烹炙之物遂至積于胸胃久而不化少遇風邪使覽氣塞不通人以為傷風之外感也誰知是內傷于食因而外感乎凡人胃氣若強則土能生金肺氣必旺外邪不能從皮毛而深

入也惟胃氣之虛則肺金亦虛邪始能乘虛而入然胃不能自強必假飲食之助故胃氣開則食易消胃氣閉則食難化食易消則胃強食難化則胃弱世人多食本欲助胃也誰知多食反以損胃乎胃損則胃弱胃弱則肺何能強以外衛夫皮毛乎是邪因內傷而入非邪無引而直入也治法烏可純治外感哉方用護內湯白朮三錢茯苓三錢麥芽一錢山查五粒甘草一錢柴胡一錢半夏一錢枳壳五分神曲八分肉桂二分水煎服一劑氣塞通二劑全愈此方乃消食神劑又能祛逐外邪且不傷胃氣真治內傷感邪初起之良法也所以二劑奏功耳

此症用參復甘桔湯亦效
山查十粒麥芽人參桔梗各一錢枳壳甘草各五分茯苓三錢水煎服

人有饑飽勞役傷損津液以致口渴舌乾又感風邪頭痛發熱人以為外感也誰知是內傷于陰乎夫人身非血不養血足而津液自潤傷血而津液自少血少則皮膚無養毛竅空虛風尤易入然風雖入于皮膚而不能驟進于經絡以陰虛而陽未衰也陽與邪戰而發熱故頭痛耳治法不必補陽補其陰血之虛少佐之祛風之味則陰陽和合邪安能久留哉方用養陰辟邪丹當歸五錢白芍五錢柴胡一錢甘草一錢蔓荆子五分川芎三錢天花粉一錢茯苓三錢水煎服一劑邪解二劑全愈此方補血以養陰則津液自生原因津液之虧而邪入津液足而邪有不出乎者况川芎蔓荆子能祛頭上之邪柴胡炙甘草更善解紛之妙天花粉與茯苓善消痰利濕引邪盡從膀胱而出治陰虛內傷感邪莫良于此倘用攻于補陽之中則陽旺陰消邪轉熾矣烏能速愈哉

此症養津湯亦可用

柴胡半夏甘草蔓荆子各一錢丹皮麥冬各三錢玄參四錢神曲五分水煎服

人有饑飽勞役又感冰雪之氣或犯霜露之感遂至腹痛畏寒身熱不解人以為外感之症也誰知是陽氣之內傷乎凡人陽氣壯盛者雖受冰雪霜露而亦不懼惟饑飽損其脾胃勞役困其體膚則臟腑經絡自先虛冷此邪之所以易入也雖有外邪俱正作虛治之况腹痛畏寒尤是虛冷之驗外身雖熱內寒又何疑乎方用加味六君子湯治之人參一錢白朮一錢茯苓三錢陳皮五分甘草一錢半夏五分肉桂一錢柴胡一錢水煎服一劑痛止而蕩其內寒也倘疑身熱而外邪之盛純用祛風利濕之劑則損傷陽氣不啻下石勢必變症蜂起成不可治之症矣

此症用雙桂湯亦效
白朮五錢茯苓三錢肉桂甘草各一錢桂枝羌活各五分水煎服

人有懷抱素鬱悶悶昏昏忽然感冒風寒身熱咳嗽吐痰不已雖似外感誰知是肝氣不舒因召外感邪夫肝氣最喜條達一遇憂鬱之事則滯滯而不可解正喜外風之吹動則內鬱可舒無如內鬱之甚則木中生火風火相合而熱乃熾也故感冒風寒所以作熱風火作威肝不畏金之尅反去侮肺肺不甘雨相戰鬪肺又懼火刑呼救于腎子而咳嗽生矣雖有津液又為肝腎中風火所耗而津液變為痰涎治法自宜急散肺中之風然風雖散而火尤存則火以引風非救本之道也尤宜舒肝之鬱則火息而風尤易散也方用逍遙散加味治之柴胡一錢白芍三錢當歸二錢甘草一錢白朮一錢陳皮五分茯苓二錢炒梔子一錢半夏一錢水煎服一劑身熱解二劑咳嗽除三劑全愈此方解鬱之聖藥亦祛風之神劑也直入肝中舒泄其滯鬱之氣鬱解而風自難留八半夏以消痰梔子以退火更能相助為理所以奏功益捷也