

婦科三



根原 向病之根有數項 一、爲總身體軟弱 二、血薄症、

三、瘰癧病、 四、疔毒病根、 激發之原亦有數項 一、子宮位

置不正、 二、子宮內衣發炎、 三、子宮頸扯裂、 四、子宮本體

筋絡脹大、 五、交媾過度、 六、陰道白帶、 七、扶架損傷、 由

是以觀其病非由自發、而爲他症累及、他症必更重劇、

證據 子宮本病不大、則子宮頸病證亦小、病人但覺白帶多

而惹厭、並不自知其病、直至有重劇證據、則子宮之病已重矣、

其證據如下、 一、多白帶帶血與膿、 二、交媾痛而出血、 三、

經水太多、或經行不止、 四、行動覺刺痛、 五、腰背有限定痛

處、 六、血每變薄、 七、腦線不安、
行動坐臥皆不適、並增煩惱 或兼有氣厥、

外查證據 以指探入陰道，覺子宮頸包滿絨形面子，或努肉顆粒形，熟手一探卽知，用照鏡視之，更覺證據顯然，前次誤認者，至是可以改正，照鏡察看，子宮頸近口處，皆屬一包膿，將膿移去，下面色甚紅，爲努肉形，與眼皮努肉紅爛相似，其潰爛處不低凹，往往較近邊皮肉更形凸起。

久暫 病愈期限不一定，總身體如變好，或不醫而自愈，然症有潰爛處，或久流膿水，令血枯少，致總身體有病，求愈較難。

論病 子宮頸處內皮，既久浸於酸性流質，致愛潑鐵林片之脫落，惟留一薄層愛潑鐵林，此薄而明之一層下，卽現子宮紅色料質，其微細血管甚密，愛潑鐵林薄層下微細血管，倒垂

而成阜拉。

即內皮絨頭。如小腸裏面絨頭。或云刺也。

如子宮內皮膀胱內皮所有者。此

阜拉爲新成之物。非舊有細核也。阜拉四面。包有愛潑鐵林。內有血管。往往併成大塊。每名爲爛血管血瘡。又名雞冠努肉。料病尋常易愈。醫治略有耽延。欲決其全愈與否。視所牽涉病根何如。

治法 未治之前。須查明其情形。是否努肉變爛。抑係子宮頸扯裂。因二項情形相似。往往扯裂一種。兼有努肉。二症併治。或兼用他法。努肉潰爛。既爲他症所害。細查明確。同時並治爲佳。如其人有子宮位置不正。子宮內衣發炎。陰道發炎。或連網料過多。均須查明治之。然有以烙炙藥搽患處。而不顧及病

之根原，亦間有得愈者，是則努肉潰爛，大約子宮頸內皮下料質內有血聚緣故，一用烙灸，其功效直達血聚處，而不獨斷其萌芽也。治之前，視其總身體何如，用相配補藥，及飲食調養，

一、令努肉潰爛處免摩擦。二、令其不遇惹厭流質。三、患

處常用改血藥法。四、子宮及子宮頸處血聚，須設法免之，

欲免摩擦，因子宮位置不正，用扶架正之，如子宮軸線尚整，用

橡皮圈擡之，令上出骨盆，即有大益，凡屬可免子宮血聚之物，

皆可用之，束腰宜鬆，衣服宜輕，皆能助益治法。陰道每日兩

次用熱水噴洗，可除一切白帶類流質，白帶從子宮發炎來者，

先除其發炎，治子宮內衣發炎，可用黎察生收斂藥，名拷勞特，

卽棉花浸於硝強水，硫強水，成棉花火藥，再浸於以脫內，成克

陸定

一作哥路弟恩

再加足歎尼克酸，卽成收斂拷勞特，此能治上四

項欲免之事，不獨改變血質，結成保護內皮之蓋，並禦摩擦，以其性收斂，能令阜拉收縮，而禁其血聚也。欲用改血藥法，令

胃家腦線，及行運血法腦線，均得整飭，則用銀養淡養_五條，或

銅養硫養_三乾料最好，若用流質，則濃加波力酸水，或銻養_三水

半兩調水一兩，或碘雜酒，或歎尼克酸，並格里式令，對分劑調

和浸棉花，或細麻絨，以爲襯物，或阿奧特芳

一作愛亞度福密

或鐵_三養_三

三硫養_三濃水，或加以對分劑之格里式令，最妙用銀養淡

養_五條拭之，卽以收斂拷勞特拭上，俾成薄蓋，如阜拉甚多，

似雞冠多刺，則以長柄剪刀近其根腳處剪去，或再以鋼絲匙將其面刮平，然後用烙灸法，以銀養淡養_五條烙之，仍照常法用熱水噴洗。子宮頸口翻出，卽將血充足之內皮剪去，或以騰汽之極濃硝強酸消蝕之，若因生產而子宮頸口翻出殊甚，以長柄剪刀於其邊一律修平，有裂碎處，亦可修平之，乃以銀絲線縫合，令子宮頸復其原形，所有翻出處內皮向裏，可免陰道摩擦之弊。欲免血聚，治法甚便，子宮頸有限處血聚，可用改血及收斂法治之，又可用陰道藥錠及噴洗法治之，如不愈，用尖鋒彎鐮刀，將患處皮肉向外割出，割時並不痛，可割五六刀，將皮下網形血管齊行割斷，血放出，卽不復聚矣。全子

宮血聚者、腹上衣服須解鬆、不可出力勞動、又須令大便整飭、經期到時、須加意安息、陰道用熱水噴洗周到、噴洗之事、病

人亦可自爲之、每日陰道內安置藥錠、每早晚用熱水一軋倫、約八加以格里式令一兩、約八錳養硫養三一錢、或加明礬二錢、或鉛

養醋酸二錢、或歎尼克酸二錢、噴洗十分時、或二十分時之久、或更加收斂之藥水、先用清水一軋倫噴洗、然後用藥水二觔、噴洗五六分時可也、有醫生用陰道藥錠、每錠加錳養三釐、或明礬三釐、或水銀油膏十釐、或鉛碘五釐、或歎尼克酸二釐、如欲加止痛藥、可再加毛地黃膏一釐、或鴉片一釐、此藥料可用脫賴鐵嵌粉、小粉、滑槐木水、並格里式令調和、外以椰油膏

包之、以指送入陰道、或以藥錠管送之、每日用藥錠一二次、如所加藥料過多、可切作兩段、作兩次用、

子宮頸起泡而壞 此症雖無以上一項之多、間或有之、其病在子宮頸面內皮液核發炎、

論病 症有三項、一係小泡、細如芝蔴、內含稠質、爲液核內精液充足、一爲液囊、細視之、係崩碎而內陷、一則內陷處變紅色、腫起、而陷處顯聚血形、如第一百二十六圖、 病名甚多、因各醫生診視時候不同、所顯病形各異、此病之根、在子宮內發小粒癰相似、

根原 子宮頸內皮內有血聚者、卽令內皮液囊脹足、而成此

症其大概如下。子宮頸處內衣發炎。努肉變壞。子宮頸處質料多增而變繭厚。子宮頸碎裂。料病。液囊四散不多。容易醫治。若多而密者。須將其一份割去。

治法。各液囊用尖鋒彎鑷刀。鈎割出外。其囊孔以銀養淡養^五條拭擦之。或以鉻養^三酸。或以酸性汞養淡養^五擦之。若其病廣而深。用挖割烙灸而不愈者。須以電火除之。或割去子宮頸。以輕治法無用耳。

第二十二章

子宮頸由疔毒而生瘡癰

症之多少。疔毒累及子宮頸。或係第一層疔毒。

因男人初犯楊梅毒交媾而得

或係第二層疔毒

男人所有楊梅之毒重復發出者

醫生近定大例，子宮頸亦能

生真疔毒

向西名向克

惟罕見耳。至於子宮頸害出第二層疔毒，法國

字克勒以爲其症甚夥，陪納子謂子宮頸上常有內皮白斑點，

垂苔症，有擦去外皮，有安字加爾，又名都比迦爾，

安字加爾本肺癆病種子也，爲

微細蛋渣，內有微細蟲類，流入血管，並有穢梅塊，穢梅者塊也，半硬半

阻住一處，發成爛瘡，能化生蛋渣。

穢梅者塊也，半硬半軟，似含膠一般，能移

徙不定，此疔毒明證。

彭斯推新著一書，專論疔毒，詳及眼淚囊耳鼓等，極

爲研究，初未論及子宮疔毒，惟裴爾阜大醫院表明有子宮頸

內皮白斑點，餘亦並不提及，可知此症不常有也。

久暫 沾染疔毒第一層病，限於子宮頸處，總身體亦不免累

及，猶之他處生向克，到處皆波及也，卽有時醫愈，未能斷根，變

爲苔形病證，勢成久延。

辨病 辨別病證，爲醫生第一要務，與施治之法，大有關係，且
閨閣婦女，一誤會便損人名節。症果屬向克，有證據如下，
一、瘡邊內陷直下如井，二、瘡底亦凹，三、易致流血，四、易
生一薄層假罩衣，五、總身體迅顯證據，六、皮膚發有紅色
點粒，七、可移種他體而播傳。以上證據皆確，而末三項，尤
爲確據。病由第二層發出者，如內皮白斑點，苔形瘡症，辨法
如下，一、發極迅速，二、總身體證據同現，三、陰道同時發
瘡，四、子宮頸反無久延發炎之患，五、疔毒第二層病證，特
有異樣證據。

治法 症係向克，卽照他體生向克醫治大例，用烙灸及水銀等法，如屬第二層疔毒，仍用水銀藥，瘡面用烙灸，嗣卽以含水銀敷藥法治之，或用黑洗水，汞綠八釐加石灰水一兩，或黃洗水，汞綠五釐加石灰水一兩，或搽水銀油膏，並汞二綠摻之。

第二十三章

子宮內苔形瘡癰

來歷 法國醫生黎開彌始論子宮內衣有苔形塊，每易流血，所設醫治之法，至今仍用之。嗣後法國德國醫生，每常論及之，皆循黎開彌意見，而各立法以治之。

釋病 子宮內苔形瘡癰，爲子宮內衣上生有苔形之物，皆由血聚所致，或間有胞衣碎屑留在其內，有血管連絡生根，或誤

認爲子宮內癰瘍。然癰瘍究屬有異，何至認錯。又子宮內衣變
繭厚，並胞衣留滯，亦歸併此項病證，其醫法皆同。

症之多少 子宮內衣因苔形變壞甚多，此由經水太多，或經
水不止，往往延久數年，不加覺察，醫生既明此症，關係子宮久
延發炎，經水太多，經水不止，子宮加大，醫治方有把握。

同異之名 此症又名努肉變繭厚，或名子宮內衣努肉發炎，
或子宮內阜拉發炎。

論病 子宮苔形瘡癰，常例子宮質體內血充足所致，或因大
小產而來，年輕女子，經水初到，往往放血甚劇，血聚多則易生
繭厚之症，如有胞衣碎屑留滯在內，卽爲胞衣努肉，生根於子

宮內皮，卽成苔形瘡癰，更有一種，年少女人，發身時養育具生長甚快，有一處質體變繭厚，以顯微鏡照之，爲內皮料過於稠厚，其放大之原料，放大之血管，並幾多生珠加大之類，移去約有二三錢料質，醫或疑爲瘡瘍，以顯微鏡辨之，可渙然冰釋也。

恨原 一、小產或大產 二、子宮內衣發炎 三、子宮復原不正 四、子宮頸碎裂 五、子宮位置不正 六、筋網癰瘍在內皮下，或在子宮體質層數之間。

證據 最著重之證據，爲子宮放血，或經水分外加多，或經水久不止，有其一項，疑卽爲苔形瘡癰，子宮內業已失去血質不

少其失血之原疑非尋常情形然無他項傷損之處又查無新成質料又無大塊胞衣是否苔形瘡癰可查驗而知之

外查證據 用沁姆斯照鏡查之照鏡插入將子宮頸鈎住如

外口或頸道甚小者須用二三號張大之具可以鋼絲匙治之

以鋼絲匙依靠子宮前面刮之復傍其後面刮之視其有無苔形瘡癰並以顯微鏡查之 鋼絲匙爲查子宮苔形物之要

件照我前法用之決無有害子宮探具有害出腹包膜發炎之患而此匙則無之此物助顯微鏡有大功凡暗藏深處病症無從查察用此鋼絲匙爬出證據以顯微鏡察之即可得其形狀久暫究竟 苔形瘡患數年之久不增不減有人得孕一產而

愈然亦有產後仍發作者。有時苔形物往往脫落，由經水冲出，然不能脫盡，且更萌生。若不肯醫治，每多煩苦，全身軟弱，直至經期繼絕始止，亦有復遷延數年者。治用黎開彌銅絲爬固好，然有爬刮數次而病仍未愈。前曾遇一少女，當經期到時，血出過多，面色純白，余用銅絲匙刮之，刮出苔形物甚多，似屬全愈。閱三月後，而重劇之證據復顯。又用銅絲匙爬之，以碘雜酒攪水噴入子宮，又愈。更數月後復發，乃用沁姆斯快口匙爬之，如第一百二十八圖，再用硝強水擦之，後乃陸續用碘水噴洗，乃得全愈。又有一人三年內用匙爬十次，每次爬出苔形物不少，爬後以碘或硝強水暢擦之，竟見效。有幾病人每年爬