

卷九 傷寒例 辟溫

發汗散 發汗湯

宜吐 宜下

卷十 傷寒雜治

勞復 附陰陽易

百合 傷寒不發 并變成狐惑

傷寒發黃

溫瘧

診溪毒證

千金要方

孫真人備急千金要方卷九

長沙張玉先生行義

南沙唐世臣書

傷寒方上凡九類

傷寒例第一 論三首

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月運行各別終其暑度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者卽天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿自瘥以此致枉者天下大半凡始覺不佳卽須救療迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今博採羣經以爲上下二卷廣設備擬好養生者可得詳焉 小品曰古今相傳稱傷寒爲難治之疾時行瘟疫是毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫爲異氣耳云傷寒是雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳

不說病之異同也考之衆經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒或觸冒之者乃爲傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而卽病名曰傷寒不卽病者其寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此時行之氣也傷寒之逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不去病或日數久淹困乃告師苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃有效耳 華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之卽愈若不解者二日在膚可依法鍼服解肌散發汗汗出卽愈若不解至三日在肌復一發汗卽愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆丸微吐之則愈若病困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尙未醒醒者復一法鍼之五日

在腹六日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃卽爛胃也然熱入胃須要下去之不可留於胃中也胃若實熱爲病三死一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸七服之當逼與新汲水一升或二升強飲之令以指

喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆令相主不爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之尤佳夫飲膈實者此皆難治此則三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬無大發汗法冬及始春大寒時宜服神丹丸亦可摩膏火灸若春末及夏月始秋此熱月不宜火灸及重覆宜服大物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若無丸散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕缺者為瀝實也朝平夕缺者非瀝也轉下湯為可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈為可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯 王叔和曰夫陽盛陰虛外臺作表裏病下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛之則死下之則愈陽虛陰盛外臺作裏和表病下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治外臺作表裏之病相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽陽盛則斃外臺作表裏和則斃承氣入胃陰盛以外臺作裏平 若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者殞沒自謂其分至令冤魂塞於冥路天死盈於曠野仁愛鑒茲能不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈

三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在臧故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所能除當診其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣相染易爲邪惡所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也陳廩邱云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如蒸中風法熱濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簾中冷得病但苦寒俗諸醫與丸散湯四日之內凡八過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之卽得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不汗出也諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗溫粉粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及大下利則不可大汗也當少與桂枝湯使體潤榮榮汗出連日當自解也論曰凡人有少苦似不如平常卽須早道若隱忍不治冀望自瘥須臾之間以成固疾小兒女子益以滋甚若時氣不和當自戒謹若小有不和卽須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入臟則難可制止雖倉扁亦無能爲也癰疽丁腫喉痹客忤尤爲其急此自養生之

要凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須治之凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有溫覆而尚不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更爲人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦不可與之忽然大汗出欲自愈也人得病能飲水欲愈也 凡溫病可鍼刺者五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災 論曰夫尋方學之要以救速爲貴是以養生之家須預合成熟藥以補倉卒之急今具之於左

辟溫第二方三十三首
濕溫病證

屠蘇酒 辟疫令人不染溫病及傷寒之方 大黃十五銖 白朮 桂心各十銖 桔梗 蜀椒各十銖 烏頭六銖 菝葜

十二銖 右七味咬咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東

向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也 一方有防風一兩○又方 正月旦取東行

桑根如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之○又方 正旦吞麻子赤小豆各二十七粒又以二十粒投井中○又方 常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二十七枚○又方 七月七日男吞大豆七枚

女吞小豆二七枚○又方 神仙教人立春後有庚子日溫燕菁頰汁合家大小並服不限多少

太乙流金散 辟溫氣方 雄黃三兩雌黃二兩礬石一兩半 鬼箭羽一兩半 羚羊角燒二兩 右五味治下篩三

角絳袋盛一兩帶心前并挂門戶上若逢大疫之年以月旦青布裏一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

雄黃散 辟溫氣方 雄黃五兩 硃砂 菖蒲 鬼臼各二兩 右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

殺鬼燒藥方 辟溫氣 雄黃 丹砂 雌黃各一斤 羚羊角殺羊角亦得 蕪荑 虎骨 鬼臼 鬼箭羽 野丈人

即白頭翁石長生 瑕猪屎 馬懸蹄各二兩 青羊脂 菖蒲 白朮各八兩 蜜蠟八斤 右十六味末之以蜜蠟和

為丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓 辟溫方 虎頭五兩 硃砂 雄黃 雌黃各一兩半 鬼臼 皂莢 蕪荑各一兩 右七味末之以蜜

蠟和為丸如彈子大絳袋盛繫臂男左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓

辟溫殺鬼圓 熏百鬼惡氣方 雄黃 雌黃各二兩 龍骨 龜甲 鱖鯉甲 蜎皮各三兩 殺羊角 虎骨各七兩

楊雞十五枚 空青 一兩 芎藭 眞珠各五兩 東門上雞頭 一兩 右十三味末之炷蠟二十兩并手圓如梧子正

旦門戶前燒一圓帶一圓男左女右辟百惡獨宿弔喪問病各吞一圓小豆大天陰大霧日燒一丸於戶牖

前佳

雄黃圓 漢建炎二年太歲在酉疫氣流行死者極眾有書生丁季迴從蜀青城山來東過南陽從西市門入

見患疫癘者頗多遂於囊中出藥人各惠之一圓靈藥膏疾無不瘥市中疫鬼數百餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃有鬼王見書生謂有道法兼自施藥感眾鬼等奔走若是遂詣書生欲求受其道法書生曰吾無道法乃囊中之藥呈於鬼王鬼王觀藥驚惶叩頭乞命而走此方藥帶之入山能辟虎狼蛇蟲入水能除水怪蛟蜃 雄黃 雌黃 曾青 鬼臼 眞珠 丹砂 虎頭骨 楮梗 白朮 女青 芎藭 白芷 鬼督郵 蕪荑 鬼箭羽 藜蘆 菖蒲 皂莢各一兩 右十八味末之蜜丸如彈子大絹袋盛男左女右帶之卒中惡病及時疫吞如梧子一丸燒彈大一丸戶內

赤散 辟溫疫氣傷寒熱病方

藜蘆

躑躅花各一兩

丹皮

皂莢各一兩

附子

桂心

眞珠各六銖

細辛

乾薑各十銖

右九味末之內眞珠合治之分一方寸七絳置囊中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便

以粟米大內著鼻中又酒服一錢七覆取汁日三服當取一過汗耳○又方 凡時行疫癘常以月望日細

剉東引桃枝煮湯浴之

粉身散 辟溫病常用方

芎藭

白芷

藥本各等分

右三味治下

篩內米粉中以粉身

斷溫疫轉相染著乃至滅門延及外人無敢視者方

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃各二兩

右四味末之

以蜜和服如小豆一丸可與病人同牀無妨

預備一物柏枝散

天氣不和疾病流行方

取南向社中柏東南枝曝令乾搗末酒服方寸七神良

治溫病不相染方 以桃樹中蠹屎煮之水服方寸七 ○又方 朮鼓等分酒浸服之妙 ○又方 赤豆一

升新布袋盛內井中三日出舉家服二十七枚 ○又方 松葉煮之酒服方寸七日三服

治溫令不相染方 新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚 ○又方 白蜜和上色砂硃粉一兩以太歲

日平旦大小勿食向東方立吞服三七丸如麻子大勿令齒近之并吞赤小豆七枚投井泉中

治瘴氣方

蒜五十并皮碎之 鼓心一升

右二味以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之

蒜疑葱之誤

○又方 青竹

茹二升以水四升煮取三升分作三服

〔衍義〕辟溫諸方有歲時預防而設有時氣不正而設然有內服有外佩有焚燒有懸挂有內鼻繫臂粉身

浴體及投井中種種不同總取辟除惡毒異氣之義屠蘇酒方中首取大黃推陳致新白朮安中正氣桔梗
升清降濁蜀椒辟邪下氣桂心破陰助陽烏頭祛邪辟惡菝葜逐穢除邪七味藥中惟藉烏頭為主帥椒桂
左右輔弼白朮守營大黃奪塞桔梗菝葜中外宣使一本有防風酒煎向東飲取其生氣隔歲置井中盡室
均沾之意 自東行桑根方至蕪菁茹汁六方皆歲時預防之法 自太乙流金丹至粉身散九方咸用雄
黃硃砂鬼臼鬼箭虎頭羚羊等藥皆時氣不正辟邪之方 自斷溫疫至青竹茹十方皆吞服小方廣收以
便取用原無分於彼此也

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩欲倒身微熱戰掉不安時復憎寒心中欲吐吐時無物方

新猪屎二升半內好酒一升攪令散以生布絞取汁更以綿濾頓服之取盡卽地鋪暖臥覆蓋鋪前著火常汗出若得汗當細細去上衣勿使心寒寒卽不瘥看汗自乾乃起慎風冷亦治瘡及風勞蟲毒

〔衍義〕霧從地濕蒸發皆平時所受穢惡之氣發則迷漫大地卽時氣鬱蒸之類壯者氣勝無傷怯者著而成病則有煩心頭痛目眩身熱欲吐等證長沙所謂陽中霧露之氣故取水獸之遺以辟水土之邪服後臥地向火取汗使鬱蒸之氣仍從上解嘗見嬰孩麻疹著寒陷伏喘脹兒科用猪屎大桶沸湯中置牀簾下熱蒸如霧良久通身得汗麻卽汗發藥所不及而此能療之勿以穢惡而鄙棄不錄也

治肝肺臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰強急縮目中生花方 桂心一兩 白朮 芒硝 大青 梔

子各三兩 柴胡五兩 石膏各八兩 生薑各八兩 生地黃 香豉各一升 右十味咬咀以水九升煮取三升分三服

治肝肺臟溫病陰陽毒先寒後熱頸筋攣牽面目赤黃身中直強方 元參一兩 細辛二兩 梔子 黃芩 升

麻 芒硝各三兩 石膏八兩 竹葉切五升 車前草二升 右九味咬咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去滓下

諸藥煎至三升內芒硝分三服

治心肺臟溫病陰陽毒戰掉不安驚動方 大青 黃芩 梔子 知母 芒硝各三兩 麻黃四兩 元參六兩 石

膏 生葛根各八兩 生地黃切一升 右十味咬咀以水九升煮取三升去滓內芒硝分三服

治脾肺臟溫病陰陽毒頭重頸直皮肉痺結核臙起方 大青 羚羊角 升麻 射干 芒硝各三兩 梔子

四兩寒水石五兩元參八兩 右八味咬咀以水七升煮取三升分三服

治肺腑臟溫病陰陽毒咳嗽連續聲不絕嘔逆方 麻黃 梔子 紫苑 大青 元參 葛根各三兩 桂心

甘草各二兩 杏仁 前胡各四兩 石膏八兩 右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服

治腎腑臟溫病身面如刺腰中欲折熱毒內傷方 茵陳蒿 梔子 芒硝各二兩 苦參 生葛各四兩 生地黃

石膏各八兩 葱白 豉各一升 右九味咬咀以水九升煮取二升半下芒硝分三服

〔衍義〕溫病從內發外雖有臟腑之分却無陰陽之辨以邪伏身中既久內外血氣無不受其蘊毒也其首言肝腑臟病肝與膽合膽為陰陽之樞所以證先寒後熱項背筋急等患肝藏血故以生地黃涼血之味統大青石膏梔子芒硝疎其宿蘊之毒桂心柴胡香豉生薑泄其在經之熱白朮斷其復入之路也 其第二

方亦證見寒熱有面目黃赤似乎木邪乘土究竟肝熱居多故於芒硝石膏梔子黃芩元參蕩熱藥中略兼升麻細辛透達經邪車前竹葉并通滲道以開泄熱之路也 心腑臟溫却無寒熱而見戰掉火之象也心主血故亦用生地黃統攝大青石膏梔子芒硝及元參黃芩與肝腑臟無異以心部於表故用麻黃開發肺氣以散在表之熱葛根知母輔石膏流行胃津以滋火氣之燔灼也 脾腑臟溫而證見頭重頸直皮肉痹結故用射干散結氣羚羊角辟惡毒不祥大青梔子元參芒硝寒水石以攻熱毒升麻引入脾經也 肺腑臟溫而見咳嗽嘔逆是肝病而兼胃熱毒逆也大青石膏梔子元參乃治溫專藥麻黃桂心杏仁前胡紫苑

甘草泄肺專藥葛根非佐石膏解利陽明之熱乎 腎腑臟溫而證見熱毒內傷腰中欲折不用知母反用茵陳苦參祛滌濕熱之味佐石膏芒硝生地黃以辟毒邪專取香豉以靜少陰之源梔子以除膈上之煩生葛以行胃中之津葱白以通陰中陽氣也

葳蕤湯

治風溫之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁嚙嚙但欲眠下之者則小便難發其汗

者必譫語加燒鍼者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此疾者宜服之方 葳蕤 白薇 麻黃 獨

活 杏仁 芎藭

甘草

青木香

各三兩

石膏

五兩

右九味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗

若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之

小品方云葳蕤湯治冬溫及春月中風傷寒則發熱頭痛咽乾舌強骨肉疼心胸痞滿腰背強

〔衍義〕風溫之病長沙但言脉證而無治療之方千金補所未逮特立葳蕤湯為專藥蓋風溫由溫病誤發

其汗而成經言太陽病發熱而渴者為溫病若發汗已身灼熱者為風溫此兩節一氣貫下陳氏不當以註

釋間斷致後人作兩截看意謂風溫別是一證多生疑障且本例後一逆尚引日再逆促命期等語以為不

可救藥束手待斃也原夫冬時之邪伏藏少陰至春發動必循太陽之經時當風木主令內火招風最為巨

測縱不因風亦必繇少陽而尋出路況經誤汗非惟不解身反灼熱其脉尺寸俱浮蓋腎脈本當沉也風溫

載之從太陽上入根本撥而枝葉紊矣其證自汗身重多眠鼻鼾語難一皆腎之本病詎意發熱之初不及

理脈輕犯汗戒腎中伏邪從風外擾灼熱漫無止期胃中熱甚譫語不休神識不能主持可知若被下者小

便不利直視失溲膀胱氣化受傷與少陰同時告竭也被火者微則熱傷營氣而瘀熱發黃劇則熱甚生風而如驚癇時瘕癰火熱亂其神明擾其經脈也加燒鍼則耳聾難言但吐少陰伏火上攻本經之竅也少陰脈系咽喉乾痛乃至吐逆唾血多死一逆發汗已是引日待斃再逆火迫神丹莫救矣內經刺熱論溫營交之後病內連腎評熱論溫專言穀氣腎中精勝得汗則生腎中精敗更熱則死長沙更出不盡之藏論腎更視膀胱以緯之膀胱氣化受傷則直視失溲命門精氣告竭神水不能照物其能生乎千金體究長沙餘蘊悟得發汗後汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯借此以治溫病汗後灼熱兼取麻黃升麻湯中歲麤合麻杏甘草僅取方中四味而麻黃升麻湯之格局儼然歲麤滋腎益肺內化厥陰火熱外通少陽風氣佐石膏以降逆滿獨活芎藭杏仁佐麻黃以解鬱蒸得石膏之寒化不獨解表并能散火甘草一味專和麻黃杏仁之性也此方中歲麤白薇青木香石膏自是一路爲方中之主麻黃杏仁芎藭獨活自是一路爲方中之賓作兩路看方得賓主厯然之妙深得風溫主治之奧卽更過於風變爲風溫之病則當以葛根黃芩黃連湯爲主治歲麤湯加減尤爲合宜多有熱傷津液無大熱而渴者不妨裁去麻杏易入葱豉以通陽鬱枯槁以滋津液喘息氣上芎獨亦勿輕試虛不勝寒石膏難以概施或以竹葉清心茯苓守中則補救備至於以補千金之未逮

傷寒膏第三方一首

青膏 治傷寒頭痛項強四肢煩疼方 當歸 芎藭 蜀椒 白芷 吳茱萸 附子 烏頭 甘草 各三兩

右八味咬咀以醋苦酒漬之再宿以豬脂四斤煎令藥色黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳

黃膏 治傷寒赤色頭痛項強賊風走注方 大黃 附子 細辛 乾薑 蜀椒 桂心 各半兩 巴豆七枚

右七味咬咀以醋苦酒漬一宿以臘月豬脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服如梧子大一枚又以火摩身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊風所在摩之神效此趙泉方也

白膏 治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫覆取汗摩身當干過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗之以布拭之傅膏癰腫火灸摩干過日再自消者方 天雄 烏頭 莽草

羊躑躅 各三兩 右四味咬咀以苦酒三升漬一宿作東向露甕又作十二聚濕土各一升許大取成煎豬脂

三斤著銅器中加甕土炊以葦薪令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡遍藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近目

〔衍義〕西北風氣剛勁腠理緻密故取辛熱製膏摩服兼進內外透達以治冬時正傷寒寒氣嚴凝之病東南陽氣易動良非所宜即使西北伏氣發於春夏者咸為切禁

發汗散第四方十一首

度瘴發汗青散

治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項強體疼方

麻黃

三兩半

桔梗

細辛

吳茱萸

防風

白

朮

各一兩

烏頭

乾薑

蜀椒

桂心

各一兩六銖

右十味治下篩溫酒服方寸七溫服取汗汗出止若不得汗

汗少不解復服如法若得汗足如故頭疼發熱此為內實當服散丸若霍氏解散如得便頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病

〔衍義〕

汗散十餘方病因不同毫釐不辨相背千里如度瘴青散乃治山嵐瘴氣之方雖用麻黃草防枯透

表發汗全賴烏桂椒薑朮溫中散邪專為面赤戴陽而設設服之不應頭疼發熱如故此必內有實邪固結又為陽明病面合赤色急須駛鼓丸迅掃中外不當以面赤為虛陽上泛而致扼腕也

五苓散

主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相當者方

猪苓

白朮

茯苓

各十銖

桂心

十二銖

澤瀉

三十銖

右五味治下篩水服方寸七日三多飲水汗出即愈

〔衍義〕

五苓散本太陽熱邪犯本及水逆煩渴之方千金借治時行熱病之熱乘心主狂言煩躁精采不與

人相當取桂心為嚮導引領諸邪從水道開泄也又主瘦人臍下有悸吐涎沫癰眩而濕熱發黃亦取用之

金匱方加茵陳尤為合轍

崔文行解散

治時氣不和傷寒發熱者方

桔梗

細辛

各四兩

白朮

八兩

烏頭

一斤

右四味治下篩若中

傷寒服錢五七覆取汗解若不覺復小增之以知為度若時氣不和日服錢五七辟惡氣欲省病者服一服

皆酒服

〔衍義〕時行有冬春之不同南北之區別此專主西北冬時時氣不正之病以西北風高氣烈非烏頭風藥不能通達嚴厲之氣佐以白朮實脾杜風細辛內搜經絡桔梗外開皮腠也

六物青散

治傷寒赤色惡寒方

附子

白朮各一兩六銖

防風

細辛

各一兩十八銖桔梗

烏頭

各三兩十八銖

右六味

治下篩以溫酒服五七不知稍增之服後食頃不汗出者進溫粥一杯以發之溫覆汗發熱可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸

〔衍義〕青散卽前解散加附子防風以搜少陰之邪專爲面赤戴陽而設得汗不解當服神丹專取半夏烏頭反激以祛寒氣厥逆也

青散

治春傷寒頭痛發熱方

苦參

厚朴

石膏

各三兩十銖

大黃

細辛

各二兩

麻黃

五兩

烏頭

五枚 右七味

治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故也

〔衍義〕青散專治西北傷寒內外熱邪交結故首取苦參以治心腹結氣佐厚朴石膏大黃開泄於內細辛麻黃開發於外苦參得烏頭共解心腹寒熱互結之邪也

詔書發汗白薇散 治傷寒三日不解者方 白薇十一銖 杏仁 貝母各十銖 麻黃一兩八銖 右四味治下篩酒服

方寸七自覆汗出即愈

〔衍義〕此於麻黃湯中以白薇之苦泄易桂枝貝母之甘寒易甘草治傷寒三日不解既散表邪兼解內熱

麻黃湯之變法也

華佗赤散 治傷寒頭痛身熱服背強引頸及中風口噤瘧不絕婦人產後中風寒經氣腹大方 丹砂十二銖

蜀椒 蜀漆 乾薑 細辛 黃芩 防己 桂心 茯苓 人參 沙參 桔梗 女萎即萎蕤 烏頭各十銖

雄黃二十銖 吳茱萸三十銖 麻黃 代赭各二兩半 右十八味治下篩酒服方寸七日三耐藥者二七覆令汗出欲

治瘧先發一時所服藥二七半以意消息之細辛薑桂丹砂雄黃不熬餘皆熬之

〔衍義〕麻烏辛桂椒薑茱萸一派辛溫散表藥中而兼黃芩女萎砂桔防己清解麻烏等熱毒參苓守五臟

真氣丹砂雄黃性雖重著得麻烏薑辛鼓舞之力當無鬱遏邪氣之虞代赭鎮攝逆氣本經有治賊風蠱毒

腹中毒邪女子赤沃漏下之功蜀漆專主寒熱痰積故可兼治瘧證之寒熱不絕

赤散 治傷寒頭痛項強身熱腰痠痛往來有時方 乾薑 防風 沙參 細辛 白朮 人參 蜀椒

茯苓 麻黃 黃芩 代赭 桔梗 吳茱萸各一兩 附子一枚 右十四味治下篩先食酒服一錢七日三

〔衍義〕即前華佗赤散中除去丹砂雄黃烏頭蜀漆防己桂心女萎而易白朮附子防風與前方格局雖同