



張氏醫通卷之二

長洲石頑張璐路玉父纂述

登誕先

男

倬飛疇

叅訂

諸傷門

傷寒

傷寒雜病世分兩途。傷寒以攻邪爲務。雜病以調養爲先。則知工傷寒者。胸中執一汗下和解之法。別無顧慮正氣之念矣。雜病家寧不有攻邪之證耶。祇緣

膠執已見。不能圓通。以致傷寒一切虛證壞證。不敢用補。雜病一切表證實證。不敢用攻。舉俗所見皆然。病家亦寧死無怨。良由聖教久湮。邪說橫行之故。是不得不以傷寒入門。見證定名真訣一句喝破。令雜病家粗知分經辨府。不致妄爲舉措。寧無小補於世哉。姑以陰陽傳中冬溫溫熱時行大綱辨述如左。一陰陽傳中。如交霜降節後。有病發熱頭痛自汗脈浮緩者。風傷衛證也。以風爲陽邪。故只傷於衛。分衛傷。所以腠理疎。汗自出身不疼。氣不喘。脈亦不緊。如

見惡寒發熱頭疼骨節痛無汗而喘脈浮緊者寒傷  
營證也以寒爲陰邪故直傷於營分營傷所以腠理  
固閉無汗而喘身疼骨節痛而脈不柔和如見發熱  
惡寒頭痛身疼汗不得出而煩躁脈浮緊者風寒併  
傷營衛也以風爲陽邪無竅不入風性善動法當有  
汗寒爲陰邪萬類固閉寒氣斂束鬱遏腠理所以不  
得外泄熱勢反蒸於裏而發煩躁也上皆太陽經初  
病見證有桂枝麻黃青龍三法。若交陽明之  
經則惡寒皆除但壯熱自汗而脈浮數以陽明內達

於胃多氣多血邪入其經蒸動水穀之氣故皆有汗  
但以能食爲陽邪屬風不能食爲陰邪屬寒辨之。  
若交少陽之經則往來寒熱口苦脇痛以其經居表  
裏之半邪欲入則寒正與爭則熱所以只宜和解而  
有汗下利小便三禁。至其傳變雖有次第本無定  
矩有循經而傳者有越經而傳者有傳遍六經者有  
傳至二三經而止者有犯本者有入府者有邪在太  
陽不傳陽明之經卽入陽明之府者有陽明經府相  
傳者有從少陽經傳入陽明府者所以仲景有太陽

陽明正陽陽明。少陽陽明之異。或云少陽無逆傳陽明之理。殊不知胃爲十二經之總司。經經交貫。且少陽之經在外。而陽明之府在內。何逆之有。至若傳入陰經。亦有轉入胃府而成下證者。太陰藏府相連。移寒移熱最易。少陰亦有下利。清水色純青。心下痛。口乾燥者。厥陰亦有下利。讖語者。此皆陰經入府之證。少陰更有移熱膀胱之府。一身手足盡熱。小便血者。厥陰亦有轉出少陽。嘔而發熱者。二經接壤故也。又有轉出太陽表證者。如下利後清便自調。身疼痛。此

陰盡復陽也。夫所謂犯本者太陽經邪入膀胱之本如煩渴引飲水入卽吐小便不利者風傷衛之犯本也如熱結膀胱其人如狂或下血者此寒傷營之犯本也。所以仲景有五苓桃核承氣之分。邪熱入胃則當詳三陽明之原而與三承氣緩急分治。蓋陽明居中萬物所歸無所復傳至此悉宜攻下。但須俟結定則熱邪盡歸於胃然後下之。若結未定而下早則有結胸痞斯挾熱利等證。以邪熱歸併中土未盡乘機內入而爲變矣。故傷寒家有汗不厭早下不厭

遲發表不開不可攻裏之戒。邪在少陽入犯膽府則胸滿驚煩小便不利一身盡重不可轉側或入血室則晝日明了夜則譫語如見鬼狀皆宜按證求治。但此經之要全重在於胃氣所以小柴胡中必用人參仲景云胃和則愈胃不和則煩而悸之語乃一經之要旨也。至傳三陰太陰則腹滿時痛少陰則腹痛自利下重小便不利甚則口燥心下痛厥陰則寒熱交錯寒多熱少則病進熱多寒少則病退大抵少陰傳經熱邪必從太陰而入厥陰必從少陰而入非

若陰證有一入太陽不作鬱熱便入少陰之理當知傷寒傳經之證皆是熱邪經中邪盛而溢入奇經故其傳皆從陽維而傳布三陽陰維而傳布三陰與十二經藏府相貫之次第無預也其邪必從太陽經始以冬時寒水司令故無先犯他經之理但有他經本虛或爲合病或爲越經或陷此經不復他傳非若感冒非時寒疫之三陽混雜也大抵寒疫多發於春時春則少陽司令風木之邪必先少陽而太陽陽明在外病則三經俱受以是治感冒之方若香蘇芎蘇參

蘇正氣十神之類皆三經雜用不分耳。試觀夏暑必傷心包。秋燥必傷肺絡。總不離於司運之主令也。其有誤治而成壞證者。證類多端。未能悉舉。卽如結胸痞滿。良由誤下表邪內陷。故脈必有一部見浮。蓋寒傷營。營屬血。而鞭痛者爲結胸。風傷衛。衛屬氣。而不痛者爲痞滿。然痞滿之基。多由其人痰溼內蘊。非若結胸之必因下早而陽邪內陷。此大小陷胸五種瀉心分司結胸痞滿諸治也。至於懊懣諸證。無結可攻。無痞可散。惟梔子豉湯可以開發虛人內陷之表。

邪一湧而迅掃無餘。卽勞復食復。但於方中加枳實一味。其溫熱時行。亦可取法乎此也。至於陰證。旣無熱邪氣蒸。萬無傳經之理。卽有陰邪。陰主靜。斷不能傳原。其受病必先少陰。或形寒飲冷傷脾。則入太陰。有之其厥陰之證。無不由少陰而病。所以少陰溫經之藥。峻用薑附。四逆。厥陰風木之藏。內伏真火。雖有陰寒。不過更桂之屬。若當歸四逆。加吳茱萸。換肉桂足矣。不必薑附也。然仲景厥陰例中。非無四逆等治也。當知厥陰之寒。皆是由少陰虛寒而來。故用薑

附合少陰而溫之。所謂腎肝同治也。卽太陰未嘗不用四逆也。亦是命門火衰不能生土致病。故必兼溫少陰。所謂治病必求其本也。夫治傷寒之法。全在得其綱領。邪在三陽。則當辨其經府。病入三陰。則當分其傳中。蓋經屬表。宜從外解。府屬裏。必須攻下而除。傳屬熱。雖有陽極似陰。厥逆自利等證。但須審先前曾發熱。頭痛至四五日。或數日而見厥利者。皆陽邪亢極。厥深熱深之證。急當清理其內。誤與溫藥必死。但清之有方。須知陽極似陰之證。其人根氣必虛。

卽與救熱存陰。須防熱去寒起。間有發汗太過而成  
亡陽之候。亦有攻下太過而陰陽俱脫者。不妨稍用  
溫補。然脫止陽回。卽當易轍。不可過劑。以耗其津。况  
此證與真陰受病不同。中屬寒。雖有陰極似陽發  
熱躁悶等證。但須審初病不發熱。無頭痛。便嘔吐。清  
水。踰臥足冷。自利腹痛。脈來小弱。至四五日。或六七  
日。反見大熱躁亂。欲坐臥泥水中。渴欲飲水而不能  
下。喉脈虛大。不能鼓激者。此陰盛格陽之假熱。陽欲  
脫亡之兆。峻用參附無疑。有卒暴中寒厥冷不省。

者此真陽大虛寒邪斬關直入之候丹溪所謂一身受邪難分經絡是也非頻進白通通脈不能挽回。更有少陰中風雖不發熱亦無自汗厥冷嘔吐下利等證但覺胸中痞滿不安不時心懸若饑自言腹滿他人按之不滿手足自溫六脈小弱而微浮者此爲陰經陽邪入罕能識惟宜黃耆建中稍加人參熟附溫散其邪若挾飲食則氣口濇滯亦有模糊不清者當與枳實理中手足微冷加附子若誤與發散必死破氣寬中亦死消尅攻下亦死若峻用四逆傷犯真

陰多有欬逆血溢之虞。此證初時不以爲意。每每委之庸師。所以犯之百無一生也。

冬溫。冬時天氣大燠而見發熱欬嗽者。此爲冬溫。以伏藏之令而反陽氣大泄。少陰不藏。非時不正之氣。得以入傷少陰之經。陽氣發外。所以發熱。熱邪傷氣。所以欬嗽。其經上循喉嚨。所以喉腫。下循腹裏。所以感之深者。則自利也。冬溫本秋燥之餘氣。故咽乾痰結。甚則見血。與傷風之一欬。其痰卽應不同。欬則顛脹者。火氣上逆也。欬甚則藏府引痛者。火氣內鬱。

也其脈或虛緩或虛大無力亦有小弱者熱邪傷氣  
故也若腎氣本虛則尺中微弦暮則微寒發熱素常  
氣虛則氣口虛大身熱手足微冷或有先傷冬溫更  
加暴寒寒鬱熱邪則壯熱頭痛自汗喘欬脈來浮舉  
則微弦中候則軟滑重按則少力雖有風寒切不可  
妄用風藥升舉其邪輕則熱愈甚而欬愈劇重則變  
風溫灼熱而死亦不可用辛散多致咽喉不利唾膿  
血痰中見血其則血溢而泄發斑痧惑往往不救又  
不可用耗氣藥多至致劇痛引周身而熱足冷而致

危候惟宜加減葱白香豉湯調之。兼有風寒外襲則加羌活紫蘇。寒邪盛極而發煩躁者。但於前藥中稍加麻黃五七分。石膏錢許。或葳蕤湯本方主之。緣此證見於冬時。舉世醫流莫不以傷寒目之。而與發散致天枉者不可枚舉。曷知西北二方患真中風傷寒者最多。患冬溫者絕少。間有傷於火炕者。亦有傷於火而復傷於寒者。可與越脾湯桂枝二越脾一湯。以其地厚質實。可勝攻伐。非若東南之稟氣孱弱也。至如大嶺以南。陽氣常泄之地。但有瘴癘之毒。絕無傷