

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣目錄

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

保生湯

加味六君湯

加味溫膽湯

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

加味膠艾四物湯

蜜消湯

膠艾四物湯

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

子腫子氣子滿脆脚皺脚證治

茯苓導水湯

子煩證治

知母飲

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

子癇證治

羚羊角散

釣藤湯

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

子淋證治

加味五淋散

激經胎漏尿血總括

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀芎酒

加味四物湯

胎不安小產墮胎總括

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

墮胎下血不止證治

瘀血不出證治

獨參湯

回生丹

子死腹中證治

佛手散

平胃散

辨子母存亡

胎兼癥瘕

胎不長證治

子瘕證治

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

藏燥證治

甘麥大棗湯

鬼胎總括

腸覃石瘕證治

香棱丸

胎前母子盛衰

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸證門

胎前總括

妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩懸痛嗽轉胞與
子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘖臟
燥鬼胎連餘病當叅雜證治須知刻刻顧胎原

註

此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩
子懸子癰子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不

安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘖臍燥
鬼胎等證皆當一一詳辨熟記其餘胎前傷
寒傷食瘧痢霍亂泄瀉當於雜證門中叅考
治之但須時刻保護胎原不致誤犯爲要也
惡阻總括

心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主
弱更分胎逆痰熱寒

註

婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名曰惡阻
若無他病擇食者須隨其意而與之輕者過

期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃
弱爲主更審其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆
與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏
陳草量加參枳引生薑

註

惡阻有因胎氣阻逆者乃受胎後胞門閉塞
藏氣內阻挾胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐

也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而
亦有惡阻證者宜用保生湯卽砂仁白朮香
附烏藥陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔
也若氣弱者量加人參氣實者量加枳殼
加味六君湯

痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枇杷藿香旋
和枳熱秘苓軍寒桂薑

註

惡阻因於痰飲者其吐必多痰水且心煩頭
目眩暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用

加味六君湯於六君湯內加枇杷葉藿香旋覆花縮砂枳殼若胃熱便秘加黃芩大黃以利之胃寒喜熱加肉桂乾薑以溫之

六君湯 方見首卷

加味溫膽湯

熱阻惡食喜涼漿心煩憤悶溫膽湯橘半茯苓與枳竹更加芩連蘆麥蘆

註惡阻因於胃熱者必嘔吐心中熱煩憤悶喜飲涼漿也宜用加味溫膽湯其方卽陳皮半

夏茯苓甘草枳實竹茹名溫膽湯更加黃芩
黃連蘆根麥門冬引生薑也

胞阻總括

凡妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎
敗腹少腹胞寒水尿難

註孕婦腹痛名爲胞阻須審其痛或上在心腹
之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者
多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必
因胞血受寒或停水尿難作痛也

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

心胃痛多傷食滯蒼朴陳甘果枳麴便秘加軍倍
甘草胎動延胡四物宜

註孕婦心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散

卽陳皮厚朴蒼朮甘草也加草果枳殼神麴
以消之若更大便秘結日久則加消黃以攻
之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎若腰

腹作痛胎動下血則當用四物湯君以延胡以定痛而保胎也

四物湯 方見首卷

加味膠艾四物湯

蜜消湯

腹腰痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱外邪宜加羌活內熱便秘蜜消攻

註

胞蒂繫於腰凡腹腰痛者須防胎墮宜用膠艾四物湯加杜仲大豆淋酒葱白以定痛而