

511

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之四目錄

實熱生瘡症

加味四物湯一芎歸湯 擦藥一方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風清脾飲

胞生痰核症

防風散結湯 清胃湯

木疔症

羚羊角飲子  
平肝清火湯

火疔症

洗心散

土疔症

清脾散  
敷藥方

金疔症

瀉肺湯

水疔症

蠲毒飲

大皆漏症

燥濕湯

五花丸

小皆漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小半黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

鱗皮膏

五灰膏

起曉膏 夾眼法

皮急緊小症

神効黃芪湯 東垣撥雲湯

胞翻粘瞼症

排風散 龍膽丸

胞輪振一症

當歸活血飲

胞虛如毬症

調壓清毒飲

兼胎症

保胎清火湯 簡易知母飲 天門冬飲子

芎蘇散 消風散 天冬飲子

為產症

熟地黃湯 四物補肝散 四製香附丸

濁害清和症

穀精艸湯 退翳散 望月丸 踈風湯

通竅散 胎兔丸 清解散 補元散

加味地黃丸 退雲散 固本犀角湯

附治小兒疰疹瘡傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消疖退雲飲 九味蘆薈丸 生熟地黃丸

鷄肝散 龍膽蘆薈丸 消疔散 天麻丸

寶鑑灸雀目疔眼法 升麻乾葛湯 車前子散

養肝丸 通頂散

輓轡轉關症

鈎藤飲子

雙目睛通症

牛黃丸

附小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞶動目劓

諸症驗方

碧霞丹 四味肥兒丸 九龍陞涎散 柴胡清肝飲

終 人參湯 生地黃散 瀉青丸 和太師牛黃丸

傅氏眼科審視瑤函卷之四

秣陵傅仁宇允科纂輯

婿張文凱廷獻纂

廣陵林長生聲震較補

男傳維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁顓

工次

運氣原證

按內經運氣目皆瘍有二。一曰熱經云。少陰司天之政。三之氣。天火行。寒氣時至。民病目赤。皆瘍。治以寒劑是也。二曰燥經云。歲金太過。民病目赤。皆瘍。又云。陽明司天。燥淫所勝。民病目眦皆瘍。治以溫劑是也。



目瘍

內經曰諸痛者瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有所疾蓋心主血而血熱生風鬱甚則遇相傳襲故火

能生土血注陽明則肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其名不一有黃濃而白者土生金母歸子也始生微癢而熱輕腫痛爛為熱極血凝化水氣滯成膿甚至寒熱作而飲食減尤為慮宜泄風毒使火解胃熱按目瘡瘍皆因君火司令燥火熱邪所致宜溫宜涼隨症施治可也

### 實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有經洎如湯樣注澀急且羞明脾或  
竝多潰胞中椒粟成瘡生於背心上心火熾盈臉外脾家  
燥唇邊亦土形肺熱形於鼻週身旺六經耳熱知腎燥滿  
面六陽蒸三焦炎項上下部六陰乘失治應須變傷睛目

欠明

此症謂目病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則有堆積高厚紫血膿爛而腥臭者乃氣血不和火實之邪血分之熱尤重如瘀滯之症膏混水濁每每流於脾眥成瘡瘀血散而瘡自除勤勞濕熱之人每患脾眥成瘡別無痛腫症者亦輕而無妨若火盛瘡生惟重滯腫痛者又當急治恐濁氣沿於目內而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他症凡見瘡生當驗部分以別內因何源而來隨其輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

連翹

天花粉 防風 赤芍藥 當歸 荆芥穗各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎 當歸 赤芍藥 防風 羌活各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓頻洗叫血活風去

搽藥方 治服皮外滿臉生瘡潰爛疼痛

血竭 乳香 沒藥 輕粉 佗僧各等分

右研為細末搽於瘡處。

又方 治眼胞上或不臉生瘡破流黃水陰開者。

青黛一錢 黃栢末 潮腦 輕粉各一錢 松香一錢

右爲細末。用舊青布捲藥在內。棘油濕透。燒灰。俟油灰  
滴於茶鍾內。蘸搽。

椒瘡症

血滯脾家。胞上起熱瘡。泪多並赤腫。沙擦最難當。或疼  
兼又癢。甚不便開張。可惡愚頑者。全憑出血。良目睛。惟仗  
血血損。目無光。輕時須善逐。太重脾必傷。胞內紅癩。癩風  
熱是椒瘡。

此症生於胞內。紅而堅者是。目間沙擦難開。多泪而痛。  
人皆稱粟瘡。悞矣。夫粟瘡亦生在胞。但色黃軟。不易散。  
此症雖堅。却易散。俗皆以龍鬚燈心等物出血。取效殊。

不知目以血為榮。血損而光華有衰弱之患。輕者只宜  
 善治。至於癩癩連片。跣踏高低不平。及血瘀滯者。不得  
 已而導之。中病即止。不可太過。過則血損。恐傷真水。難  
 養神膏。大槩用平治之法。退而復來。乃內有瘀滯。方可  
 量病漸導。若初治不可輕為開導。孟浪恐有損也。不如  
 謹始為妙。宜服

歸芍紅花散 治眼胞腫硬。內生疔瘡。

當歸 大黃 梔子仁 黃芩 紅花 以上俱酒洗微妙

赤芍藥 甘草 白芷 防風 生地黃 連翹 等分

右為末。每服三錢。食遠白水下煎服。

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲。粟瘡胞內起。粒粒似金珠。細顯似膿來。却軟散風清熱早醫治。

此症生於兩胞之內。細顯黃而軟者是。今人皆稱椒瘡。爲粟瘡者悞矣。夫椒瘡紅而堅。胞必腫硬。睛必沙瀆。症尚易治。若粟瘡一見目疼頭痛者。必有變症。粟瘡是風熱鬱於上焦極重。但以散風清熱爲主。二症雖皆生于胞內。屬於血分。椒瘡紅堅。易散。粟瘡黃軟。不易散。故治亦不同。豈可槩論哉。宜服

除風清脾飲

廣陳皮 連翹 防風 知母 玄明粉 黃芩

玄參 黃連 荆芥穗 大黃 桔梗 生地 各等分

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓。食遠服。

目疣

此症或眼皮上下。生出一小核是也。乃脾胃痰氣所致。上臉屬脾經。下臉屬胃經。若結成小核。紅而

自破。不藥而愈。若堅自不破。久則如盃如拳而成。癩矣。若初起小核時。即先用細艾。如粟米壯。放患處。令患目者臥。目緊閉。以隔蒜片。灸三四壯。外將膏藥貼之。又用紫背天葵子。揀淨二兩。煮甜酒一壺。生皂角子二三粒。炮熟。研細飲酒時。搽疣上。自消。

胞生痰痰症

凡是胞生痰核。痰火結滯所成。皮外覺腫如豆。胞內堅實。有形。或有不治自愈。或有壅結為癭。甚則流膿出血。治之

各不同名此火土之燥毋向外求情若能知劫治頃刻便  
河平

此症乃胞外皮內生顆如豆堅而不疼火重於痰者

色紅紫乃痰因火滯而結此生於上胞者多屢有不治

自愈有恣辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變為癭漏重

疾者治亦不同若初起知劫治之法則頃刻而平復矣

宜服

防風散結湯

玄參

前胡

赤芍藥

黃芩

桔梗

土貝母

防風

蒼朮

白芷

陳皮

天花粉

各八分



右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後熱服。

清胃湯 治眼胞紅硬此陽明經積熱平昔飲酒過多而好食辛辣炙燂之味所致也。

山梔仁炒 黑枳殼 蘇子各六分 石膏煨 川黃連炒 陳皮

連翹 歸尾 荆芥穗 黃芩 防風各八分 甘草生二分

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服。

### 木疳症

木疳多在風輪生碧綠青藍似豆形如是昏沉應不痛若然泪澀目多疼莫教變症侵眸子不散瞳神便破睛。

此症生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二症虛者大而昏花實者小而痛澀非此蟹睛因破而出乃自然