

閻誠齋先生胎產心法

汝陰李廷璋璞齋編訂

孫男玉五麟並重刊
曾孫宗棠蔭桂校

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼。重則脹滿疼痛。謂之子懸。紫蘇飲爲必用之藥。蓋因紫蘇飲。而妊娠胎氣不和。濁氣舉胎上湊。胎熱氣逆。心胃脹滿之證。且此證其來居多。宜疎氣舒鬱。非紫蘇。腹皮。川芎。陳皮。無以流氣。非歸芎。無以養血。氣血既利而胎自降。然邪之所湊。其正必虛。故以人參。甘草。祿之。如飲食不甘。加四君子。有熱加苓。梔。歸芎。內熱。暄熱。或

四君兼逍遙散。若常常多怒時覺脹滿。服順氣藥不應。宜
用和氣安胎飲。或加味逍遙散。胎上攻而作痛。宜紫蘇飲。
或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿。安胎飲力薄。宜用加參
平胃散。有因鬱滯者。亦宜紫蘇飲。加味歸脾湯。有因痰
結聚者。紫蘇飲加苓。貝母。有因暴怒者。左關必弦洪。肝
火內動。用小柴胡。加桑。杏。枳。殼。山。梔。大抵胎氣上逆。皆屬
火旺。急用芩。朮。香附之類。不可服大寒之藥。反致他變。予
每治孕婦。心胃脹滿。用尊生和氣飲。甚效。子懸證。有兩尺。
脈絕。餘脈平和。不可錯認死胎。且死胎有面青舌青。可辨。

宜紫蘇飲治之。則胎歸原位。脹消脉起矣。如臨月胎上逼心。嘔噦欲死。急用童便灌之。卽下。或烏梅肉十枚研爛。入生薑三片煎湯灌之。亦下。取酸以降。歛之。兼辛以散火氣之逆也。又有坐草反腰恐懼氣結不行。紫蘇飲一服便產。○後

四君子湯治胃氣虛弱。食倦怠少食。

人參 一錢至三錢
白朮 一錢至二錢土炒黃

茯苓 一錢至錢半
炙甘草 六分至一錢

水煎服

逍遙散

附八味逍遙散又名加味逍遙散

治血虛肝

燥。骨蒸勞熱往來寒熱。咳嗽潮熱。月經不調。口乾。

便澁。

柴胡

當歸 酒拌

白芍

酒炒

白朮 土炒

茯苓

各一錢

炙草 五分

加煨薑、薄荷引水煎服。○一方無茯苓、薄荷有茯神、生

薑為引。治肝脾血虛、鬱怒傷肝、血少目暗、發熱脇痛等

證。○加丹皮、梔子

各七分

名八味逍遙散。又名加味逍

遙散治小便帶血。或過勞及多食炒炙。宜清膀胱之火。

柴胡當歸加倍。白朮加五分。

和氣安胎飲 治孕婦多怒。胸中脹滿。若用烏藥香

附砂仁。順氣等藥。反加滿悶。宜服此飲。

人參

白朮 土炒

當歸

酒洗各二錢

川芎

條芩

各八分

陳皮

紫蘇

炙草 各四分

木香

二分磨汁衝服

治產心去

卷之上

治逆上風子懸方

毫

敬真堂

薑引煎服。○一方無木香有砂仁四分。名順氣安胎散。

治孕婦胎氣上攻心腹。脹滿作痛。子懸之證。有因氣惱

者。加木香二分。磨衝服。

加參平胃散。治孕婦脾氣虛弱。飲食停滯。以致腹

脹嘔吐。安胎飲方緩。宜用此散。

人參 白朮土炒各一錢

蒼朮米泔浸製 厚朴薑製七分

陳皮 炙草各四分

薑一片。水煎服。

尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿。

人參

蘇梗

白芍

酒炒

川芎

各六分

當歸

歸

一錢或六分酒洗

腹皮

五分製淨

木香

香

二分磨衝藥服

炙草

三分

水煎服。

附針灸方

妊娠六七個月。飲食絕然不進。胸隔脹水與藥皆不能下。診脉平和。又非病脉。此乃隔氣不通。藥不能治。惟針

灸可通。宜灸內關穴。卽能進飲食矣。其穴在手掌大紋後二寸兩筋間。此穴可針。亦可灸。男左女右。重則雙手同灸。輕者七壯。重加十數壯。艾如黍大。或如麥大。寸取本人同身寸。以男左女右手中指屈回。用草較所屈中指中節內紋兩頭盡處截斷爲準。一寸也。

紫蘇飲

見本卷安胎門

小柴胡湯

見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極如同月水胞乾胎死母亦難保其調治之方已
詳論於胎漏門中茲不重論

妊娠吐血凡七情內傷六淫外感皆足致失血之患一主
火熱者以氣血壅養胎元或有所感則氣逆而火上乘心
煩滿悶血隨而溢甚者或致墮胎但火有虛實之分實火
清熱養血虛火滋陰補水則血安胎固若泛用行血清血
之劑胎必墮而禍不旋踵矣如肝經怒火加味逍遙散膏
梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺經有火黃
芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲氣不攝血補中益氣去升麻

加煨葛根、腎經虛火、冬味地黃湯、

鼻衄不止、東垣涼膈散、加當歸、生地

各一錢

茅花一大團

生薑引

咳嗽咳血、宜涼血、地黃湯、醫通云、咳嗽咯衄、胎前皆不宜
見、如面赤聲啞、不治、又云、凡咯吐血、多致墮胎、胎賴血養、
不宜漏溢、宜紫蘇、飲加條芩、

尿血、乃熱乘血分、流滲於脬、故令尿血、自尿門而下、若胎
漏、則自人門下血、可辨、宜四物加山梔、髮灰、或阿膠、熟地、
麥冬、五味之類、如怒動肝火、小柴胡加山梔、脾氣下陷、及

勞動脾火補中益氣加茯苓車前若厚味積熱加味清胃散若肝脾血熱加味逍遙散

腸風臟毒下血者平胃散去蒼朮加槐角防風當歸烏梅治之

加味清胃散 治胃中蘊熱班疹口舌生瘡齒齦腐

爛出血

生地 四錢

丹皮 五錢

當歸

川連 酒蒸

連翹 去心各三錢

升麻

生甘草 各一錢五分

爲散分三服水煎去滓衝犀角磨汁三四分入藥服之

黃芩清肺飲 治渴而小便不利

梔子 炒黑

黃芩 酒炒

各等分煎服。予謂此方乃治雜證發渴而小便不利。妙在熱服探吐以提則肺氣立清然胎前血證探吐之法似非所宜若服而不吐不特綿延不能刻應縱或小差其苦寒之性畱薄於內大傷氤氲之氣治胎前之證者得不爲之預慮乎。

冬味地黃湯 附丸方

熟地 四錢

山藥 二錢炒

山萸 一錢古方分兩加倍
丹皮

茯苓 澤瀉 各七分

麥冬 一錢或錢半
五味子 十粒

水煎服。○此方藥味十倍之煉蜜丸。即名冬味地黃丸。又名八仙長壽丸。

涼血地黃湯 治妊娠咳嗽吐血咳血

生地 三錢
麥冬 去心

當歸 酒洗各二錢
黃芩 一錢五分

胎產心法 卷之上 諸血證方 聖 敬慎堂

紫苑

知母鹽水炒

白朮土炒

天冬去心各一錢

犀角八分

陳皮

甘草各四分

水煎服有喘加瓜蒌仁一錢

加味道遙散見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘇飲

四物湯俱見本卷安胎門

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散

俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論

子滿證卽俗呼胎水證也。

姙娠子腫與子氣相類。但子氣在下體。子腫在頭面。若子

滿證。又名爲胎水。則在五六月已後。此子氣子腫不同。蓋

胎大則腹滿。遍身浮腫。凡子氣子腫。子滿由臟氣本弱。或

因泄瀉下利。耗傷脾胃。或寒熱瘧疾。煩渴加飲。濕漬脾胃。

胎產心法

卷之上

子腫子氣子滿論

七

敬慎堂

使頭面手足浮腫也。然水漬於胞。兒未成形。則胎多損壞。故初妊卽腫急。宜調治水去脹消。仍用六君子調補。

所謂子腫者。妊娠面目虛浮多。因脾胃氣虛。或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯。如未應。用六君子湯。或加腹皮。車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮湯。治子腫之甚者。

所謂子氣者。妊娠自三月成胎之後。兩足面漸腫至腿膝。或腰以下腫。行步艱難。以致喘悶不寧。飲食不美。似水氣狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能