

許氏醫書五種

傷寒論方合解目錄

卷首

張仲景原序

許星東自序

許綏之序

凡例 二十八條

有關傷寒論雜說 五則

卷一

辨太陽病脈證 四十一條二十方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

卷二

辨太陽病脈證

八十一條二十七方

桂枝加厚樸杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

眞武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

卷三

辨太陽病脈證

五十九條二十七方

抵當湯

抵當丸

太陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

蚊蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷四

辨陽明病脈證入十二條十方

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導法

土瓜根猪膽汁導法

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁丸

梔子蘖皮湯

麻黃連軹赤小豆湯

卷五

辨少陽病脈證 十條

辨太陰病脈證 八條二方

桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯

辨少陰病脈證 四十五條十四方

麻黃附子細辛湯 麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯 附子湯

桃花湯 猪膚湯

甘草湯 桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

通脈四逆湯

四逆散

卷六

辨厥陰病脈證

五十五條六方

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁湯

辨霍亂病脈證

十一條三方

四逆加人參湯

理中丸

通脈四逆加猪膽汁湯

辨陰陽易差後勞復病脈證

七條四方

燒裩散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

辨痙溼喝病脈證

十六條按此篇非傷寒之正論以其與傷寒相似故仲師附於

篇末後賢疑是王叔和從金匱移入於此誤也

張仲景傷寒論方卷三

蜀北射洪許宗正星東合解

堂叔大履綏之校正

辨太陽病脈證篇

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱
細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不
能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐
以醫吐之所致也此爲小逆

太陽病邪傷標本之氣當惡寒而發熱今自汗出
則經氣已通邪隨汗衰故不惡寒發熱腹內候於

關關上脈細數者細爲中虛數爲客熱此非太陽之本病以醫誤吐之之過也一二日交陽明主氣之期吐之則胃氣傷而不能納食脾獨運化則腹中飢也三四日交太陰主氣之期吐之則脾液傷無陰以濟胃故胃不喜糜粥之熱欲食冷食以潤之然雖能食冷食脾傷終不能運化如朝食暮必吐出實以醫誤吐之所致也但養胃調脾卽可以治之故此猶爲小逆此言誤吐有傷脾傷胃之不同也

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近

衣者此爲吐之內煩也。

太陽病必惡寒也。今誤吐之則陽氣升而邪解故不惡寒而反不欲近衣。此爲誤吐擾動胸中之陽氣而心內煩也。此言誤吐傷上焦之津液則心陽不斂而爲煩也。

病人脈數數爲熱。當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微。膈氣虛脈乃數也。數爲客熱不能消穀以胃中冷故吐也。

病人脈數以脈斷之則爲熱。如真熱則當消穀引飲食而反吐者此非真熱也。以發汗過多則胃陽

隨汗泄而微弱不能充實胸膈之氣氣虛不聚而外浮脈乃數也此數爲浮動之客熱必不能消穀以胃中之氣虛冷故作吐也此言不因誤吐而發汗致吐也可與發汗胃中冷必吐蛭互看

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先其時自極吐下者可與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澹此非柴胡證以嘔故知極吐下也

太陽病過經計初病時已十有餘日其邪猶舍陽明分部心胸間故心下溫溫欲吐不吐而胸中痛

邪從陽明中見太陰之濕化故大便反溏腹亦微滿胸雖陽明所主逼近君位故心亦鬱鬱微煩先其醫未診審時病者自欲極吐極下而後安者此陽明分部之邪實也可與調胃承氣湯助其從太陰之化以解之若不欲極吐極下者爲邪虛慎不可與但欲吐胸中痛爲陽明邪實微溏是太陰之轉化不可誤爲柴胡證以胸中邪實作嘔故知必欲極吐下而後安也按欲吐微溏皆非承氣證然審其邪實亦可用之若邪虛誤用必致殺人疑似之間毫釐千里

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

太陽病六日經盡不解至七日復值太陽主氣之期表證仍在太陽其脈則非太陽之浮而反微沉是不獨有表證而亦有裏證也太陽裏證必病結胸今反不結胸是邪不從無形之氣陷而從有形之經脈下行內蘊衝任之血室致其人發狂者此爲熱在下焦少腹當鞕滿然亦有蓄水而滿者不

可不辨若小便自利者知不蓄水爲蓄血在胞中
用藥下其血乃愈所以然者以太陽表邪隨經鬱
爲瘀熱蘊在胞中之裏故也宜抵當湯高子曰太
陽表邪循背下入則爲抵當湯證而屬有形從胸
下入則爲桂枝承氣湯證而屬無形曰抵當曰承
氣則有形無形氣血之分從可識也

抵當湯方

大黃

三兩酒浸

桃仁

去皮

去翅

水蛭

熬各三

枚

右四味以水五升煮取三升去渣溫服一升不下

再服