

疫痧二症合編卷之三

松江李林馥啟賢氏重校

諸城劉奎松峯著輯

男劉秉錦濯西簋述

福山劉嗣宗南瑛參閱

雜疫

葡萄疫

小兒多患此症。以受四時不正之氣。鬱於皮膚。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在偏體頭面。乃為疳症。邪毒傳胃。牙根出血。久則必至腐損。初起宜服羚羊角散。清熱涼血。久則胃脾湯。滋益其內。又有牙根腐爛者。人中白散。
或加羚羊角散 此方銀花羌活僅蠶生地皆可酌入。

羚羊角末

防風

麥冬 去心

元參

知母 酒炒

黃芩

牛蒡子 炒研

甘

草節

金銀花

淡竹葉十餘片煎服。

胃脾湯

此湯必實有不足之症方可用。初起切勿輕投。

白朮 土炒

茯神

陳皮

遠志 去心

麥冬 去心

沙參

五味子 研

甘草

節

虛弱自汗者去沙參加參芪。

人中白散

治小兒走馬牙疳。牙齦腐爛黑臭。

人中白

桑壺中白鹽煨一兩

兒茶 五錢

黃柏

薄荷

青黛 各三錢

冰片

一分五釐

共

為細末。先用溫湯漱淨。吹藥於疳上。日六七次。吹藥涎從外流者吉。內收者凶。

捻頸瘟

其症喉痺失音。頸大腹脹。如蝦蟆者是也。宜荊防敗毒散。

荊防敗毒散

荊芥

防風

羌活

獨活

前胡

桔梗

柴胡

枳殼

麩炒

川芎

酒洗

茯苓

人參

甘草

薑蔥煎食。遠服發冷。倍用蔥。

蝦蟆瘟

其症咽喉腫痛。涕唾稠粘。甚則往來寒熱。身痛拘急。大便秘結。有類傷寒。亦與捻頸瘟相似。但以不腹脹為異。治法涼散和解。攻下敗毒。隨症施治。無不獲愈。方俱散見各醫書本門。不多贅。其治療捷法。於初起時。用手在病人兩臂自肩項。極力將其中凝滯癘氣惡血。趕至手腕數次。用帶子將手腕扎住。不令惡血走散。用針刺少商穴。并十指近甲蓋薄肉正中處。捻出惡血則愈。少商穴在大指外邊。以面靠甲角處。摸有穴者便是。又法將頸項患處口啣鹽水。用力吮啞。俟其皮色紅紫成片則愈。或用針將項下一挑。手捻針孔出血。密密挑捻愈。

大頭瘟

外科門亦名時毒

此症有陰陽。有可汗不可汗者。

其症發於頭上。并腦後項腮頰。與目赤腫而痛。發熱。症似傷寒。治療散見各醫書本門。茲不多贅。用前刺法亦妙。

大力子丸 兼治啞瘡

元參 連翹去隔 甘草 桔梗 川大黃生熱 酌用 石膏蝦研 川連酒炒 黃

苓 荊芥 防風 羌活 大力子研炒 為末作丸或姜煎服亦可。

又方 殭蠶二兩 浸 大黃二兩 薑汁丸彈子大蜜水和服一丸。

又方 普濟消毒散 見醫方集解專治大頭瘟初起。

又方 大頭瘟生疔瘡及喉閉並將疔瘡刺出血即愈。

瓜瓢瘟

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲。

生犀飲

黃土五錢 犀角錢 蒼朮油炒 川連 芥山茶一撮 流水煎入金汁和

服日三夜二虛加人參鹽水炒 大便結加大黃 渴加花粉 表熱去蒼朮黃

土加桂枝性熱能解表 酌加別解不宜當藥 便膿血去蒼朮倍黃土加黃柏使便滑人中黃代金汁。

楊梅瘟 形似楊梅

其症偏身紫皰忽發出微倉者是也。用清熱解毒湯下人中黃丸并刺破出血。微音 枚物

著濕 變色。

清熱解毒湯

芥音介 山名 鏐 音滂 削也

瓢音羊 瓜中實

川連酒洗 黃芩酒洗 生地 白芍酒洗 石膏研服 知母鹽酒炒 人參 甘草 升

麻 葛根 羌活 日三服夜二服薑煎

人中黃丸

大黃三兩浸 蒼朮油炒 桔梗 滑石各一兩 人參 川連酒洗 防風各五錢 香附

兩半薑汁浸生用 人中黃二兩如無坑垢代之 神麴糊為丸清熱解毒湯送 如氣虛用四君

子湯送 如血虛四物湯送 痰甚二陳湯送 熱甚童便送

錦按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛邪也

疔瘡瘰

其症發硬如瘤偏身流走旦發夕死三稜針刺入委中三分出血並服人中黃散

穴在兩腿屈盤當中對膝蓋

人中黃散

人中黃一兩 明雄 硃砂各一兩共末薄荷桔梗湯下二錢日三夜二

消毒丸 治時疫疔瘡惡症

大黃 牡蠣煨 僵蠶炮去涎 各一兩

共為末煉蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

軟腳瘟

焯音翠
澆也

硝礬多
而明雄
五錢少
訛訛
耶作五
分

其症便清泄白。足腫難移。即濕瀰宜蒼朮白虎湯。即白虎湯加蒼朮

絞腸瘟

其症腸鳴乾嘔。或水瀉。氣不通則探吐之。宜雙解散。有陰陽二症。

陰痧 腹痛。手足冷。身上有紅點。用燈草蘸油點着。將紅點焯之。陽痧 腹痛。手

足暖。以針刺少商穴。並十指尖近甲處。刺法見前。此刺法治諸中霍亂。咽喉等病。俱效。

陰陽水方。滾水一盃冷水一盃對服立愈。或加白鹽少許妙。

觀音救苦丹 磨點眼角。二三次。兼治咽喉。傷之症。冷麥大。一

火硝一兩 白礬四兩 黃丹二兩 硃砂明礬各五 以上二方兼治陰陽二痧。

共細研勻化開。候稍冷。搓成小錠。磁器收貯。聽用。氣母出

地漿 於南牆背陰處掘一坑。入涼水一罐。繳之。再候澄清。取飲。

又方 生明礬錢末二 冷水滾水各半。盃調服。

又方 萊菔升一二 水二三桶。熬湯。以甕貯之。令病人澆洗。稍冷。全身入甕中。泡透。或

稍愈。且毋遽出。效。

雙解散 即防風通聖散。洩瀉去硝黃。自汗

防風 荆芥 薄荷 麻黃 白木土炒 川芎酒洗 當歸酒洗 白芍酒炒 連翹

隔去 山梔炒 黃芩 石膏煨 桔梗 甘草 滑石末 芒硝 大黃生熟

醫方集解之雙解散。減去硝黃。引用生薑煎。以上四方專治陽痧。

鷓鴣瘟

其症兩腮腫脹。憎寒惡熱。外用亦小。益柏葉共搗爛。水醋調敷。內用薄荷濃煎湯服之。

龍鬚瘟

其症喉硬。舌強。並牽耳中。急以針刺喉上。橫七針。豎七針。硃砂不拘多少。蜜一匙。入燒酒和勻灌之。

羊頭瘟

其症昏沈不食。用芋頭燒灰存性。研黃酒送下。

蟹子瘟

其症喉痛發熱惡心。痛連腮頰。頭亦痛。喉旁有疔瘡。四散紅絲如蟹爪。壓舌針挑之。要挑爪不可挑頂。每爪上挑一針。令血出。旋以硃砂末搽之。再含咽醋少許。即愈。如刺當中頂。即為傷蟹蓋。必出膿不食而危。

版腸瘟

刮出紫疔瘡六個即難治

其症初發如傷寒熱病。三四日小腹脹滿。不治數日即死。用麻一縷。如指。先自兩肩頭刮至手腕。刮出紫疔瘡。針刺破。擠去惡血。又自兩大腿跟刮至兩足跟。有紫疔瘡。刺破去。

惡血俱男先左又自咽窩刮至臍下刺法如前即時汗愈。

脇痛瘟一名結肋瘟甚惡不治數日即死

其症但脇肋痛。薤白切片。蘸燒酒刮痛處。出痧即愈。未愈用豆油一大盃。銅杓熬三分之一。服之愈。又法青布包黑罈。蘸燒酒刮痧。又法烙香油厚餅。盤口大。乘熱慰痛處。冷即易。可用三四餅。餅棄勿食。忌生冷。

刺蜚瘟痧

其症壯熱煩悶。偏身痛如蜚刺所傷。俗名蜚刺瘟。以痧治之。林月溪患時疫。壯熱口渴。胸腹迷悶。手摩之如蜚刺傷痛。偏體皆然。因放腿灣痧二十餘針。毒血成流。用山甲天蟲角刺。加活血順氣藥。稍飲之而痊。

地葡瘟痧

刺法見上瘟痧

暑熱時疫惡毒之氣。攻於裏則為痰喘。為血瘀。昏迷沈重。不省人事。若元氣壯實內

不受邪。不入於裏。即散其毒於肌膚。血肉之表。為腫為脹。忌飲熱湯熱酒。刺腿灣痧筋。並十指尖出毒血。內服寶花散。

茶調三匙。冷服。桃仁紅花湯。治血結桃仁去皮紅花蘇木錢一青皮八分烏藥分四獨活

白蔞去一錢二分水煎服。紫樸湯。治痧有食氣壅盛者厚朴姜汁山查研三稜義芩枳

實煨連翹隔青皮陳皮細辛分等水煎冷服。

天蟲即
僂蠶角
刺即皂

蟄音茅
俗作家
猫

手足麻瘟

其症先少腹痛作羊毛疔挑之無血隨作紫疔瘡手足麻麻至不知人而死急令人以足踏病者手之三關脈上男踏左手女踏右手用力踏勿放直待四肢不麻病人自覺心頭發火方放之自愈若放之早雖愈後亦纏滯三關脈即兩手寸口診脈處

扣頸瘟

此症仕宦幕友不可不知倘遇患此死者而顧執言為人所偏執可手可補洗冤錄一則

聞之老醫臧枚吉云余少時聞先祖言凡人無故自縊者為扣頸瘟伊時未解詳問及後偏閱方書並無此說辛巳年一人來言其鄉有一婦人平日家道充裕子女成立夫婦和諧忽一日無故自縊幾死救之始免詢之毫無所為惟日鬱鬱不樂臧緇袖中無人處即自縊羅守月餘飲食言動如常述此求治余因憶少時所聞細繹其或是血弱氣盡膝理開邪氣因入與正氣相搏不結於脇下而結於手足厥陰及手太陰之三藏合病者內經曰臆中者臣使老官喜樂出焉今病則憂戚可知刺瘡論曰厥陰之瘡意恐懼腹中悒悒又肝瘡者善太息其狀瘡狂又肺瘡者善驚如有所見瘡如此疫可類推因處一方用香附鬱金雄黃為丸氣湯開臆中之鬱再加二陳以開膈中之痰更加羌活細辛溫肝逐風鬼箭羽丹參赤小豆以通心包兼泄火邪生薑煎服服後竟頭痛發熱身痛瘟疫症悉具自出其袖中之繩云誰納我乎告以自縊茫不記憶寢疾七日又服發汗藥而解始知此症亦係疫癘或百合病之類乎

按既云疫癘之疾何不投火赴水刎頸而必欲自縊乎意或太陰邪氣傳厥陰而風木太過者故不思金及水而獨喜木也緣肺金藏魄肝木藏魂脾土藏意智而心君藏神為一身之主包絡實為臣使代心君行令而主喜樂今手厥陰包絡先病臣使失其喜樂之職以擾心君之神明君火不生土傳足太陰脾而意智不清土不生金因傳手太陰肺而悲憂金不平木因傳足厥陰肝而鬱怒肺金承所不勝而木寡於畏故風木太過且肝之魂挾肺之魄不安於舍出而為祟故喜木而自縊也非有祟憑之乃魂魄意智之厲也或蘇合丸牛黃清心丸當亦可用惜非診其脈色何如也此症原名扣頸傷寒然與寒疾大無涉故改名瘟疫而名實俱當也

狼搗翻有二種

其初喉痛旋氣不通殺人甚速對直虎耳尖照耳輪邊用磁鋒刺出血即愈徐樂然傳又一種心中不安旋不能言牙關緊閉不醒人事身冷出涼汗以手試其兩頰下有斜出一硬物碍手便是竹箸搖開口入指探喉兩旁有物如麥大有單有雙並搗破出血初病血鮮久病血紫立愈指頂先用鹽擦

蚰蜒翻小兒多患此

兩目紅腫鼻流涕日夜啼號以針密刺太陽穴兩眉如指甲大一塊立愈刺後以羊

頭搗爛敷印堂至山根

椅子翻

不語不食形如呆癡用椅子圈手拏處削下木片煎服愈。

扁担翻

發即兩肋撐脹難忍用扁担肩挑處削下木片煎服愈。

王瓜翻

兩脇形如王瓜脹痛用針自咽喉挑起從上而下密挑至臍上橫挑兩肋挑至腰脊骨而止隨挑隨愈初挑無血漸挑即有血挑至腰脊對頭即愈不然再發不救

馬道人傳

遠臍翻

一名沙莒父岳廷臣傳

其症先繞臍痛漸痛至滿腹旋氣塞胃脇兩肋脹滿冲咽喉氣不通不省人事不急治即死先以針挑兩耳尖次挑結喉下咽窩兩骨尖次挑背後肩膊骨下兩骨尖並令出血立愈。

白眼翻

其症唯翻白眼頂門灸三艾如不愈再灸三艾即愈。

疔瘡翻

其症先寒後熱渾身發疔瘡赤紫黑色漸至大惡寒發熱不治即死宜參連散。

參連散

人參

黃連

共為細末等分

麝香

冰片

各少

四味再共研

黃酒調服

外以透骨草黃

龍尾

一名黃連

水洗之

松峯曰一名紫疙瘡與前疙瘡瘟症治迥異

麻雀掙

其症胃背腫痛小腹脹滿見食即嘔心中跳躍挑兩大腿腋見血即愈

鴉子掙

其症眼腫渾身青紫兩脅攻心

句似有落字

大小便不通男挑龜頭女挑雞冠

陰戶出血即愈

烏沙掙

其症兩脇脹胃口痛甚隨將病者手腕趕捻視有紫疙瘡者即此症也治用大針將手腕重刺一針起針時若見紫血噴出沙脹隨消忌食白飯菜豈

黃鷹掙

其症肚腹攪痛翻上翻下治法從臍臍上趕下內中氣血用帶子將兩手腕扎住各指稍抱甲肉上當中刺一針捻出惡血即愈

羊毛掙

一法用青布蘸燒酒偏身擦黃蒿水薰洗亦可汗又法用手推背上二筋撮起指緊時許

其症發熱無汗心內發熱口乾嘔吐前後心毛孔周圍高阜錯認字有紫色三四處即

此症也。治用針挑前後心。挑患處。將羊毛剔淨。蒙被出汗即愈。如不應。再用沙糖少許。生薑三片。武夷茶一撮。同煎服。忌腥冷月餘。無不效。

鵝鴛掙

其症渾身發燒。鮮裏衣。體熱不可當。心口一塊滾上滾下。挑肚臍並兩乳即愈。

烏鴛掙

拘掙同此治法

其症頭痛。頭沈。頭揚。惡心。眼黑。發搐。指甲先青。然後偏體皆青。上吐下瀉。不能言。小腹痛甚。至無脈。身涼。如不急治。傾刻殞命。牙關如閉。速用箸抖開口。令病人捲舌視之。根下如有青紅紫泡。急用針刺。泡見血。用雄黃末點之。滾水和雄黃末飲之。或泡藥點之亦好。被蓋頭出汗即愈。忌風二日。

兔兒掙

其症直走曠野。趑趄不寧。急用涼水和炮藥灌之。只許走治。不許坐治。或有用濕土埋其頭。使聞土氣即愈者。

長蛇掙

其症腹痛打滾。先挑肚腹三針。次頭頂一針。脚心三針。即愈。

纏絲掙

其症腹脹痛。頭痛心翻。一作前後心或有紫黃眼子。針破以醋擦之。如偏體麻木無

此痕者亦是此症。將臑膊腕眼腕青筋針出紫血。用炒鹽調滾水灌之。即愈。水入薑三片亦可。

啞叭掙

其症不能言。用鞋底蘸涼水打頭頂門。如孕婦患此。將頂門髮分開。以手蘸涼水輕輕拍之。即愈。

母猪掙

其症以頭拱地打滾。先針舌根。次將兩手除大指不針。其餘八指。將包甲薄肉。每刺一針。捻出惡血。再用猪槽水洗手腕。即愈。

老鼠掙

其症唇黑紫腫。咽喉紫痛。或膈膨脹。挑眉鬚角。鬚疑作髮見血即愈。或再挑兩肩中心。句疑有錯誤。

蝦蟆掙

其症腹脹滿。或疼痛。將肚臍周圍挑之。又挑小腹三四針。即愈。

海青掙

其症頭痛。搦頭打滾。用帶子扎住頭。然後將眉際眼根。咽窩頂心各處挑之。即愈。忌風三日。眼根即大眼角。

眠羊掙

其症似睡。眉眼不開。轉身疼痛。發脹。喝氣疼痛。治法挑尾把骨根出血即愈。

野雀掙

其症渾身發紅。或前後心有紅黑紫眼。頭痛脇脹挑腋下

髮一針而愈。髮字上落

落用莧菜種煮水洗浴甚良。

狐狸掙

其症痛。或乾噦發嘔。不思飲食。頭仰。渾身出汗。張口亂

窩並前

後心則愈。

其症

其症脇脹。心痛。翻起唇來挑裏邊挑唇上牙花即愈。

鷹嘴掙

其症肚脹。頭暈。眼黑。心內脹。用白凡水灌之。再挑後心及耳稍即愈。

又方胡椒粒生薑七片

陳麥糠一撮同所爛酒煎去渣調四錢服

松峯按諸掙挑刺。隨即將惡血捻出為妙。有病深重者挑刺無血必用手極力

捻之見血即愈。諸掙遇有口噤不開者。用烏梅揩擦牙齦涎出即開。蓋酸先入筋。木能尅土。使牙關酸軟則開矣。若用鉄器等攪之。恐傷其齒。

右諸掙症治。余得之岱宗石壁間錄。而藏諸篋笥。遇患是疾者。如法施治。歷有奇效。後余游秦晉。於太行道中。亦見粘一紙於壁。前於見者。大同小意。俱變掙為翻。蓋因其方言各異耳。而症治則無殊也。因取而對較增訂之。以廣為流布。至其命名。亦各有義意。甚毋以其涉俗而忽之。松峯再誌。

赤膈類傷寒

松峯曰。是皆疫症。實非傷寒也。

凡胸膈赤腫疼痛。頭痛身痛。發熱惡寒。名赤膈傷寒。宜荆防敗毒散。見按加薑仁。黃連黃芩。紫金皮元參。赤芍升麻白芷。如症有表復有裏。而胸膈赤腫疼痛者。雙解散。見按加薑仁。黃連紫金皮。如表症已退。大便燥實。胸膈腫痛者。涼膈解毒。加薑仁。枳殼桔梗。紫金皮。赤芍。又宜稜針刺腫處出血。如半表半裏。胸膈腫痛者。小柴胡湯加桔梗。薑仁。紫金皮。赤芍。

涼膈散

連翹

去

大黃

酒浸

甘草

梔子

炒黑

黃芩

酒炒

薄荷

加竹葉生蜜煎

黃耳類傷寒

凡耳中策策痛者。是風入腎經也。久則變惡寒發熱。脊強背直。如瘧之狀。曰黃耳傷

解言物
之稀為
解散為
即此二
字之說

寒宜小續命湯加蠶蠶焙天麻酒焙羌獨焙酒次用荊防敗毒散加細辛白芷蟬退去足黃翅 芩赤芍紫金皮

小續命湯

防風 桂枝 麻黃 杏仁炮去皮 川芎酒洗 白芍酒炒 人參 甘草 黃芩

炒酒 防己 附子製

解者類傷寒按素問尺脈緩澁謂解者春亦與此處所講不同

煩痛飲食不美食不知味俗呼為砂病內經名為解休原其因或傷酒中濕感冒風寒房事過多婦人或經水不調氣血不和皆能為此似砂病實非砂病也治宜先釀熱水打其臂膊裏面或以麻蘘水刮之刮打必皆令其皮紅紫為度更宜針刺十宣委中二穴出血當服蘇香合丸

蘇香合丸

麝香 沈香 丁香 檀香韻 香附 華撥 白朮 訶子煨去核 硃砂 青

木香 烏犀角各二 薰陸香 龍腦各一 安息香二分為末用無反酒熬膏 蘇合油入息香內

錢二共為細末用安息膏並煉蜜丸如彈子蠟包用時溫水化服一丸丸用蠟包不出氣為妙

砂病類傷寒