



本草綱目穀部目錄第三十二卷

李時珍曰太古民無粒食茹毛飲血神農氏出始嘗草別穀以教民耕蓺又嘗草別藥以救民疾天軒轅氏出教以烹飪制爲方劑而後民始得遂養生之道周官有五穀六穀九穀之名詩人有八穀百穀之詠穀之類可謂繁矣素問云五穀爲養麻麥稷黍豆以配肝心脾肺腎職方氏辨九州之穀地官辨土宜種種之種以教稼穡樹蔬皆所以重民天也五方之氣九州之產百穀各異其性豈可終日食之而不知其

氣味損益乎於是集草實之可粒食者爲穀部凡七

十三種分爲四類曰麻麥稻曰稷粟曰菽豆曰造醴

舊本米穀部三品共五十先種今併入

九種移一種入菜部自草部移入一種

神農本草經七種

梁陶弘景註

各醫別錄一十九種

隋弘景註

唐本草二種

唐蘇恭

藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺十一種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

食療本草三種

唐孟説

開寶本草二種

宋馬志

嘉祐本草三種

宋朱掌禹錫

圖經本草二種

宋朱蘇頌

日用本草一種

元吳瑞

本草補遺一種

元朱震亨

救荒本草一種

周

食鑑本草一種

原

明李

食物本草三種

明汪

本草綱目

十五種

明李

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

齊徐之才藥對

宋雷敦炮炙

唐楊損之刪繁

蕭炳四聲

孫思邈千金

南唐陳士良食性

蜀韓保升重註

宋寇宗奭衍義

金張元素珍朱囊

元李杲活象

王好古湯液

明王綸集要

汪機會編一

陳嘉謨蒙筌

穀之一

麻麥稻類一十二種

胡麻

本經

卽油麻

亞麻

圖經

卽

壁虱胡麻

大麻

本經

卽麻蕡

小麥

別錄

大麥

別錄

穢麥

別錄

雀麥

唐本
卽燕麥

蕎麥

嘉祐

苦蕎麥

綱目

稻

別錄
卽糯米

梗

別錄

秈

綱目

右附方書七十三新一百六十六

玉參會藥

王

秋

古

馬

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

刺

裏

裏

裏

裏

裏

裏

裏

裏

裏

裏

金

銀

元

素

火

水

土

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

葛

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

蘿

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

雷

朱

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

當

李

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

草

本

本草

本草綱目穀部第二十二卷

穀之一

麻麥稻類計六種

胡麻

別錄上品

枝正

今據沈存中寇宗奭二說併入本經清裏及嘉祐新立白油麻

胡麻油

苗莖或根皮

根皮

根皮

根皮

根皮

根皮

根皮

根皮

釋名巨勝

本經

方莖

異

油麻

食錄

脂麻

衍義

俗作芝

麻非

葉名青囊

音箱

莖名麻蕷

音皆

亦作𦨇

○時珍曰

沈存中筆談云胡麻

以

節今油麻更無他說古者中國止有大麻其實爲

張騫使張騫始自大宛得油麻種來故名胡麻以

別中國大麻也寇宗奭衍義亦據此釋胡麻故今

併入油麻焉巨勝卽胡麻之角巨如方勝者非二

物也方莖以莖名狗蕷以形名油麻脂麻謂其

脂油也按張揖廣雅訛麻一名藤弘弘亦巨也別

脂油也按張揖廣雅訛麻一名藤弘弘亦巨也別

錄一名鴻藏者乃藤弘之誤也又杜賓拾遺記云隋大業四年改胡麻曰交麻

集解

別錄曰胡麻又名巨勝生駐黨川墜秋稼之青叢巨勝苗也生中原州谷弘景曰胡麻入

穀之中惟此爲良純黑者名巨勝巨者大也本生大宛故名胡麻又以莖方者爲巨勝圓者爲胡麻

恭曰其角作八稜者爲巨勝四稜者爲胡麻都以烏者爲良白者爲劣說曰沃地種者八稜山田種

者四稜土地有異功力則同數日巨勝有七稜色

赤味酸澀者乃真其八稜者兩頭尖者色紫黑者及烏油麻並呼胡麻誤矣顏曰胡麻處處種之稀

復野生苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之本經謂胡麻一名巨勝圓弘景以莖之方圓分別蘇恭以角稜多少分別仙方有服胡麻

巨勝三法功用小別是皆以爲二物矣或云卽今酒麻本生胡中形似蕷麻故名胡麻入穀之中最

爲大勝故名巨勝乃一物二名如此則是一物而有二種如天雄附于之類故葛洪云胡麻中有

葉兩尖者爲巨勝別錄序例云細麻卽胡麻也形扁扁爾其莖方者名巨勝是也今人所用胡麻之葉如葢而狹尖莖高四五尺黃花生子成房如胡麻角而小嫩時可食甚甘滑利大腸皮亦可作布類大麻色黃而脆俗亦謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膳杵末畧無膏油其說各異此乃服食家要藥乃爾差誤豈復得效也宗奭曰胡麻諸說參差不一止是今人脂麻更無他義以琪種來自大宛故名湖麻今胡地所出者皆肥大其紋鵠其色紫黑取油亦多嘉祐本草白油麻與此乃一物但以色言之比胡地之麻差淡不全白爾今人通呼脂麻故立一條治療大同如用火黃上黨人參之類特以其地所宜立名豈可與他土者爲二物乎時珍曰胡麻卽脂麻也有遲早二種黑白赤三色其莖皆方狀開白花亦有帶紫艷者節節結角長者寸許有四稜六稜者房小而子少七稜八稜者房大而子多皆隨土地肥瘠而然蕪蕎以四稜爲胡麻八稜爲巨勝止謂其房勝巨大也

莖高者三四尺有一莖獨上者角纏而子少有間
枝四散者角繁而子多皆因莖之稀稠而然也其
葉有本圓而末鋒者有本圓而末分三丫如鳴掌
形者葛洪謂一葉兩尖爲巨勝者指此蓋不經烏
麻白麻惟有二種葉也按本經胡麻一名巨勝吳
普本草一名方莖抱朴子及五符經並云巨勝
名胡麻其說甚明至陶弘景始分莖之方圓雷聚
又以赤麻爲巨勝謂烏麻非胡麻嘉祐本草復出
白油麻以別胡麻並不知巨勝卽胡麻中葉巨
勝而子肥者故承誤啓疑如此惟孟詭謂四稜八
稜爲土地肥瘠寇宗奭沈存中之說晰然以脂
麻爲胡麻足以證諸家之誤矣又賈思勰齊民要
術種收胡麻法卽今種收脂麻之法則其爲一物
尤爲可據今市肆間因莖分方圓之說遂以茺蔚
子爲巨勝以黃麻子及大藜子爲胡麻誤而又誤矣茺蔚子長一分許有三稜黃麻子黑如細
韭菜子味苦大藜子狀如璧蟲及酸棗核仁味辛甘
並無脂油不可不辨梁簡文帝勸醫文有云世譏

以灰滌菜子爲胡麻則胡麻之訛其來久矣匱微
目俗傳胡麻須夫婦同種則茂盛故本事詩云胡
麻好種無人種是歸時又不歸

胡麻修治

弘景曰服食胡麻取烏色者當九蒸九

暴熬搗餌之斷穀長生竟飢雖易得而
學者未能常服况餘藥耶蒸不熟令人髮落其性
與茯苓相宜俗方用之甚少時以合湯丸爾穀曰
凡修事以水淘去浮者晒乾以酒拌蒸從巳至亥
出攤晒乾白中脊去粗皮留薄皮以小豆對拌同

炒豆熟去

豆用之

氣味甘平無毒

王良曰初金利大小腸久食卽否
去陳留新○鏡源曰巨勝可煮丹

主治傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦

久服輕身不老

本經

堅筋骨明耳目耐饑渴延年療

金瘡止痛及傷寒溫瘞大吐後虛熱羸困

別錄補中

益氣潤養五臟補肺氣止心驚利大小腸耐寒暑

逐風濕氣遊風頭風治勞氣產後羸困催生落胞

細研奎髮令長白蜜蒸餌治百病

日華

炒食不生風

病風人久食則步履端正語言不蹇

李廷飛

生嚼奎

小兒頭瘡煎湯浴惡瘡婦人陰瘡大效

恭

白油麻

嘉祐

氣味甘大寒無毒

宗奭

日白脂麻世用

至於大寒也原曰生者性寒而治疾炒者性熱而
發病蒸者性溫而補火○說旦久食抽人肌肉其

汗停丸者飲

主治治虛勞滑腸胃行風氣通血脉

之發霍亂

去頭上浮風潤肌肉食後生噉一合終身勿輟又

令乳母服之孩子永不生病容熟可作飲汁服之

生嚼傳小兒頭上諸瘡良孟詵

仙方蒸以辟穀

參蘿

發明

甄權曰巨勝乃仙經所重以白蜜等分合服

靜神丸治肺氣潤五臟其功甚多亦能休

糧塙人精髓有益於男子患人虛虛而吸收者加

而用之時珍曰胡麻取油以白者爲勝服食以黑

者爲良胡地者尤妙取其黑色入通于腎而能潤

燥也赤者狀如老茄子殼厚油少但可食爾不堪

服食唯錢乙治小兒痘瘡變黑歸腎百祥尤用赤

脂麻煎湯送下蓋亦取其解毒耳五符經有巨勝

丸云卽胡麻本生大宛五谷之長也服之不息可

以知萬物通神明與世常存參同契亦云巨勝可

延年還丹入口中若以胡麻爲仙藥而近世罕用

或者未必有此神驗但久服有益而已耶劉阮入

天台遇仙女食胡麻飯亦以胡麻同米作飯為仙
家食品焉爾又按蘇東坡與程正輔書云凡痔疾
宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯唯宜食淡
羹一味及以九蒸胡麻卽黑脂麻同去皮茯苓人
少白蜜爲羹食之日久氣力不衰而百病自去而
痔漸退此乃長生要訣但易知而難行爾據此說
則胡麻爲脂麻尤可憑矣其用茯苓本陶氏註胡
麻之說也近人以脂麻擂爛去滓入綠豆粉作腐
食其性平潤最益老人

附方

舊十五
新十六

服食胡麻

抱朴子云用上黨胡麻三斗淘淨醜蒸令氣逼日乾

以水淘去沫再蒸如此九度以湯脫去皮洗淨炒
香爲末白蜜或棗膏丸彈子大每酒酒化下一丸
日三服忌毒魚狗肉生菜服至百日能除一切痼
疾一年身面光澤不能害二年白髮返黑三年齒落
更生四年木火不能害五年疔及奔馬久服長生
若欲下之飲葵菜汁。孫真人云用胡麻三升去

黃褐色者蒸三十遍微炒香爲末入白蜜三升杵三百下丸梧桐子大每旦服五十丸人過四十以上久服明目洞視腸柔如筋也○仙方傳云魯女生

胡麻餌术絕穀八十餘年甚壯日行三百里

走及

服食巨勝

治五臟虛損益氣力堅筋骨用巨

虧虛

服食巨勝

治五臟虛損益氣力堅筋骨用巨

布裹

擗去皮再研水瀘汁煎飲和粳米煮粥食之

人故有二法

時珍曰古有服食胡麻巨勝二法

方不出於一

其實一物也

白髮返黑

烏麻九蒸九晒研末擦膏丸服之

千金方

腰

腳疼痛

新胡麻一升熬香杵末日服一小升服至

斗永瘥溫酒盞湯姜汁皆可下

千金

外臺

入水肢腫

手腳酸痛

微腫用脂麻熬研五升酒

升浸一宿隨意飲

千金

外臺

入水肢腫

作痛生胡麻搗傅之

于金

偶感風寒

脂麻炒焦乘熱搗酒飲之緩卧取微汗出良

中暑毒死

救生散用新胡麻一升微炒令黑攤冷

爲末新汲水調服三錢或丸彈子大水

驗後方

嘔吐不止

取油麻

大合清油

每斤煎

溫服

近效方

牙

齒痛腫

胡麻

五升水

一斗煮汁

五升含漱

吐之不過

二劑神良

丸后

熟淋莖痛

烏麻子

蔓青子

各五合炒

黃紺袋盛

以井

華水三升

浸之每食前

服一錢

聖惠方

小兒下

痢赤白

用油麻一合搗

蜜湯服之

外臺

解下胎毒

小兒初生

嚼生

脂麻綿包與兒

唾之其

小兒急瘡

油麻嚼傳

外臺

小兒軟癩

油麻炒焦

乘熱嚼爛

毒自下

傳之

小兒方

頭面諸瘡

脂麻生嚼傳

普濟

小兒癩癧

連翹

等分爲末

頻頻便方

疔腫惡瘡

胡麻燒灰

針砂等分

食之

分爲

未醋和傳之日

三

普

濟方

痔瘡風腫

作痛胡麻子

煎湯洗之卽消

坐板瘡疥

生脂麻膏

傳之

筆

峯雜典

陰痒生瘡

胡麻嚼爛

傳之良

肝后

乳瘡腫痛

用脂麻炒

焦研末以

燈窯油 蘭

調

金卽安

婦人乳少

許食之

唐氏

湯火傷灼

胡麻生研如泥

外臺

蠍咬瘡

油

麻研

爛傳之

入鹽少

湯

少

塗之

同上

外臺

蠍咬瘡

油

麻研

爛傳之

入鹽少

湯

少

傷

同上

外臺

蠍咬瘡

油

麻研

爛傳之

入鹽少

湯

少

蟬入耳

胡麻炒

研作末

梅師

穀賊戶咽

喉中

痛痒

止

後方

諸虫咬

此因誤吞穀芒檜刺疼痛也

谷賊屬咽戶

咽屬癰

喉不可不分用脂麻炒

研白湯調下

三因方

瘡不合法

烏麻炒黑搗

研白湯調下

三因方

瘡

瘡

瘡不合

烏麻炒黑搗

研白湯調下

三因方

瘡

小便尿血

胡麻三升杵未以

東流水二升浸一

宿平旦

生絞者

良

止可供

宿平旦

絞汗頓

于金方

胡麻油卽香油

弘景曰生絞者

良

若蒸炒者止可供

食及然燈耳

不入藥用宗襄曰炒熟乘熱壓出油

謂之生油

但可點照須再煎鍊乃爲熟油始可食

不中點照亦一異也

如鐵丹火中出而謂之生鐵

亦此義也時珍曰入藥以烏麻油爲

杜白麻油次

之須自斧乃良若市肆者不惟

巴經蒸炒而又雜之以僞也

之須自斧乃良若市肆者不惟

巴經蒸炒而又雜之以僞也

氣味甘微寒無毒

主治利大腸產婦胞衣不落生油摩腫生禿髮

別錄

去頭面遊風

孫思邈

主天行熱悶腸內結熱服一合

取利爲度

藏器

主瘡瘍殺五黃下三焦熱毒氣通大

小腸治蛇心痛傳一切惡瘡疥癬殺一切虫取一

合和雞子兩顆芒硝二兩攪服少時卽瀉下熱毒

芒良

孟詭

陳油煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

日 治癰疽熱病

蘓頌

解熱毒食毒虫毒殺諸虫蠅蠻蟻

珍