


陽寒集驗

寒集驗目錄

一卷



總論第一



太陽經第二

病之初起頭項痛腰脊強發熱惡寒惡心

傷寒見風傷風見寒第三

寒傷於榮又復傷風風傷於衛又復傷寒

太陽脉似少陰少陰證似太陽第四

少太陽證具而脉沉少陰證具而脉沉

陽明經第五

太陽經傳至此經目痛鼻乾不眠微惡寒

少陽經第六

陽明經傳至此經耳聾脇痛寒熱嘔口苦

太陰經第七

手足少陽經傳至此經腹滿咽乾手足少陽經傳至此經腹滿咽乾

少陰經第八

太陰經傳至此經舌乾口燥以後謔語大便實

厥陰經第九

自少陰經傳至此經煩滿囊拳消渴以後舌卷囊縮

兩感第十一太陰同病三日少陰同病二日陽明

合病第十一或二陽同病或

併病第十二始於二陽同病因一陽病

伏陰第十三外顯陽證指下

晚發第十四冬受寒邪至春

溫病第十五春分之前而發

熱病第十六夏至之後

三時感冒第十七春夏秋

四時疫癘第十八天行瘟

冬溫第十九十月以後

中暑第二十熱傷氣身熱自汗煩渴面

痰證第二十一

因痰而致憎寒壯熱胸滿頭疼但項

食積第二十二

宿食在胃蒸蒸發熱惡寒頭疼遍身不

即痛其氣息無力手心熱

虛煩第二十三

起自陰虛火動內熱煩躁但

脚氣第二十四

傳經合併其病俱類傷寒

勞傷第二十五

勞役傷脾而致頭疼發熱身微痛右手

房勞第二十六

色欲過度或入房後感寒或已感寒而

第二卷

直中陰經附陰毒第二十七

寒邪直中三陰經不發熱

傳經謂之直中時寒毒中之亦然治各有異

風溫第二十八

素傷於風又傷於熱風熱相搏乃成風

白汗頭疼喘急發渴
昏睡或體重不仁

中濕第二十九

居諸卑下或時方濕盛人有感之者其
熱汗出背強覆被時欲烘火小
便不利大便反快舌上白胎

風濕第三十

其先中於濕復中於風風濕相搏乃成此證
汗惡寒不欲去衣大便難
小便利熱至日晡而劇

濕溫第三十一

素傷於濕復中於暑濕熱相搏乃成此
證其脉寸濡而弱尺小而急其證胸腹
滿日痛壯熱妄言自汗
兩脛逆冷倦怠惡寒

陽盛拒陰陰盛格陽第三十二

外證身涼疼痛四肢厥
冷二便不通脉沉數有
力或滑數按之鼓指乃陽盛於內拒陰於外也病六
七日無大熱身冷煩躁不安不得眠欲風而不欲飲

水或喘促乾嘔其脉細乃陰盛於內
格陽於外也醫家誤認則殺人如劍

大頭瘟第三十三

天行時疫也其證先起於咽喉不
利次耳根腫次頭面腫次顙頂腫

太陽經雜治第三十四

陽明經雜治第三十五

少陽經雜治第三十六

太陰經雜治第三十七

少陰經雜治第三十八

厥陰經雜治第三十九

發熱第四十

有表熱裏熱之分

下後發熱第四十一

大下之後傷陰血所致

汗後發熱第四十二

大汗之後傷氣所致

頭痛第四十三

三陽頭痛中濕頭痛

項強第四十四

太陽證結胸寒濕痙有此

惡寒第四十五有陰陽之分

汗下後惡寒第四十六汗後表虛所致

惡風第四十七此雜證惡風之外

背惡寒第四十八背屬陽陰氣乘之故內無熱而背惡寒若陽氣陷入陰中則背微惡寒

寒熱往來第四十九則陰陽相爭陰勝則寒陽勝則熱

表裏寒熱分治第五十表熱裏寒裏熱表寒不能一致用藥各異

潮熱第五十一日晡而熱因其信而名曰潮

似瘧第五十二附溫瘧時其狀有似寒熱作止有

無汗第五十三陽氣虛弱津液不足雖服麻黃湯而不得汗

自汗第五十四不因發表而時時自出

手足汗第五十五蘊熱在胃挾寒在胃俱令手足汗出治有溫下之分

頭汗第五十六

自頸而透
遍體俱無

漏汗第五十七

用火劫汗以
致漏而不止

盜汗第五十八

方睡而汗
醒時則無

頭眩第五十九

眩則眼黑生花運若舟
車旋轉冒則昏冒不知

目盲第六十

甚發煩目盲
必發翳

拘急第六十一

手足屈
伸不便

身體痛第六十二

渾身俱痛乃中風中寒中濕
風濕陰毒之證多有之也

煩熱第六十三

心發熱
煩

煩燥第六十四

心神不安
○附戴陽

懊懷第六十五

鬱鬱不舒
心中煩亂

怫鬱第六十六

陽氣上蒸形於頭
面膚體而不散也

鬱冒第六十七

鬱結昏迷

動悸第六十八

心神驚悸怔忡不安因平素虛弱

胸脇滿第六十九

胸滿不同於腹須要認得明白

腹滿第七十

邪傳太陰腹為之滿陽熱為邪則利

小腹滿第七十一

臍下腹滿小便利為畜

脇痛第七十二

表裡有水或熱邪偏注

腰痛第七十三

或素日腎虛或氣逆腰間

腹痛第七十四

邪傳太陰經若陽邪其痛無休

結胸第七十五

太陽傷風當用桂枝湯而反下之乃成此證不按而痛為重按之方痛為輕

經下者非也

痞滿第七十六

太陽傷寒當用麻黃湯而反下之乃成此證按之不痛未經下者非也

水氣第七十七飲水過多停於心下

第三卷

臟結第七十八病人原有痞疾與邪氣相合痛引小腹入於陰筋

口燥咽乾第七十九畜病在陽明漱水不欲嚥是為

渴第八十熱結於內而津液消鑠汗利過多而氣血衰耗

咽痛第八十一有陰陽之分治宜辨別

附腎傷寒頭疼腰痛脈微利而咽痛次必下利

氣逆第八十二太陽陽誤下邪傳於裡裡不受邪氣逆上行又厥陰客熱逆而上衝

短氣第八十三呼吸不續似喘非喘

動氣第八十四在臍之左右上下肌肉之間築築然跳動似痛非痛按之則痛也

奔豚氣第八十五素腎積而熱邪併注乃致腎氣上衝勢如奔豚亦有因燒鍼所傷而得

咳嗽第八十六

扶水氣痰飲或熱邪遍腫而作

欬逆第八十七

仲景謂之餽世俗謂之呃因寒因熱共作不同或溫或開導其法難一

乾嘔第八十八

有聲無物微也其謂之乾嘔乃嘔之無物比嘔為甚其

噦第八十九

吐之無物而長不尿則危聲惡濁而嘔為甚其

嘔吐第九十

有聲無物名為嘔有嘔有聲則名嘔吐則為吐聲物俱有則名嘔吐

喘第九十一

內氣上逆出多入少

發黃第九十二

濕熱所發大便實而小便不利畜血所發大便黑而小便自利

吐血第九十三

誤服桂枝湯飲邪入臟與當汗不汗毒中三陽皆致吐血

畜血第九十四

血在下焦結聚不行

衄血第九十五

成流者不藥自止點滴者必待藥痊

下血第九十六

熱邪內侵血為熱迫男子大便室崩漏俱謂之下血○附熱入血室

下利膿血第九十七熱邪入裡所下膿血

自利第九十八已下而瀉謂之自利

小便難第九十九赤澀不多亦

小便不通第一百煩渴喜飲則熱在上焦

小便自利第一百一頻數而

不大便第一百二有陽結陰結之別

陽毒第一百三咽乾腫痛舌卷焦黑鼻中如烟煤身面

爛面若塗朱身如凝血兩眼如火十指皮脫甚則時狂時昏口禁咬牙

溫毒第一百四身面斑爛狀如

發狂第一百五火即劫陽毒之證但有因畜血

譫語第一百六喝所未見之事詞俱妄誕謂之譫語呼

重疊謂之鄭聲睡中語聲音不正忽改鄉音或語句

霍亂第一百七

下利

多眠第一百八之證屬太陽陽明少陰者相類多睡

不得眠第一百九或終日夜煩擾不寧

陰陽厥第一百十身不發熱頭不疼痛惡寒手足自溫

或作冷作溫或時逆便實諸語發渴怕熱此謂陽厥

舌胎第一百十一燥傳入裡熱始生胎色白而滑

發斑第一百十二為紅後赤為斑多於手足黑斑十無一紅後黃

五生有

不仁第一百十三又有一身全不知痛者鍼刺之尸厥

壞證第一百十四下傷寒重感寒與風濕痰及汗吐

癰瘕第一百十五手足動搖伸縮攣

瘕第一百十六惡寒發熱俱與傷寒同惟頸項強急頭

手足攣搖無汗曰剛瘕有汗曰柔瘕

筋惕肉瞤第一百十七汗吐下後津液枯少故其筋

戰慄振第一百十八謂之戰慄微動謂之戰領鼓動

循衣摸床第一百十九或病人兩手不停

擺頭直視第一百二十頭常搖動

遺尿第一百二十一

百合第一百二十二似寒非寒似熱非熱欲食不食欲

狐惑第一百二十三當汗不汗乃有此證或食上五臟

則咽乾舌食下部則下唇有瘡謂之狐

玆厥第一百二十四玆從口出

瘡後發熱第一百二十五

勞復食復第一百二十六病小愈因勞

瘡後昏沉第一百二十七病初愈餘邪尚

餘毒發願第一百二十八

陰陽易第一百二十九女病初愈而男為之交接則男

○接則女染其毒
附女勞復

婦人傷寒第一百三十

孕婦傷寒第一百三十一

產後傷寒第一百三十一

嬰兒傷寒第一百三十三

第四卷

桂枝湯

一 太陽傷風有汗實未散邪

桂枝二

一湯 二 脈微

桂枝麻黃各半湯

三 脈微惡寒

桂枝二麻黃一湯

四 如病瘥

桂枝加附子湯

五 漏汗 難

桂枝加芍藥湯

六 下後脈

桂枝加苓白朮湯

七 心滿 難

桂枝加厚朴杏仁湯

八 下後

桂枝新加湯

九 汗後身痛

桂枝白朮甘草湯

十 心下悸

桂枝

茯苓甘草湯 十一 汗後

桂枝救逆湯

十二 火迫

桂枝加桂湯

十三 燒鍼起

桂枝龍骨牡蠣湯

十四 煩躁

柴胡加桂湯

十五 支結 燒

柴胡枝乾姜湯

十六 汗下胸

桂枝人參湯

十七 下利 熱

桂枝附子湯

十八 風濕

桂枝加黃湯

十九 腹實而痛

桂枝大黃湯

二十 腹滿

桂枝葛根湯

二

柔一症

桂枝瓜蒌葛根湯

二

柔十二症

桂枝甘草湯

二

手三又心

桂枝石膏湯

二

病十四台

柴胡桂枝湯

二

熱十五寒

柴胡加桂湯

二

汗身六熱盜

半夏桂甘湯

二

傷七腎

七味桂附湯

二

陰八少

桂枝黃芩湯

二

合九三陽

茯苓桂甘湯

三

頭眩明

桂枝參苓湯

三

下胃一汗吐

桂枝附紅花湯

三

白汗身婦人

桂枝當歸湯

三

脈三孕婦

桂枝紅花湯

三

傷寒四婦人

麻黃湯

三

傷寒五太陽

麻黃附子細辛湯

三

陰六少

麻黃附子湯

三

表七少陰

麻杏薏甘湯

三

濕身八痛

麻杏甘石湯

三

喘九熱汗

麻黃升麻湯

四

脈利後

麻黃杏仁飲

四

陽熱太

麻黃連翹豆湯

四

中濕熱