

王氏医案

王氏醫案續編卷二 原名仁術志

古杭王士雄孟英醫案

秀水盛 鈞少雲 續輯
錢塘周 鏞光遠

此案步步合
法特一番蕩
滌之功故覺
少延時日耳
然涼劑已畏
其寒若加蕩
滌之品必不
敢服此治病
之所以難也
少延時日耳
然涼劑已畏
其寒若加蕩
滌之品必不
敢服此治病
之所以難也

莊芝階舍人之外孫汪震官春前陡患赤痢孟英診之脈滑數而沈面赤苔黃手足冷過肘膝當臍鞭痛小洩瀉少伏熱為病也與大劑苓連梔棟滑石丹皮砂仁延胡查麴銀花草決明等藥兩服手足漸溫而腳背紅腫起疱如蒲桃大二二十枚四服後腹痛減苔退而渴於原方去查麴砂仁加白頭翁赤芍海蛇旬日後痢色轉白而腿筋抽痛乃去丹皮滑石赤芍加雞金橘紅生苡石斛兩服痛止洩長糞色亦正腳瘡潰黃水而平穀食遂安改用養胃陰清餘熱之法而愈聞孟英治此證每劑銀花輒兩許尚須半月而瘳設病在他家焉能如此恪信苟過別手斷無如此重劑況在冬春之交誠古所未有之痢案後人恐難企及

吳馥齋室新產後嘔吐不止湯水不能下嘔頭痛痰多苔色白滑孟英用蘇梗橘半吳萸茯苓旋覆葶皮柿蒂紫石英竹茹一劑知二劑已

鄭嫗患咳嗽自覺痰從腰下而起吐甚冷醫作腎虛水泛治漸至咽喉阻塞飲食礙進即勉強嘔之而胸次梗不能下便溏洩頻無一人不從虛論孟英診曰脈雖不甚有力右部微有絃滑苔色黃膩豈屬虛

此證明明虛
寒何以作虛
寒治不效蓋

虛寒乃此人
咳乃新受之
外邪不治其
邪而事補其
虛則邪無出
生熱此舌胎
之所以黃膩
也孟英以清
熱化痰為治
尚是一半治
病一半治藥
誤也

木必為梅

毒腫連

唇鼻

山生一板馬

新羊竹黃

血案

皮掛不水以

藥中移

證以葦莖湯合雪羹加貝母知母花粉竹茹麥冬枇杷葉柿蒂等藥進十餘劑而痊

滿洲少婦懷妊漏血醫投補藥漏如故問或不漏則吐血延踰二載腹中漸動孕已無疑然血久溢於上
下甚至納食即吐多醫不能治孟英診之脈滑數有力是氣實而血熱也證不屬虛補藥反能助病愈補
愈漏胎無血蔭而不長其所以不墮者氣分堅實耳與大劑清營藥血溢遂止而稀沫頻吐得飲即嘔口
渴心忡氣短似促乃用西洋參麥冬知母石斛枇杷葉竹茹柿蒂生白芍木瓜重加烏梅投之覆杯即安
次日能吃飯矣

珠小輝太守令媛驟患頤腫連及唇鼻乃至口不能開舌不能出孟英視之曰溫毒也用射干山豆根馬
勃羚羊薄荷銀花貝母花粉杏仁竹黃為劑并以紫雪搽於唇內錫類散吹入咽喉外將橄欖核磨塗腫
處果吐靛涎而腫漸消諸朝即啜稀粥數日而愈

一男子患便血醫投溫補血雖止而反泄瀉浮腫延及半年孟英診之脈數舌絳曰此病原濕熱溫補翻
傷陰液與苓連梔芍桑葉丹皮銀花石斛棟實冬瓜皮鼈甲雞金等藥旬餘而愈
陸厚甫室陳芷澍主事之女也產後經旬偶發脘痛專與溫補藥因寒熱氣逆自汗不寐登覆不能解
而臥則稀水自流口渴善嘔查不納穀愈云不起矣乃父速孟英診之脈絃數而滑曰本屬陰虧肝陽侮

母

海蛇

孟英脈案
心改清加味

母地索海蛇

孟英溫案

孟英於溫熱
痰飲獨有
心得過此等
證如推枯拉
朽合觀諸案
可以得治溫
病之法

後出此案

下角 知母

胃誤投溫補滯之劑氣機全不下降以致諸證蠱起醫者見而却走是未明其故也與沙參竹茹棟實
延胡榧連橘貝杏斛枇杷葉為肅肺以和肝胃法覆杯即安但少腹隱隱作痛於前方去杏貝竹茹加知
母花粉菴蓉白芍橘核海蛇乃解宿垢而瘳
周子朝患惡寒頭痛發熱酷似傷寒而兼心下疼痛孟英脈之右部沉滑苔黃不渴澀如蘇木汁先以葱
豉湯加榧連杏貝萸橘為方服後微汗而不惡寒反惡熱雖湯飲略溫即氣逆欲死孟英曰客邪解矣清
其痰熱可也與知母花粉杏貝旋滑斛橘枇杷茅根蘆根地栗海蛇等藥果吐膠痰甚多而納食漸復惟
動則欲喘於肅上之中佐以滋下為善其後而瘳

濮樹堂室懷妊五月患春溫口渴善嘔壯熱無汗旬日後始挽孟英視之見其煩躁譫語苔黃不燥曰痰
熱阻氣也病不傳營血藥禁用試令按其胸次果然堅痛而大解仍行法當開上用小陷胸加石菖蒲枳
實杏貝茹鬱榧翹等藥蘆煎湯煎服服二劑神情即安四劑心下豁然惟心腹如烙嘔止不納改投大劑
甘寒加烏梅類啜漸康秋間得子亦無恙
胡振華以花甲之年患溺後出血水甚痛自云洩頗長激似非火證孟英察脈有滑數之象與元參生地
犀角樞棟槐蕊側柏知母花粉石斛銀花甘草梢菴豆等藥旬日而痊踰四載以他疾終

凡脈逆脈伏
之證其熱深
藏多不易解
非卓識定力
不惑於證亦
必搖於衆議

管氏婦自去秋患赤痢多醫罔效。延至暮春。孟英診脈。絃數苔黃。渴飲腹脹。而墜。日熱夜甚。用白頭翁湯。合金鈴子散。加芍藥。梔子。駐車丸。淡旬而愈。

濮樹堂室病。孟英甫爲參愈。而樹堂繼焉起。卽四肢厥逆。脈伏惡寒。發熱頭痛。左爲甚。惟口渴。因與葱豉二劑。熱雖退。脈仍伏。四肢冷過肘膝。大解頻行。人皆疑爲虛寒。孟英曰。此證儼似陰厥。然渴飲。溲赤。真情已露。豈可泥於一起卽厥。而必定其爲寒乎。徑投涼解。熱果復發。而肢冷脈伏如故。幸病者堅信。服藥不疑。至第七日。大便秘出紅水。溺則管痛。嘔惡煩躁。徹夜不眠。人更危之。孟英曰。熱邪既已下行。可望轉機。以白頭翁湯加銀花。通草。芍藥。知母。梔子。羚羊角之類。投三日。紅水始止。四肢漸和。頗有昏瞢。譫語。用王氏犀角地黃湯一劑。四肢熱而脈顯滑數。苔轉灰黃。大渴遺溺。病人自述如臥烘箱上。於昨方加入元參。銀花。竹葉。生石膏。知母。梔子。服一劑。夜間卽安寐。而苔轉黑燥。於昨方復加花粉。服一劑。熱退而頭面汗多。癰言倦寐。小溲欲解不通。諸戚友咸以爲危。各舉所知。而羣醫愈云。挽救不及。病家皇皇。孟英曰。此證幸初起。卽予診視。得盡力以爲死裏求生之舉。非比他人之病。皆因誤治致危。然不明言其險者。恐病家惶惑。而築室於道旁也。今生機已得。不過邪去真陰未復。但當恪守予法。自然水到渠成。切勿二三其德。以致爲山虧簣。賴有一二知音。竟從孟英議服西洋參。生地。從蓉。麥冬。棟子。知母。藥一劑。溺行索粥。再

服而黑苔退。三服而神清音朗。舌潤津回。唯有靛痰不能吐。左偏頭微痛。於原方加一至桑菊貝母牡蠣。又復五劑。得解。鞭矢一次。各患始安。眠食漸適而瘳。

陳足甫漫後見血。管痛異常。減餐氣短。孟英以元參生地知母棟實銀花側柏葉梔子桑葉丹皮菴豆爲方。藕湯煎服。二劑病大減。乃去丹皮柏葉。加西洋參熟地。服之而瘳。

王開榮偶患腹中絞痛。自服治痧諸藥而大便瀉血如注。孟英診之。左頗和。右關尺絃大而滑。面色油紅。喘逆不寐。與葦莖湯合金鈴子散。加銀花側柏葉梔子。連二劑後面紅退。血亦止。乃裁柏葉銀花加雪羹枯荷桿。又二劑始發熱。一夜得大汗。周時而腹之痛脹爽然若失。卽能安寐進粥。改投沙參知母花粉。桑葉枇杷葉石斛白芍橘絡杏仁冬瓜子茅根荷桿。三劑大解行而脈柔安穀。

陳叟久患痰嗽。氣逆夏初因惡寒自服理中湯。遂痰中帶血。氣喘而厥。二便不通。冷汗腹脹。孟英察脈洪大。按腹如烙。與葦莖湯加梔棟旋貝花粉海蛇。外以田螺大蒜車前草搗貼臍下。卽溺行而平。

高某患兩膝後筋絡痠疼。略不紅腫。臥則痛不可當。徹夜危坐。孟英切脈虛細。苔色黃膩。咽燥渴赤。與知斛梔棟牛膝豆卷桂枝竹瀝爲方。送虎潛丸。旬日而瘳。

楊某方作事不知背後有人潛立。回顧失驚。遂不言不食。不寐不便。別無他苦。孟英按脈沈絃。以石膏蒲

俱肝氣橫逆
之證發於汛
期者肝失所
養也孟英先
平肝驅痰而
後養血柔肝
亦先標後本
之法

瘡不甚重治
亦合法而難
收捷效者以
陰虛之體不
勝溫熱之氣
也此即四損
不可正治之
例設治不如
法則危矣

葉氏云溫邪
中人首先犯
肺其次則入
心正此病也

遠志琥珀膽星旋貝竹黃杏仁省頭草羚羊角爲劑化服蘇合香丸二劑大解行而啜粥夜得寐而能言
復與調氣甯神燭飲藥數日霍然

趙聽樵令妹每汛至則腹脹嘔吐腰脊痠疼兩腿腫痛筋掣腕疼甚至瘕厥多藥不效孟英以金鈴子散
合左金加二陳竹茹枳實桂苓數劑而愈續用菴蓉兔絲淫羊杜仲桑甚木瓜續斷香附歸芍茴棟調之
汛至如期略無痛苦初冬適楊子樸尋即受孕

濮東明令孫女素稟陰虛時發夜熱少餐不寐仲夏患感發疹決不當期而至孟英用犀羚知貝石膏生
地梔薤花粉甘草竹葉蘆根等藥疹透神清唯鼻燥異常吸氣入喉辣痛難忍甚至肢冷復於方中加元
參竹茹菊葉荷桿各患始減而心忡吐沫徹夜不眠渴汗便黑改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連真
珠百合貝母石斛牡蠣龜板蔗汁諸藥而愈季秋適姚益齋爲室

金亞伯廷尉適室產後惡露不行渴瀉痰多孟英以北沙參滑石生薏苡生扁豆蛤殼豆卷石斛竹茹枇
杷葉琥珀茯苓等藥數劑而愈

顧竹如孝廉令媛患感十餘日耳聾不語昏不識人而客未入室彼反先知醫以爲祟凡犀角地黃牛黃
清心復脈等湯徧服無效已擬擋後事矣所親濮根厓囑其延診於孟英脈至滑數舌不能伸苔色黃膩

雖不用下劑
而通經透絡
之品大劑用
之亦足以蕩
滌邪穢

遺溺便秘。目不交睫者。已四晝夜。胸腹按之不柔。與白虎湯去米。草加石膏。蒲元參。犀角。鼈甲。花粉。杏仁。葉。竹。黃。竹。瀝。投一劑。卽譫語滔滔。渠父母疑藥不對病。孟英曰。不語者欲其語。是轉機也。再投之大渴而喜。極熱之飲。又疑涼藥非宜。孟英姑應之曰。再服一劑。更方可也。三投之痰果漸吐。四劑後舌伸便下。神識漸清。乃去石膏。犀角。鼈甲。加生地。石斛。麥冬。貝母。數劑。熱盡退而痰味甚鹹。又去杏仁。竹黃。加西洋參。牡蠣。龜板。菴蓉。服之全愈。踰年失怙。繼遭祖融。鬱損情懷。誤投溫補。至戊申年殞。邵魚竹給諫。患感楊某。疔瘡治不應。始迓孟英診之。脈。更。汗。多。熱。不。甚。壯。苔。色。厚。膩。嘔。惡。煩。躁。痰。多。腿。痠。顯。是。濕。溫。因。謂。其。令。郎。子。旌。曰。濕。溫。者。濕。蘊。久。而。從。時。令。之。感。以。化。熱。也。不。可。從。表。治。更。勿。畏。虛。率。補。與。宣。解。一。劑。各。恙。頗。減。奈。衆。楚。交。咻。謂。病。由。心。力。勞。瘁。而。來。況。汗。多。防。脫。豈。可。不。顧。本。原。羣。醫。附。和。遂。服。參。歸。熟。地。之。藥。病。日。以。劇。最。後。吳。古。年。診。之。云。此。濕。溫。也。何。妄。投。補。劑。然。已。未。從。挽。救。交。十。四。日。而。殞。始。悔。不。從。王。議。

康伯侯司馬之夫人。久傷謀慮。心火外浮。面赤齒疼。因食西瓜。遂脫悶不舒。喜得熱按。泄瀉不食。自覺舌厚數寸。苔色灰膩。孟英與厚朴。滑石。葱白。薤白。枇杷葉。橘皮。薄荷。旋覆。省頭草。一劑霍然。葉杏江仲郎。患發熱泄瀉。醫治十七日不效。骨瘦如柴。音嘶氣逆。所親許芷卿薦孟英診之。脈數大渴汗。

此亦肝經
熱之證孟
善於調肝
應手輒效

多苔黃。以竹葉石膏湯加減。十餘劑漸以向愈。大解反極堅燥。繼與滋養而康。

張某患發熱。醫知其非寒邪也。用清解藥數劑。腿痛異常。身面漸黃。孟英診之。脈滑實。腹脹口乾。與茵陳大黃湯兩劑便行。而各恙霍然。

魏女患腳腫嘔吐。寒熱便秘。孟英與龍膽瀉肝湯而立效。繼有孫氏婦患此。亦以是藥獲痊。

馮媼患左目胞起瘰。繼而痛及眉稜。額角顛頂。腦後筋掣。難忍。醫投風劑。其勢孔亟。孟英診脈絃勁舌絳。不饑與固本合二至桑菊犀羚元參牡蠣龜甲白芍知母石斛丹皮細茶等出入互用。匝月始愈。

濮嫗於酷熱之秋。渾身生痛如疥。痛楚難堪。小溲或秘或頻。大便登圉。非努掙不下。臥則不能收攝。人皆謂其虛也。孟英診脈滑數。舌紫苔黃而渴。與白虎加花粉竹葉梔子白薇紫苑石斛黃柏十餘劑而痊。

姚小蘅太史令姪女。初秋患寒熱而汛適至。醫用正氣散兩劑。遂壯熱狂煩。目赤譫語。甚至欲刎欲縊。勢不可制。孟英按脈洪滑且數。苔色乾黃尖絳。腕悶腹脹拒按。畏明口渴。氣逆痰多。與桃仁承氣湯加犀角石膏知母花粉竹瀝甘菊。人謂熱雖熾而汛尚行。何必大破其血。而又加以極寒之藥哉。孟英曰。豈勿過慮。恐一二劑尚不足以濟事。果服兩大劑始得大便。而神清苔化。目赤亦退。改用甘寒以清之。繼而因為更衣。卽脈滑苔黃而腹脹。更與小承氣湯二劑便行。而各恙盡已。數日後又如故。仍投小承氣湯二劑。凡

前後六搜下劑。纔得波浪不興。漸以清養而瘳。季秋適江右之高令孫明府之子浦堂爲主。董曉書令正。素患脫痛。甚至暈厥。今秋病腰疼腿木胸悶氣逆不能臥。胡某進溫補藥而喘汗欲脫。查不思穀。孟英切脈虛細中兼有絃滑舌絳而渴。乃陰虛挾痰耳。與沙參菴蓉木瓜石斛蛤蜊痰蘖石英茯苓紫苑杏仁棟實首烏牛膝諸藥旬日而安。繼加熟地黃服之全愈。

王葦塘患滯下。醫投枳朴檳查之藥。數服後肢冷自汗。查不進穀。腕悶腹脹。小溲牽疼。舉家皇皇。孟英視脈細澀舌絳無津。是高年陰虧伏暑傷液。況平昔茹素胃汁不充。加以燥烈之藥。津何以堪。因與沙參銀花菴蓉白芍石斛木瓜甘草棟實扁豆花鮮稻頭數劑。痛悶漸去。汗止肢溫。乃加生地阿膠麥冬柿餅蒲桃乾等。以滋之。居然而痢止餐加。惟舌色至匝月始津潤復常。陰液之難充也如此。

沈綬齋令堂患滯下色白。醫與溫運。病勢日劇。腹脹昏瞶。湯飲不下。孟英診爲伏暑用苓連滑朴等藥。沈疑高年且素患脫痛。豈可輒用苦寒。孟英再四剖陳。始服半劑。病果大減。不數劑卽愈。按此等證甚多。奈執迷不悟者。雖剴切言之。不能解其惑。亦可哀也已。

一叟患滯下色白不剝不饑不渴。腹微痛而不脹。孟英切脈遲微進大劑眞武湯加參而愈。程秋霞子患腦漏。醫與辛夷蒼耳之藥。漸有寒熱。改用柴葛羌防數劑。遂致寒熱日發數次。神昏自汗熱

甚可危。孟英用竹葉石膏湯一劑。寒熱退而神清進粥。繼以甘涼清肅。復投滋潤填陰。旬日而健。朱浚宣令堂患滯下。醫聞色白。而與升提溫補。旬日後肢冷自汗。液脫肛墜。羣醫束手。慮其虛脫。因挽濮樹堂乞診於孟英。曰藥誤耳。與大劑行氣蠲痰清熱之藥。果漸吐痰而痢愈。又其令弟同時患此。五色並見。神昏肢搐。大渴莖腫。腹痛後熱。危險異常。孟英察脈細數。與白頭翁湯加犀角。生地銀花石斛棟實延胡荽連滑石丹皮木通甘草梢等藥。三劑後熱退神清。溺行搐止。乃去犀角草梢丹皮滑石木通加砂仁拌炒熟地山查炭服之。漸安半月而愈。

姚小蘅大令患瘧。寒微熱甚。日作二次。汪某與柴胡藥二劑。勢遂劇。舌絳大渴。小溲全無。孟英曰。津欲涸矣。與西洋參生地知母花粉石斛麥冬梔子百合竹葉投之。五劑而瘧止。越三載以他疾終。其道室同時患此。嘔吐脇痛畏寒不渴。苔色微白。孟英與小柴胡湯三飲而瘳。

孫渭川年踰七旬。脈象六陰。按之如無。偶患音嘶痰嗽。舌絳無津。孟英用甘涼清潤法。音開而嗽不已。仍與前藥。轉爲滯下。色醬溺赤。臍旁堅。輒按之。趨趨舌猶枯絳。湯飲不饑。人皆危之。孟英曰。藏熱由府而出。痢不足慮。第高年陰液難充。不能含涼潤爲方。苟犯溫燥。其敗可必。幸渠家平素恪信。竟服犀角地黃知母銀花菴蓉花粉麥冬白芍石斛棟實等藥十餘劑。痢止而臍旁柔輒。因去犀角加西洋參。又服兩旬始

解燥矢而洩。澈胃。變又服半月。復得暢解。舌亦潤澤而愈。

王耕藍室素患脫痛。近發寒熱。醫與溫補。漸至胸痛嘔呃。譫語神昏。舌絳面赤。足冷自汗。瘧仍不休。孟英用元參犀角石膏。葛蒲連翹杏仁貝母。旋覆竹茹枇杷葉竹黃柿蒂竹瀝鬱金。諸藥化服。萬氏牛黃清心丸數服而愈。

潘祥行在外患瘧。買舟歸。就孟英視曰。苔膩脈爽。伏邪所化。不與正瘧同科。風寒藥一味不可犯。薑棗湯一滴不可啜。與知母橘半滑朴杏斛花粉省頭草一劑而病若失。此等案極多。姑載一二。

張與之令堂久患痰嗽。礙臥。素不投補藥。孟英偶持其脈曰。非補不可。與大劑熟地藥一飲而睡。與之曰。吾母有十七載不能服熟地矣。君何所見而重用。頗投。孟英曰。脈細痰鹹。陰虛水泛。非此不為功。從前服之增病者。想必雜以參朮之助氣。昔人云。勿執一藥以論方。故處方者貴於用藥之恰當。病情而取舍得宜也。

陳足甫室懷妊九月而患瘧。目不能瞑。口渴自汗。便溏氣短。醫進育陰清解法。數劑不應。改用小柴胡一劑而咽疼舌黑。心頭絞痛。乃翁仰山聞之。疑其胎壞。延孟英過診曰。右脈洪滑。雖舌黑而胎固無恙也。病由伏暑育陰嫌其滋膩。小柴胡乃正瘧之主方。古人謂為和劑。須知是傷寒之和劑。在溫暑等證。不特手

瘧亦分經而
治若陽明瘧
正以白虎湯
為主。小柴
胡而愈。病

足異經而人參半夏薤白皆不可輕用之藥雖有黃芩之苦寒而仲聖於傷寒之治猶有渴者去半夏加括裏根之文。古人立方之嚴密何後人不加體察耶。投以竹葉石膏湯四劑瘧止便秘口渴不休與甘涼濡潤法數劑忽腹鳴泄瀉或疑寒涼所致。孟英曰吾當以涼藥解之人莫識其意問難終朝語多不備錄果以白頭翁湯兩啜而愈。迨季婉秋後發熱不蒸乳惡露淡且少家人欲用生化湯孟英急止之曰血去陰更傷豈可妄疑瘀停而攻之與西洋參生地茯苓石斛女貞旱蓮甘草爲大劑數日而安繼因觸怒少腹聚氣如癥痠痛夜甚人又疑爲涼藥凝滯所致孟英力爲辨折與橘核橘葉橘絡棟實從蓉木香梔炭烏藥絲瓜絡海蛇蘘石斛兩頭尖等藥外以蔥頭搗爛貼之兩劑後腹中雷鳴周身汗出而痛止人見其汗慮爲虛脫急追孟英視之曰此氣行而病解矣但脈形細數陰津大傷苔黃苦渴亟宜潤補奈樞機窒滯滋膩難投且以濡養八脈爲法服之各恙皆蠲眠食漸適緣平素多鬱易犯痧氣頻發脘痛屢次反復孟英竭力圖維幸得轉危爲安漸投滋補而愈。

胡季權子珍官甫六歲目患內障繼則夜熱痰嗽小洩過多醫作童損治服滋補數月病日以甚孟英持脈右大口渴苔黃曰伏熱在肺法當清解及詳詰其因始言病起瘡後蓋餘熱未淨而投補太早與滑石知母花粉桑葉茅根枇杷葉蘆根冬瓜子杏仁服二劑偏身發出斑塊又二劑斑退苔化乃去滑石加沙

參餌之。其熱頭面先退。次退四肢。以及胸背。又數日甫退於腹。人皆詫其熱退之異。孟英謂熱伏既久。復爲半年之補藥。膩滯於其間。焉能一旦盡滌。其勢必漸清而漸去也。熱退既淨。溺亦有節。痰嗽遞蠲。餐加肌潤。而內障亦漸除矣。

顧奏雲季秋患感。醫作虛治。補及旬日。舌卷。瘰。厥。腰以下不能略動。危在須臾。所親石誦義延孟英。設死裏求生之策。察脈虛促欲絕。先灌紫雪一錢。隨灌犀角地黃湯二大劑服下。厥雖止。而舌腭滿黑。目赤如鳩。仍用前湯。三日間計服犀角兩許。黑苔漸退。神識乃清。而呃忒頻作。人猶疑其虛也。孟英曰。營熱雖解。氣道未肅耳。以犀角元參石花連翹銀花竹茹知母花粉貝母竹葉爲方服之。次日卽下黑靛矢甚多。而呃忒止。又三劑連解膠黑矢四次。舌色始潤。略進米飲。腿能稍動。然臀已磨穿矣。與甘潤育陰藥。續解黑矢又五次。便溺之色始正。投以滋養。日漸向安。己酉舉於鄉。其弟翰雲患左膀間腫。鞭而疼。暮熱溺赤。舌絳而渴。孟英接脈。細數。徑用西洋參生地麥冬棟實知母花粉銀花連翹甘草黃柏等藥。服旬餘而愈。康康侯司馬令郎爾九。在玉環署中。患心忡。自汗。氣短。面赤。霎時溲溺數十次。澄澈如水。醫僉謂虛補之日劇。乃來省就孟英診焉。左寸關數。右絃滑。心下似阻。因作痰火阻氣心熱移肺治。用蛤殼黃連枳實棟實旋覆花粉橘紅杏仁百合絲瓜絡冬瓜子海蛭葶竹茹竹瀝梨汁等。出入爲方。服之良愈。而司馬爲

職守所羈。嘗患恙。函請孟英診視者再四。竟不克往。繼聞司馬於冬仲竟卒於甌。乃知病而得遇良手。原非偶然。前歲遇而今歲不能致。豈非命也耶。

許自堂令孫子社患感。延至秋杪。證交二十八日。諸醫束手。渠伯母鮑王士夫人薦孟英診之。左部數右手儼若魚翔。痰嗽氣促。自汗癰癰。苔色灰厚。渴無一息。一停垂危若是。而皓首之祖孀母少妻相依爲命。環乞拯救。甚可憫也。孟英曰。據脈莫能下手。吾且竭力勉圖。第恐一齊衆楚。信任不堅。則絕無可望之機矣。其母長跪而言曰。唯君所命。雖砒鴆勿疑也。於是先以竹葉石膏湯加減至五劑。氣平嗽減。汗亦漸收。苔色轉黑。舌尖露絳。改投元參生地犀角石膏知母花粉竹葉銀花等藥。又五劑。癰癰漸減。舌絳漸退。彼婦翁召羽士爲其拜斗。飛符喂水。鼓樂喧闐。病者卽譖妄不安。神昏如醉。羽士反爲嚇退。黃夜速孟英視之。與紫雪錢餘。神卽清爽。仍用前方。重加竹瀝。服八劑。始解黑如膠漆之大便。而黑苔漸退。右脈之至數始清。惟煩渴不減。令其恣啖北梨。舌纔不燥。痰出亦多。又六劑。舌色乃淡。洩出管痛。熱邪得從下行矣。凡十二日之間。共服大劑寒涼已二十四劑。計用犀角三兩有奇。而險浪始平。續以前法緩制。服六劑。又解黑矢五次。手足始知爲己有。又五劑。筋絡之振惕始定。略能側臥。嚙語乃息。漸進稀糜。繼灌甘潤。充其胃汁。七八劑後。渴止知饑。脈皆和緩。又淡旬。穀食乃復。又旬餘。便溺之色始正。前後共下黑矢四十餘次。苔

色亦淨授滋填善後而康是役也。凡同道暨許之族人戚友莫不以爲秋冬之交用藥偏寒況病延已久敗象畢呈苟不卽投峻補必致失手。旣聞鮑夫人云歸許氏二十餘年目擊多人無不死於溫補此等病曾見之此等藥蓋未嘗聞也孰知如此之證有如此之治求之古案亦未前聞傳諸後賢亦難追步蓋學識可造而腸熱膽堅非人力所能及此孟英所以爲不世出之良醫也。

段春木秋杪患發熱而腰腿痛如刀割孟英視之略不紅腫脈至細數苔色黑燥溺赤便黑與西洋參麥冬生地犀角銀花棟實石斛知母甘草竹瀝蔗汁爲大劑投之熱漸退痛漸已惟舌絳無津仍與甘涼濡潤爲方數日後忽舌絳倍加燥及咽膈水飲不能下嚥孟英曰眞陰涸竭藥難奏績矣然竊疑其何以少愈之後驟爾陰枯或者背予而服別藥乎繼其契友來詢云段死於舌出此曷故歟孟英聞之爽然大悟因擯傷寒女勞復之文示之其人頓足云良然彼於少愈後曾宿於外次日歸卽轉劇苟直陳不諱或尙可治孟英曰未必然也燒褪散鼠矢湯皆從足少陰以逐邪不過熱邪襲入此經所謂陰陽易是也今少腹無絞痛之苦原非他人之病易於我眞是女勞之復以致眞陰枯涸更將何藥以驟復其眞陰哉然從此而女勞復與陰陽易一虛一實有定論不致混同而談治矣。

顧昇庵參軍之仲郎久患多疑善恐不出房者數年矣食則不肯與人共案臥則須人防護寡言善笑時

此肝氣挾
飲上逆也
緣胃
藥久傷故
陽久傷故
中加參以扶
胃氣

或遺精。多醫廣藥。略無寸效。孟英切脈。甚滑。數與元參丹。參竹黃。竹茹。丹皮。黃連。花粉。梔子。海蛇。薺。薺。爲劑。送服。當歸。龍薺丸。四劑。卽能出署。觀劇。遊淨慈。而登吳山。參軍大喜。歎爲神治。次年爲之配室。而陳某偶患溇泄。所親鮑繼仲云。余往歲患瀉。治不中肯。延逾年載。幾爲所困。今秋患此。服孟英方。數劑。霍然。故服藥不可不慎也。孟延孟英治之。陳因中表二人皆知醫。招而視之。以爲省便。輒投以溫補健脾之藥。數日後。瀉果減。而發熱昏瘧。咽喉黑腐。其居停瞿穎山。疑病變太速。囑其請援於孟英。孟英診曰。遲矣。病起泄瀉。何必爲寒。正是伏邪。自尋出路。而溫補以固留之。自然內陷厥陰。不可救藥。果卽殞焉。繼有高小垞孝廉令弟雨生。因食蟹患瀉。黃某用大劑溫補藥。瀉果止。而頸筋痠痛。舌絳。嘔渴。口氣甚臭。孟英持脈沈數。曰。食蟹而後瀉。會逢其適耳。脈證如斯。理應清潤。奈病人自畏涼藥。復質於吳某。亦主溫補。服及旬日。昏瘧舌黑而斃。

金某久患脘痛。按之漉漉有聲。便秘。溲赤。口渴苔黃。查不知饑。絕粒五日。諸藥下噦。傾吐無餘。孟英察脈沈弱而絃。用海蛇。薺。薺。各四兩煎湯飲之。徑不吐。痛亦大減。繼以此湯煎高麗參。黃連。棟實。延胡。梔子。枳椇。石斛。竹茹。柿蒂等藥。送服當歸龍薺丸。旬日而安。續與春澤湯調補收績。蓋其人善飲而嗜瓜果。以成疾也。