

溫
柔
精
一
五

九
陽
真
經

靈鶴山房
吳氏藏板

溫熱贅言

江左審顯子建

天倪室道人校

溫熱病大意

蓋聞外感不外六淫而民病當分四氣治傷寒家徒守
發表攻裏之成方不計辛熱苦寒之貽害遂使溫熱之
旨蒙昧不明醫門缺典莫此甚焉余不敏博覽羣書廣
搜載籍而恍然於溫熱之不可不急講也內經云冬

不藏精春必病溫蓋言春時嚴寒陽氣內斂人能順天
時而固密則腎氣內充命門爲三焦之別使亦得固腠
理而護皮毛雖當春令升泄之時而我身之真氣則內
外瀰淪不隨升令之泄而告匱縱有客邪安能內侵是
內經所以明致病之原也然但云冬不藏精而不及他
時者以冬爲水旺之時屬北方寒水之化於時爲冬於
人爲腎井水溫而堅冰至陰外陽內有習坎之象故立
言歸重於冬非謂冬宜藏而他時可不藏精也卽春必

病溫之語亦是就近指點總見裏虛者表不固一切時邪皆易感受學者可因此而悟及四時六氣之爲病矣昔王叔和云寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑熱致來後人翻駁何不云腎精不藏之人至春易病溫至夏易病暑熱便能深入理潭矣內經又云冬傷於寒春必病溫註家咸謂冬令閉藏寒邪伏於腎中病不即發至春陽氣大泄內伏之寒邪隨升令而外達天來錢氏已大非其說踈謂傷於寒者乃冬傷寒水之藏

卽冬不藏精之五言何得以寒邪悞解夫寒邪凜烈中
人卽病非比暑濕之邪能伏處身中故內經曰風寒之
中人也使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱况腎爲生命之
根所關至大安有寒邪內入相安無事直待春時始發
之理錢氏此說獨開生面先得我心蓋曉然於溫邪之
爲病由於腎精之不藏矣非特此也難經云傷寒有五
有傷寒有傷風有風溫有熱病有濕溫夫統此風寒濕
熱之邪而皆名之曰傷寒者亦早鑑於寒藏受傷外邪

得入故探其本而皆謂之傷寒也獨是西北風高土燥
風寒之爲病居多東南地卑水濕濕熱之傷人獨甚從
來風寒傷形傷形者定從表入濕熱傷氣傷氣者不盡
從表入故治傷寒之法不可用以治溫熱也夫溫者暖
也熱也非寒邪之可比也風邪外束則曰風溫濕邪內
侵則曰濕溫縱有微寒之兼襲不同栗烈之嚴威是以
發表宜辛涼不宜辛熱清裏宜泄熱不當逐熱蓋風不
兼寒卽爲風火濕雖化熱終屬陰邪自昔仲景著書不

詳溫熱遂使後人各呈家伎漫無成章而凡大江以南
病溫多而病寒少投以發表不遠熱攻裏不遠寒諸法
以致死亡接踵也悲夫

風溫症條例

風溫爲病春月與冬季居多或惡風或不惡風必身熱
欬嗽煩渴此風溫症之提綱也周禹載曰溫邪伏於
少陰而達於少陽此雖宗內經冬傷於寒春必病溫
之旨其實誤解內經也無論春溫冬溫總屬暴感時

氣豈是少陰伏邪。不過因少陰真氣先虧。溫邪易於
湊襲耳。其病多在春冬。而不在夏秋者。以夏秋爲暑
濕熱三氣蒸動之時。多病濕溫。濕令蒸淫。風氣不勝
濕氣也。惟春月風邪用事。冬初氣暖多風。故風溫之
病多見於此。但風邪屬陽。陽邪從陽。必傷衛氣。人身
之中。肺主衛。又腎爲衛氣之本。是以風溫外薄肺胃
內應風溫。內襲肺胃。受病其溫邪之內外有異形。而
肺胃之專司無二致。故惡風爲或有之症。而熱渴欬

嗽爲必有之症也。三復仲景書言溫病者再一則曰
太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。此不過以不惡
寒而渴之症辨傷寒與溫病之異而非專爲溫病敘
症也。再則曰發汗已身灼熱者名曰風溫。夫灼熱因
於發汗其誤用辛熱發汗可知。仲景復申之曰風溫
爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語
言難出。凡此皆誤汗劫液後變現之症。非溫病固有
之症也。續云若被下者直視失溲若被火者發黃色。

劇則如驚癇狀時瘳瘳若火薰之一逆尙引日再逆
促命則亦止詳用下用火之變症而未言風溫本來
之現症也然從此細參則知風溫爲燥熱之邪燥令
從金化燥熱歸陽明故肺胃爲溫邪必犯之地且可
悟風溫爲燥熱之病燥則傷陰熱則傷津泄熱和陰
又爲風溫病一定之治法也反此卽爲逆矣用是不
辭僭越而於仲景之無文處求文無治處索治敘症
施治列爲條例知我罪我其在斯乎

風溫症身熱畏風頭痛欬嗽口渴脈浮數舌苔白者
邪在表也當用薄荷前胡杏仁桔梗桑葉川貝之屬
涼解表邪

風屬陽邪不挾寒者爲之風溫陽邪必傷陽絡是
以頭痛畏風邪鬱肌表肺胃內應故欬嗽口渴苔
白邪留於表故脈浮數表未解者當先解表但不
同於傷寒之用麻桂耳

風溫症身熱欬嗽自汗口渴煩悶脈數舌苔微黃者

熱在肺胃也常用川貝大力桑皮連翹廣皮竹葉之屬涼泄裏熱

此溫邪之內襲者肺熱則欬嗽汗泄胃熱則口渴煩悶苔白轉黃風從火化故以清泄肺胃爲主治風溫症身灼熱口大渴欬嗽煩悶譫語如夢語脈弦數乾嘔者此熱灼肺胃風火內旋常用羚羊川貝連翹麥冬川斛青蒿知母花粉之屬以泄熱和陰

此溫邪襲入肺胃之絡灼燥陰津引動木火故有

煩渴嘔逆等症急宜泄去絡中之熱庶無風火相煽走竄胞絡之虞

風溫症身熱欬嗽口渴下痢苔黃譫語胸痞脈數此溫邪由肺胃下注大腸當用黃芩桔梗煨葛豆卷甘草廣皮之屬以升泄溫邪

大腸與胃相連屬與肺相表裏溫邪內逼下注大腸則下痢治之者宜清泄溫邪不必端於治痢按仲景傷寒論中有下痢譫語者有燥屎也宜大承

氣湯一症。此實熱內結。逼液下趨。必有舌燥苔黃。
刺及腹滿痛症兼見。故可下以逐熱。若溫邪下痢。
是風熱內迫。雖有讖語一症。仍是無形之熱蘊蓄
於中。而非實滿之邪。盤結於內。故用葛根之升提。
不任硝黃之下逐也。

風溫症。熱久不愈。欬嗽脣腫。口渴胸悶。不知飢身發
白疹如寒粟狀。自汗脈數者。此風邪挾太陰脾濕發
爲風疹。用大力荊芥防風連翹。廣皮甘草之屬涼解。

之

風溫本留肺胃若太陰舊有伏濕者風熱之邪與濕熱相合流連不解日數雖多仍留氣分由肌肉而外達皮毛發爲白疹蓋風邪與陽明營熱相併則發癍與太陰濕熱相合則發疹也又有病久中虛氣分大虧而發白疹者必脈微弱而氣倦怯多成死候不可不知

風溫症身熱欬嗽口渴胸痞頭目脹大面發泡瘡者