

寒溫條辯卷五

吳茱萸湯 厥陰頭痛而嘔吐沫。少陰犯真寒。吐利手足厥。煩燥欲死。及寒邪入陽明。食穀欲嘔者。並此

方主之。

吳茱萸三錢 生薑三錢 大棗三錢 人參一錢 水煎溫服。

厥陰肝也。寒邪內格。故嘔而吐沫。厥陰與督脉會於巔。故頭痛。少陰腎也。腎藏中寒。則上格乎陽。而為嘔吐。經云。腎主二便。腎寒則大便不禁。而為利下。手足得陽氣而溫。內有真寒。故令手足厥冷。煩燥者。陰盛格陽。故令陽煩陰燥。其證多危。故曰欲死。吳茱萸辛熱而氣厚。專司開豁胸中逆氣。經曰。氣為陽。氣厚為陽中之陽。故能走下焦而溫厥陰。少陰也。臣以生薑散其寒也。佐以參棗補中虛也。

小建中湯 傷寒三四日。心悸而煩。及少陰惡寒。腹中急痛。此方主之。加黃耆三錢 名黃耆建中湯。

白芍四錢 桂枝二錢 甘草二錢 生薑二錢 大棗二錢 饴糖三錢 水煎去渣。入饴糖烱化服。

醫方考曰。小建中湯宜用肉桂。枝則味薄。故用之以解肌。桂則味厚。故用之以建中也。愚按。開後人補中。益氣無窮之法。門中。

此方是也。

續論曰。桂枝湯中白芍桂枝等分。用白芍佐桂枝以治衛氣。小建中湯中白芍四錢。桂枝二錢。用桂枝佐白芍以治榮氣。更加飴糖以緩其脾。故名之曰建中。則其功用大有不同耳。

當歸四逆湯 手足厥寒。陽邪內陷。脉細欲絕。陰盛此方主之。

當歸 白芍 桂枝各二錢 細辛一錢 通草一錢 甘草四分 大棗二錢 水煎溫服。加吳茱萸二錢 生薑二錢 酒

煎名當歸四逆。加吳茱萸生薑湯。治前證內有久寒者。

手足厥寒。脉細欲絕。似乎陰證之極。蓋緣陽邪傳入厥陰。榮分以本虛不能作熱。故厥而脉細欲絕也。此為陰陰經也。陰經是指厥。 鬱陽邪。故用桂枝細辛以解表。白芍甘草以瀉熱。當歸以和厥陰之榮血。通草以通太陽

之本府使陽邪得從外解。原非治陰寒四逆之藥也。故藥宜歸心以濟陰。不宜姜附以劫其陰也。是證也。自表入裏。雖曰傳至厥陰。始終只是陽證與陰寒直中三陰不同。故不用四逆湯而用桂枝湯。加當歸細辛通草耳。明者自知之。

按昔人云。人有陰血虧於陽分。不能勝辛熱者。更以此湯主之。殊不知此唯有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證。則是陰血大虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛為少陰中表藥。隨桂枝湯以解肌。加當歸以和榮血。至於通草者。淡微寒。能瀉丙丁。能通水道。為虛寒者禁用。此湯治法。本是和榮血以緩脉。使陽邪得從肌表而散。或從膀胱而泄也。若循其名以治陰虧寒中之四逆。則謬甚矣。觀於傷寒論曰。若其人素有久寒者。宜當歸四逆湯加茱萸生薑主之。正如四逆散本以散傳經之熱邪。腹中痛者。方加附子。則當歸四逆湯非治陰寒四逆之藥也。明矣。更有一等固守王道之醫。辨證不明。遇有厥逆脉細之證。不敢用四逆湯。但曰用當歸四逆湯。極為穩當。不知此湯乃桂枝湯加當歸細辛通草耳。細辛隨桂枝湯止能解表。通草又為疏通最有方之藥。當歸一味。果足以治陰寒血逆耶。藥不對證。果可謂之穩當耶。甚矣其不明於製方之理。而以舛錯誤病也。予前所云用方貴明其所以然者。正謂此也。

乾姜附子湯 少陰誤下復發汗。晝日煩燥。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉微身無大熱者。此方主之。又陰盛格陽。目赤面赤。煩渴引飲。脉來七八至。按之則散。為無根之脉。以此方加人參主之。

乾姜錢附子錢 水煎溫服。或云冷服。

此即四逆減去甘緩之甘草。為回陽重劑。若加增藥味。反牽制其雄悍之力。必致迂緩無功矣。乾姜辛以潤燥散煩。和表裡之誤傷。附子熱以溫中固表。調陰陽於既濟。陽回即可用平補之藥。蓋陽既安堵。即宜休養其陰。切勿過用辛熱。轉生他患也。審之慎之。

桂枝新加湯 汗後身痛。脉沉遲者。此方主之。以桂枝湯解汗後之風邪。加參芍益不足之血脉。亦兩解。

表裡安內攘外之一法曰新加者因發汗新虛明非桂枝湯中之舊法也

桂枝錢三白芍錢四甘草錢二人參錢一生薑錢三大棗錢二水煎溫服

黃連阿膠湯 少陰病二三日以上心中煩不得卧此方主之少陰本欲寐今反煩不得寐者以風邪客於裏裏熱甚而不和也此其陰散熱之良方

也並治邪火內攻迫血下行者用治痢亦取扶陰散熱之義

黃連清瀉阿膠祛風養腎黃芩泄熱白芍利脾制水生雞子黃逐風鎮

少冷入雞子黃攪勻服

桂枝回陽去白芍恐其加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯太陽傷寒脈浮此風寒兩傷也醫以火迫劫之亡陽此大汗不止也

驚狂神乃陽之靈起卧不安者煩燥不寧此皆停飲上逆此方主之

桂枝錢三蜀漆錢三龍骨錢四牡蠣粉錢五甘草錢二生薑錢三大棗錢二水煎蜀漆三沸取其次入羣藥煎服

去蜀漆名桂枝甘草龍骨牡蠣湯治火逆下之復煩燥者

按桂枝解風邪以固表養心甘草和中氣以益陽瀉火牡蠣鹹走腎而益心龍骨潛收神而宅心生薑利

氣和胃大棗通經健脾蜀漆辛以逐停飲飲去則心安故驚狂不安者乃水凌心火也此仲景不傳之秘也

竹葉石膏湯陽明汗多而渴衄血渴欲飲水水入即吐及傷寒瘥後虛羸少氣氣逆欲吐並此方主之

竹葉錢二石膏錢四麥冬錢二半夏錢二人參錢一甘草錢一生薑錢二粳米錢二水煎溫服 本方去石膏半夏

姜米加柴胡黃芩名人參竹葉湯治汗下後煩熱口渴虛羸少氣之證

竹葉石膏之辛寒以止喘促散餘熱參草粳麥之甘平以益肺胃生津液生薑半夏之辛溫以豁痰飲去

嘔逆此虛羸熱逆之良方也

加味溫胆湯治汗下後不解嘔而痞悶或虛煩不眠肉瞤筋惕者

人參錢一甘草錢一茯苓錢一遠志錢一酸棗仁錢一炒熟地錢一枳實錢一陳皮錢一半夏錢一五味子錢一生薑錢一水

煎溫服

疎表湯 治四時感冒風寒。鼻塞聲重。或流涕不已。發熱惡寒。頭痛身痛者。

淡豆豉錢三羌活錢二防風錢二桔梗錢各一前胡錢各一黃芩錢各一蘇葉錢各一川芎錢各八細辛錢各五甘草錢二蔥

白芷錢二水煎溫服。微汗口渴。加花粉。麥冬錢各一。滿悶。加枳殼錢半。熱甚。加知母錢一。

桂枝附子湯 傷寒七八日。即傳裡之時也風濕相搏。搏聚而身體煩痛。風勝則痛。不能自轉側。濕主重。不嘔。邪在表也

不渴。裡無熱也。脈浮虛而澹。浮虛為風也。此方主之。浮虛而澹。如風濕。但在經也。與桂枝以解表。風加附子以散寒。濕若其人大便難。小便自

利者。去桂枝。加白朮湯。主之。去桂。惡其走表。而不和裡。加朮。喜其益土而燥濕也。

桂枝錢三附子錢二甘草錢半生姜錢三大棗錢二水煎溫服。去桂枝。加白朮錢三。名去桂加朮湯。

人參固本湯 治溫病虛極。熱極。循衣撮空。不下。必死者。下後神思稍甦。續得肢體振寒。怔忡惊悸。如人

將捕之狀。四肢厥逆。眩運鬱冒。項背強直。此大虛之兆。將危之候也。此方救之。

人參錢二熟地錢三生地錢二當歸錢二杭菊錢五分天冬錢二麥冬錢二五味錢二陳皮錢二知母錢二甘草錢一水煎溫

冷服之。服後虛回。止後服。蓋溫病乃火邪燥證。人參固本為補元氣之神丹。但恐偏於益陽。恣意投之。

有助火固邪之弊。不可不知也。

按溫病乃天地雜氣之一也。有邪不除。淹纏日久。必至虛羸。庸工望之。不問虛實。久暫可否。輒用人參。殊

不知無邪不病。邪去而正氣自通。何慮虛之不復也。今妄投補劑。邪氣益固。正氣益鬱。轉鬱轉熱。轉熱轉

瘦。轉瘦轉補。轉補轉鬱。循環不已。乃至骨立而斃。猶言服參凡許。補之不及。奈何。余於乾隆甲戌乙亥丙

子三年中。眼見親友患溫病。服參受害者。不可枚舉。病家止誤一失。醫家終身不悟。不知殺人無算。特書

之以為監。用人參之戒。非禁之使不用也。果如前證。虛危之極。非人參烏能回元氣於無何有之鄉哉。

當歸六黃湯 治陰虛盜汗。又方。用蓮子錢二。黑棗錢二。浮麥錢二。馬料豆錢二。水煎治同。

當歸錢二熟地錢二生地 黃連 黃芩 黃柏各一錢 防風錢 麻黃根錢 浮麥一錢 水煎溫服。

黃耆錢 五味子各三錢 白朮土炒 甘草各一錢 水煎溫服。汗多不止。加麻黃根一錢 牡蠣粉一錢 浮麥一錢。

經疏曰。凡服固表藥而汗不止者。當用酸棗仁炒黑 白芍生 地麥冬各二錢 五味子各二錢 元肉各二錢 竹葉二十片 煎服多。效。以汗為心液故也。

柴胡桂枝乾姜湯 傷寒五六日。已發汗而復下之。胸膈滿微結。小便利。渴而不嘔。但頭汗出。三陽脈起於頭

柴胡陽邪甚于上陰精衰于下故汗出也 桂枝錢二 牡蠣粉錢半 乾姜錢 甘草錢 水煎。初服微煩。後服汗出愈。
按柴胡除少陽之寒熱。桂枝解太陽之餘邪。花粉徹陽明之渴熱。乾姜去胸脇之煩滿。甘草調汗下之誤傷。此少陽陽明兩解之治法也。

厚朴生 姜半 夏半 甘草人參湯 陽明病。中寒不能食。小便不利。手足濇然汗出者。此欲作痼瘕。大便必初硬後溏。此胃中虛冷。水穀不別故也。痼瘕者。寒氣結而為積也。此方主之。並治汗解後腹脹滿。此非裡實。蓋脾胃為津液之主。汗多則津液不足。氣虛不能敷布。諸氣壅滯。停飲而為脹滿。與此湯以和脾胃而降氣也。一云痼泄也。蓋大便秘後溏因成痼泄。痼泄即溏泄久而不止則曰痼瘕亦通。

厚朴炒 姜半 夏半 甘草錢二 人參錢一 水煎溫服。

脹非苦不泄。氣非溫不行。飲非辛不散。胃非甘不和。虛非補不復。五味之功用大矣。大陷胸湯。

大黃錢三 芒硝錢三 甘遂末五 水煎大黃。五六沸去渣。再入芒硝。煎一二沸。調甘遂末服。加葶藶子杏。

仁去皮炒黑與大黃芒硝四味等分為末。煉蜜丸如彈子大。取一九入甘遂末三五分蜜三匙。水煎並渣服之。此名

大陷胸丸。結胸者項亦強。如柔瘕狀。下之則和矣。此方主之。

小半夏加茯苓湯。心下滿。頭汗出。水結胸。或心悸目眩。此方主之。去茯苓。即小半夏生薑湯。

半夏姜炒茯苓錢五生薑錢五水煎溫服。健脾滲濕。火因水下。則痞渴消。而悸眩止。

小陷胸湯。小結胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。此方主之。邪氣深入。尚在表。半裡為熱。為痰。為飲。病有淺深。方有大小。除熱下痰。

黃連姜汁微炒半夏錢三枳實一個水煎溫服。

黃連苦以瀉熱。用代大黃。半夏辛以逐痰。用代甘遂。枳實潤以行滯。用代芒硝。不比大陷胸湯之峻厲也。

枳實理中丸

枳實炒枳實炒牡蠣粉白末甘草土炒各一錢。乾姜炒八人參錢黃連錢黃芩錢各三錢。為末。煉蜜丸如雞

子黃大以熱湯化服一丸。覺腹中熱。則胸中豁然矣。未熟加丸再服。

海蛤散。治血結胸。揉而痛不可撫近者。

海蛤粉滑石甘草各等分芒硝減半元明粉更妙為末。用蜜水入雞子清調服二錢。

桔梗枳殼湯。治痞氣胸膈不痛。噎氣吐酸或欬者。

桔梗枳殼各二錢。水煎溫服。此二味苦下氣而散痞滿。寒消熱而除咳飲也。

大黃黃連瀉心湯。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。關候心下。浮主虛熱。此方主之。

大黃錢二黃連錢一黃芩錢一搗碎。麻沸湯漬之。去渣服。

活人書曰。湯液論有黃芩。今無者。恐傳寫之訛也。李時珍曰。仲景治心下痞。按之濡者。用大黃黃連瀉

心湯。此亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。病發於陰。而下之太早。則作痞滿。乃寒傷榮血。邪氣乘虛結於上焦。

胃之上腕在心下故曰瀉心

附子瀉心湯 心下痞而復惡寒汗出者此方主之

附子炮 大黃各二錢 黃連 黃芩各 附子一味另煎取汁大黃芩連三味以麻沸湯漬之去渣入附子

汁溫服

心下痞故用三黃以瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽無三黃則不能瀉痞熱無附子恐三黃益損其陽氣熱有三黃寒有附子寒熱互用斯為有制之兵矣仲景誠醫家之善將將者也俗醫用寒則不敢用熱用熱則不敢用寒何異於膠柱鼓瑟乎

續論曰瀉心湯諸方皆治汗下後表解裡未和之證其半夏生姜甘草三瀉心湯是治疾飲濕熱結聚之痞方中用半夏生姜以滌痰飲黃連黃芩以除濕熱人參甘草以助胃氣乾姜炮黑以滲水濕若但用苦寒治熱則格格不入必得辛熱為之嚮導是以半夏乾姜在所必需如痞極硬滿暫去人參氣壅上升勿用生姜此一方出入而有三用也其大黃黃連與附子三瀉心湯乃治陰陽偏勝之痞一以大黃芩連滌胸中素有之濕熱一加附子兼溫經中驟脫之虛寒也三黃用沸湯清服者取寒藥之性不經火而力峻也附子煮汁者取性熱行經以復其陽耳仲景寒熱並用補瀉兼施立方之妙無出乎此以三黃滌胸中之邪熱以附子散凝結之陰寒一舉而寒熱交聚之邪盡解詎知後人目覩其方而心眩也

按半夏生姜甘草三瀉心湯人尤易曉其大黃黃連與附子三瀉心湯具有妙用不可不透悟也夫大黃黃連瀉心湯孰不以為治心下之痞熱也竊詳傷寒論曰心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之成氏註曰心下痞按之痛關脈沉者是熱也按之濡關脈浮者虛熱也故大黃芩連不用煎煮而但以麻沸湯清服者取其味薄而瀉心下之虛熱不欲其味厚而傷中氣也附子瀉心湯人亦知為寒熱之互用也竊詳傷寒論曰心下痞復惡寒汗出者附子瀉心湯主之成氏註曰心下痞者虛熱內伏也惡

寒汗出者。陽氣外虛也。與大黃黃連瀉心湯。以導痞熱。加附子以回陽氣。夫痞熱固須導除。而陽虛更為可慮。附子煮汁者。回陽之重劑也。三黃沸清者。導熱之輕劑也。續論謂取寒藥之性不經火而力峻。豈其然乎。今人以大黃熟煎。則無力。寔續論之說誤之也。內經曰。味屬陰。味厚屬陰中之陰。熟煎味厚。安得無力。須辯之。

半夏瀉心湯。柴胡證具而誤下之。但心下滿而不痛。此為痞。此方主之。

半夏姜製人參錢一乾姜炮甘草炙黃芩錢各二黃連錢一大棗枚二水煎溫服。少陽誤下變證。有三等治

法。嘔而發熱。柴胡證猶在者。復與小柴胡湯。必蒸蒸振汗而解。若心下滿而硬痛。此為結胸。柴胡陷胸湯。大陷胸湯。量輕重用之。但滿而不痛。此為痞。宜此湯。

否而不泰為痞。瀉心者。必以苦。故用黃連黃芩。散痞者。必以辛。故用半夏乾姜。交陰陽通上下者。必和其

中。故用人參甘草大棗也。諸瀉心湯寒熱並用。妙不可傳。

生薑瀉心湯。傷寒汗解之後。火邪胃中不和。正氣心下痞硬。胃虛不運。乾嘔。為水所食。臭。運則臭。脇下

有水氣。土弱不能制水。腹內雷鳴。水氣下利者。濡瀉。此方主之。

生薑半夏三錢姜製各黃芩甘草二錢炙各乾姜炮人參黃連各一大棗二枚水煎溫服。

甘草瀉心湯。傷寒中風。反誤下之。下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞硬而滿。嘔煩不安。醫見心

下痞硬。復誤下之。其證益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使滿硬。此方主之。

甘草炙半夏三錢姜製各乾姜炮黃芩錢各二黃連錢一大棗二枚水煎溫服。

桂枝人參湯。即理中湯加桂枝也。太陽病。表未除而下之。早熱邪乘虛入裡。挾熱下利不止。心下痞硬。表裡不解者。此方主之。

桂枝甘草三錢乾姜二錢白朮土炒人參一錢水煎溫服。

此湯以表未除。故用桂枝以解之。以裡證虛。故以理中。以和之。蓋取兩解表裡之義也。
旋覆花代赭石湯 傷寒汗吐下解後。胃氣弱也。心下痞硬。停膈。噎氣未除者。此方主之。
用治噎膈反胃。氣逆不降者。累效。

旋覆花錢三 代赭石錢二 半夏錢六 人參錢一 甘草錢二 生薑錢五 棗錢三 水五盅。煎取二盅。去渣再煎取一盅。

溫服。濃煎則不助飲。

旋覆之鹹以軟堅。赭石之重以振逆。姜夏之辛以散痞。參草大棗之甘以補脾。此輔正驅邪。蠲飲下氣之良方也。

桂枝加芍藥湯 本太陽病。反下之。因腹滿時痛者。此方主之。

桂枝錢三 白芍錢六 甘草錢二 生薑錢三 大棗錢二 水煎溫服。加大黃酒浸三錢 名桂枝加大黃湯。治前證大是補。

黃連湯 胸中有熱。欲嘔吐。胃中有寒。腹疼痛。此方主之。

黃連錢三 半夏錢四 桂枝錢二 乾姜炒二錢 甘草錢二 人參錢一 大棗錢一 水煎溫服。或給服。夜三治。闕格氣不能上。

下者與桂附八味丸相間服之。即腎氣丸。

此傷寒邪氣傳裡。而為下寒上熱也。胃中有邪熱。使陰陽不交。陰不得升而獨滯於下。為下寒。腹脹痛。陽不得降而獨鬱於上。為上熱。欲嘔吐。故用黃連之苦以瀉上熱。而降陽。姜桂半夏之辛以散中寒。而升陰。參草大棗之甘以緩中急。而益胃。寒熱並用。猶奇正之相倚耳。此分理陰陽。和解上下之正治也。或丹田有熱。胸中有寒者。仲景亦用此湯治之。藏結之證。更宜以此湯調其陰陽。

柴胡桂枝湯 傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩痛。微嘔。心下支結。此外證未除。不可攻裡。以此方和解之。並治發汗後亡陽譫語。以此方和其榮衛。以通津液。後自愈。

柴胡錢四 桂枝錢二 黃芩錢一 白芍錢二 半夏錢二 甘草錢二 人參錢一 生薑錢二 大棗錢二 水煎溫服。此太陽少陰令病治方也。

柴胡養榮湯 治溫病陰枯血燥邪熱不退

柴胡三錢 黃芩二錢 陳皮一錢 甘草一錢 當歸二錢 白芍一錢五分 生地三錢 知母一錢 花粉二錢 蟬蛻全十個 白僵蚕酒炒三錢 大棗三錢

水煎溫服 去當歸白芍生地名柴胡清燥湯 數下後餘熱未盡邪與衛搏故熱不能頓除宜此

湯和解之

五福飲 凡五藏氣血虧損者此方能兼治之足稱上道之最

人參補心隨熟地至一兩 當歸補肝二錢 白朮補肺滋浸 甘草補脾蜜炙一錢 水煎溫服或加生薑

凡治氣血兩虛等證以此為主或宜散者加升柴荆防宜溫者加姜桂附子宜清者加梔子青蒿地

骨皮之類左右逢原無不可也

七福飲 即五福飲加酸棗仁炒研遠志心微炒一錢 治氣血兩虛而心脾為甚者

四君子湯 一方去人參加蜜炙黃耆亦名四君子湯

白朮土炒二錢 白茯苓錢二 人參錢一 甘草炙各一錢 水煎溫服 加半夏姜炒一錢 陳皮一錢 木香磨汁砂仁一錢 名香砂

六君子湯 補脾養胃之要藥也

四物湯

當歸酒洗三錢 熟地三錢 白芍酒炒五分 川芎一錢 水煎溫服 合四君子湯名八珍湯 再加黃耆肉桂名十全大

補湯 補氣養血之要藥也

二陳湯

半夏姜汁製二錢 陳皮一錢 白茯苓一錢 甘草一錢 生薑一錢 水煎溫服 順氣化痰之總方也

犀角大青湯 治斑出心煩大熱錯語呻吟不眠或咽喉不利者

犀角錢二 為末或大青或以青黛代之 元參各三升 麻黃連 黃芩 黃柏 梔子各一錢 甘草五分 水煎

去渣入犀角汁童便冷服

一方加白僵蚕酒炒三錢錢蟬蛻全十個更妙

大便秘加大黃

大建中湯 中氣不足手足厥冷小腹脹滿或腹滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤四肢痠痛嘔吐下利及無根失守之火出於肌表而為斑點並此方治之

人參

甘草

炙各五分黃耆蜜當歸

白芍

酒炒桂心

附子

半夏

錢二分薑汁製各一

水煎溫服

按此乃汗吐下後中氣虛乏則餘邪無所歸附隱隱見於肌表其色淡紅而不甚顯為辯也參耆所以補中夏草所以調中此皆脾胃藥也復有歸芍之和血則外溢之斑流而不滯又有桂附之溫中則失守之火引而歸原此中營之憾一端而失位之師各就其列也是方也以參耆桂附而治斑猶兵法之變者也語云治病如殺賊孫臏滅竈滅龐涓虞翻增龜平朝歌臨機應敵豈有一定之法哉

麻黃芍藥人參湯

李東垣曰

予治一寒士病脾胃弱與補劑愈繼而居曠室卧熱炕咳而吐血予謂此

久虛弱外有寒形內有火熱上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裡之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄

是重虛其陽表有大寒壅遏裡熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脉浮緊當以麻黃湯

發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因處此方本方去麻黃桂枝名麥冬飲子

麻黃去外白芍陰甘草炙黃耆生桂枝補當歸酒麥冬炙

各三分五味子十五粒蜜蒸棗碎核

水二盅半

先煎麻黃去沫

入犀角同煎

一盅去渣乘熱臨卧

服

保肺清心

安五臟

一服愈

觀此方定為萬世模範也

蓋取仲景麻黃湯與補劑麥冬飲子各半服之

但凡虛人今用仲

景方者皆當以此為則也

四逆散

少陰病四逆

陽邪傳入少陰

或咳

少陰脉

或悸

少陰脉

或小便不利

少陰脉

或腹中痛

少陰脉

或

瀉利下重者此方加減主之

柴胡

白芍

枳實

甘草

為末

白飲調下三錢

日三

咳者

加五味子乾姜

並主下利

肺與大

腸相表

裏

裏

裡上咳下利。悸者。加桂枝。小便不利者。加白茯苓。腹中痛者。加熟附子。泄利下重者。先以水煎薤白取

汁二鍾入此散一兩煎服。

此陽邪傳至少陰。裡有結熱。則陽氣不能交接於四肢。故逆而不溫。柴胡所以升內陷之陽邪。枳實所以破內滯之結熱。白芍收失位之陰。甘草和不調之氣。是證也。雖曰陽邪在裡。慎不可下。蓋傷寒以陽為主。四逆有陰進之象。若復用苦寒之藥下之。則陽亦虧矣。是在所忌。傷寒論曰。諸四逆不可下。此之謂也。然此原為冬月正傷寒言之。若溫病四逆。不在此例。

按此散本為邪熱自陽經傳入陰經。而發厥傷寒論曰。腹中痛者。加附子。清滌中。又加溫補。人未有不致疑者。竊詳四逆散腹痛。加附子。未與附子。瀉心湯義同。蓋傷寒以陽為主。熱證固當用瀉滌之法。而熱證但兼虛寒。又不可不急作救療。如附子瀉心湯。心下痞滿。自宜大黃黃連瀉心湯。以導除其熱。若惡寒汗出。則加附子以回陽。又何可緩也。故四逆散邪熱傳至陰經。而四逆自宜柴胡枳實。以清解其熱。若兼虛寒。遇邪而腹痛。則加附子之溫經益陽。又何可緩也。寒熱各行其性。此仲景製方之妙。況傷寒始病。熱中未傳寒中者。極多。四逆雖屬陽證。已有陰進之象。兼以腹痛。則其加附子也。不亦宜乎。若溫病陽邪亢閉。隔陰於外。以致四逆。非急下之不為功。若執治傷寒之法。則誤人矣。

桂苓甘朮湯。傷寒若吐若下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動。經身為振振搖者。此

飲中留結外邪之證也。此方主之。

白茯苓錢四桂枝錢三白朮錢二甘草錢二水煎溫服。

按人身經脈賴津液以滋養。吐下津液一傷。更汗津液再傷。坐令經脈失養。身為振振。此湯滌飲散邪。補中益氣。則津液四布。而經脈得以滋榮矣。至久而成痿。較此更甚。仲景於此湯。豈非早已用力乎。甘草桔梗湯。主治少陰經病。二三日咽痛。此陰陽通用藥也。若風痰挾邪上壅咽痛。半夏散及湯。若咽

中傷生瘡不能言聲不出者苦酒湯若下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯三湯補後

甘草三錢桔梗三錢水煎溫服此二味一借土氣以逐水一借金母以瀉水而少陰之邪自散矣

黃芩加半夏生薑湯太陽少陰合病下利而嘔及胆府發咳嘔苦水如胆汁胃氣逆則嘔苦此方主之

黃芩三錢白芍半夏甘草二錢生薑二錢大棗二錢水煎溫服

乾姜黃連黃芩人參湯傷寒論曰傷寒本自寒下格醫復吐下之寒格更逆吐下若食入即吐此方主之

乾姜人參黃連黃芩原文各三兩水六升去渣分溫連服

按傷寒論並無寒下之病亦並無寒下之文玩下文寒格更逆吐下句可知上文本自寒下句之下字當

是格字文義始屬註家皆釋胃寒下利不但文義不屬亦與芩連之藥不合當改之成氏曰仲景之意以

本自寒下醫復吐下之治之為逆故用乾姜以溫裡人參以補正氣芩連反佐以通寒格與四逆湯白通

湯加人尿猪胆汁義同原文四味各三兩恐傳寫之訛也此成氏之遵經註解也姑存以俟高明

麻黃杏仁甘草石膏湯太陽病汗後喘表邪未解也此方主之

麻黃四錢杏仁去皮甘草二錢石膏八錢水煎麻黃去沫次入羣藥煎服

按太陽寒邪雖從汗解然肺邪未盡所以喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘草緩肺急石膏清

肺熱即以治足太陽之藥通治於太陰也倘誤行桂枝湯以致壅塞肺氣而吐癰膿則桔梗杏仁煎可用

也太陽傷寒誤下作喘亦用此方葛根黃連黃芩湯太陽病誤下利遂不止脈促者表未解也脈數而止曰促用葛根者專主陽明之表喘而汗出者此方主之

葛根四錢黃連三錢黃芩二錢甘草二錢水煎溫服喘而汗出者因喘而汗出也即裡熱氣逆所致與此

湯以葛根散表邪以芩連清裡熱則喘息汗停而利亦止矣

五味子湯治喘而脈伏及寒熱而厥昏憤無脈者

五味子十五粒 麥冬去心 陳皮各二錢 人參 杏仁各一錢 生薑三錢 大棗二枚 水煎溫服。

蘇陳九寶湯 治暴感風寒脉浮無汗而喘並老幼素有喘急遇寒喘不節發則連綿不已咳嗽哮喘夜

不能卧者

桑白皮蜜炙 大腹皮製淨 陳皮 蘇葉 薄荷 麻黃 杏仁泡去皮 桂枝去粗皮 甘草生各二錢 烏梅一枚 生薑二錢

水煎溫服

十棗湯 太陽中風有頭痛發下利大便小便俱逆水飲停蓄於內 表解者乃可攻之先用桂枝解其表而後攻裏 其人熱熱汁

出邪從汗出發作有時此邪熱 頭痛胃氣上逆此心下痞硬滿引脇小痛 留飲在膈滿於兩乾嘔短氣

伏飲上逆射於肺汗出不惡寒者二表解此表解裡未和也此方主之 明較著如此然後用此湯以逐飲

中此裡未和者三

按雖有發熱頭痛心下痞硬滿引脇痛乾嘔短氣諸證乃內邪所結之本證裡未和也不得以表證名之

傷寒中亦有有表證無表邪者何況溫病

甘遂麝包煨 紫大戟出洪山者 芫花醋炒 三味等分為末聽用 大棗十枚 水二盅煎取湯一盅調上三

味藥末強人一錢弱人五分溫服如未下明日加五分再調服利受糜粥自養

按下利嘔逆句之下字當是不字若是下字豈有上嘔下利而用十棗湯峻劑攻之之理乎惟大便秘不利

痞硬滿痛始屬裡病小便不利嘔逆短氣始屬飲病乃可峻攻發作有時句之作字當是熱字始與太陽

陽邪熱飲相合若無熱汗出乃少陰陰邪寒飲真武湯證也皆當改之此湯與大陷胸湯相仿傷寒種種

下法咸為胃寔而設今證在厥脇而不在胃則蕩滌腸胃之藥無所取矣故用芫花之辛以逐飲甘遂大

戰之苦以泄水並賴大棗之甘以運脾而助諸藥祛水飲於膈脇之間乃下劑中之變法也愚按開後人

窮之法門此方是也

濕熱生痰無

去芫花加白芥子等分為末。姜汁煮棗肉為丸。名控涎丹。

李時珍曰。痰涎為物。隨氣升降。無處不到。入心則迷成癲癇。入肺則塞竅為咳嗽背冷。入肝則脇痛乾嘔寒熱往來。入經絡則麻痺疼痛。入筋骨則牽引隱痛。入皮肉則癰癰癰腫。陳無擇並以控涎丹左之。殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本水也。濕也得火與氣則結為痰。甘遂能泄經絡水濕。大戟能泄藏府水濕。白芥子能散皮裡膜外痰飲。生薑大棗利氣通經健運脾土以固本。惟善用者乃能收奇功也。茯苓甘草湯。水氣乘心。振寒厥而心下悸者。大畏水故心下動也先治其水。却治其厥。及太陽傷寒表虛汗出而不渴者。並此方主之。此乃利水解表而兼和中之藥也。如太陽傷寒汗出而渴者。又宜五苓散。

白茯苓錢三桂枝錢三甘草錢半生薑錢三水煎溫服。

橘皮竹茹湯。治傷寒胃虛有熱呃逆。或因土利之故並治久病虛熱。或吐利後胃虛呃逆不止。

橘皮錢二竹茹錢二人參錢一甘草錢一生薑錢二大棗枚二水煎溫服。一方有半夏赤茯苓麥冬枇杷葉。

胃火上衝。肝胆之火助之。肺金之氣不得下降。故呃逆嘔噦。竹茹麥冬枇杷葉皆能清金和胃。肺金清則肝木亦平矣。二陳降痰逆。赤苓降心火。生薑嘔家聖藥。久病虛羸。故以參草大棗扶其胃氣。而諸證自退也。一方用硫黃乳香等分酒煎嗅之。不論虛實寒熱皆效。

汪詒菴曰。此證有因胃熱失下者。有因火鬱者。有因血瘀者。有因氣滯者。有因痰阻者。皆屬寔。有因下後胃虛者。有因中氣不足者。有因下元虛損。陰火上衝者。皆屬虛。寒熱虛寔。要在臨證活法耳。不可造次。呃在中焦。穀氣不通。其聲短小。得食則發呃。在下焦真氣不足。其聲長大。不食亦然。此為辨也。

橘皮乾姜湯。治胃寒呃逆脉微細者。

橘皮錢二乾姜錢二肉桂錢一通草錢一甘草錢一人參錢一水煎溫服。

丁香柿蒂散。治久病呃逆因下寒者。古方以此湯治呃逆。雖病本於寒。厥亦有火也。

丁香 柿蒂各二錢 人參一錢 生薑三錢 水煎溫服 一方去人參加竹茹橘紅 一方去人參合二陳湯
加良姜俱治同

此足陽明少陰藥也。丁香泄肺溫胃而暖腎。生薑去痰開鬱而散寒。柿蒂苦瀉降氣。人參補助真元。使得展布也。

滌痰湯 治膈間痰閉呃逆者

桔槩五錢 胆星二錢 半夏各二錢 橘紅一錢 茯苓五錢 枳實二錢 黃芩二錢 黃連二錢 石菖蒲二錢 竹茹各一錢 甘草五分

生薑三錢 水煎溫服。如痰閉呃甚者。用白礬二錢 水二盞煎一盞入蜜三匙。少煎溫服即吐。如不吐飲

熱水一小盞。未有不吐者。吐後呃即止。

理中安蛇散 治胃寒蛇厥

人參一錢 白朮五錢 茯苓五錢 乾姜五錢 川椒十四粒 烏梅三枚 水煎溫服

烏梅丸 蛇厥者當吐。蛇今病者靜而復時煩。此為藏寒。時靜時煩。非此。蛇上入膈故煩。須臾即止。得食

而嘔又煩者。蛇聞食當自吐。蛇此方主之。按此為藏寒。藏寒無暫時安。蛇字應是非字。若是此字便是藏厥。與辨蛇厥之義。不屬當攻之。

烏梅三十枚 黃連一兩 乾姜二兩 附子炮 桂枝細辛 黃柏鹽水 人參各六錢 當歸川椒 炒去汗各四錢 為末

醋浸烏梅去核飯上蒸熟。合藥末加煉蜜杵丸。每服二錢。白飲送下。

程郊倩曰。名曰安蛇。是安胃。故仲景云。主久痢。痢本濕熱。得苦得堅。得酸則斂。故亦通治。若陽厥吐

蛇入口即斃。又何論溫病乎。

麻黃升黃湯 傷寒六七日。大下後。邪傳厥。手足厥逆。陽氣寸脈沉遲。遲為尺脈不至。尺脈不至。尺伏誤咽。喉不利。

吐膿血。肝脈循喉。除邪上壅。○又注肺金。熱甚生癰。泄利不止者。為難治。得回故曰難治。此方主之。散表寒清裡熱。亦

麻黃三錢 去節升麻 五分當歸 五分石膏 二錢知母 一錢黃芩 一錢姜 一錢白朮 五分茯苓 五分白芍 五分天冬 五分桂枝 五分