



脉訣啓悟註釋目錄

診法

浮脉

沉脉

遲脉

數脉

滑脉

濇脉

虛脉

實脉

長脉

短脉

洪脉

微脉

堅脉

緩脉

芤脉

弦脉

革脉

牢脉

濡脉

弱脉

散脉

細脉

伏脉

動脈

促脉

結脉

代脉

疾脉

脉訣啟悟註釋

吳江徐靈胎著

診法

脈為血。脉血行脈中氣血之先。言脈非氣非血乃氣血之元神也。 脉之隧道。言隧道乃氣息應馬廻也。脉之所由氣息應馬廻也。脉之所由氣息應馬廻也。 先者氣血之元神也。 脉資始於腎。腎主先天一氣之始。 資生於胃。胃主後天水穀之本。 血脈氣息。血脈之行資於氣息。 上下循環。上下流。 不息。晝行陽二十五度夜行陰二十度。 十二經中。手足陰陽十二經。 皆有動脈。脉行皆動不獨寸闕尺位。 惟手太陰。手太陰肺寸經動脈。 口取決。寸口該寸闕尺兩手六部屬肺肺為藏府華蓋藏府有脉之大會而為脉之大會。 息之出入。生氣無不薰蒸之故不許諸經動脉而獨取決於寸口。 脾主中州氣息應也。 脉來四至。吸之間脈來四至是為平脉。閏以太息。 呼吸有高長短呼吸間有一息長者謂之太息。太息之間如歲月之間。 閏息之長脉來五至。五至亦為平脉。呼吸既定往來既定合為一息。 日夜一萬。日夜三千五百息。一日一夜一萬息數三千五百息。 吸之計。呼呼吸之計。 一日一夜一萬呼吸之間。一呼脈再至氣行三寸。脈行六寸。合呼吸之計八百十丈。 合一日夜一萬三千五百息計之。脈行八百一十丈當五十周于身。日夜為準。一日一夜脉行無不準此。 凡診病脉治病平旦為準。氣血未亂脈絡調匀乃可診有過之脉。

虛靜凝神。虛心靜意調息細審。調息細審察人之氣息。診病人之脉。 令人仰其掌。令其手掌後高骨。掌後高骨上掌仰。 分輕重各自不同。輕重之間意各不同。 曰舉按尋。輕取曰舉重取曰按。消息從容。消息從容不迫。關前為陽。關後為陰。關脈後半為陽。脈前半為陰。 令仰其掌。掌後高骨。掌後高骨之端。 是名關上。即是關上之端審位既確。脉的確可以布指。即可分疎密得宜。布指疎密各得其宜。 長短勿失。勿失其部。布指輕重。 布指診脈。指分輕重。各自不同。輕重之間意各不同。曰舉按。按尋。消息從容。消息從容不迫。關前為陽。關後為陰。關脈後半為陽。脈前半為陰。關脈後半為陰。脈後半為陽。尺寸陰尺。寸居關木之上為陽。尺居關木之下為陰。陽陽之界。先後推尋。先關後寸及尺推。男子之脉屬陽。女子之脉屬陰。右大為順。陰道逆行。男尺恒虛。男以陽為主。女人恒盛。女以陰為主。陽弱陰強。男子尺脉虚大為川左行。女人之脉屬陰右大為順。陰道逆行。男尺恒虛。男以陽為主。女人恒盛。女以陰為主。

反此則病。反此

經常

問前

陽為生氣條

左偏緊盛。

左脈偏寒。在表。傷寒。在裏。傷熱。

右偏緊盛。

右脈偏溫。見緊盛。傷寒。在裏。傷熱。右偏緊盛。

右脈偏威。飲食傷裏。傷胃神門屬肺。乃訣腎

兩在

關後。關後音脈部分。兩在關後。屬足厥陰肝

人無二脉。

根蒂已絕必死。不救無榮可救。脉

兩尺無脉。

尺絕必死。

尺絕必死。

有七診。七種訣法曰浮中沉。浮候中

候沉候

上下左右。自尺至寸為上。自寸至尺為下。

為下陰根于左。陽根於右。

七法推尋。推尋七種訣法又有九候。

脈有

九候。脈有

九候。脈有

即浮中沉。即浮中三部各三寸。寸關尺三部各有三候。

合而為名。合三部各有三候。每候五十

止者是滅氣元固乃

合三十候。每候五十動而不

止者為陽。

陽氣應指

為至至者

為無病。方合於經。方合於經。常之脈。

常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。

常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。

常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。

常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。

常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。常之脈。

為陽脈來止歇為止止者為陰。此六字為訣法之要。

陰陽虛實。虛實殊途。經中與旨。此脈經中深奧之

要領也。

包絡與心。手少陰心包

左寸

左關。大腸與命門應在右。

右關。太陽小腸。左關。太陽小腸。

及肺。手太陰肺。應在右寸。

右寸。胃與脾。足太陰脾。應在右關。

右關。右關。右關。右關。右關。右關。右關。

右關。右關。右關。右關。右關。右關。右關。

右關。右關。右關。右關。右關。右關。右關。

右關。右關。右關。右關。右關。右關。右關。

應診在右尺內兩傍。指尺脉內外言。

則李脇也。處李脇在兩臂之傍。故尺亦主之矣。

左外以候小腸膀胱。足太陽膀胱。左尺為應。

左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。

左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。

左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。左尺。

膀胱外浮分也。左尺之浮分以訣。

內以候真陰腎水。內沉分也。左尺之沉分以訣。

足太陽小腸足太陽膀胱。內以訣足少陰腎藏真陰。

左尺之浮分以訣手太陰肺。左尺之沉分以訣手

太陽大腸。內以候真陽相火。訣命門之真陽。

左尺之浮分以訣手厥陰心包絡。左尺之沉分以訣

足厥陰肝。訣足太陽明胃。內以候脾。

足太陽膀胱。內以訣足太陰脾。中附上。

上為寸。左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

陽明大腸。內以候真陽相火。訣命門之真陽。

左尺之浮分以訣手厥陰心包絡。左尺之沉分以訣

足厥陰肝。訣足太陽明胃。內以候脾。

足太陽膀胱。內以訣足太陰脾。中附上。

上為寸。左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

陽明大腸。內以候真陽相火。訣命門之真陽。

左尺之浮分以訣手厥陰心包絡。左尺之沉分以訣

足厥陰肝。訣足太陽明胃。內以候脾。

足太陽膀胱。內以訣足太陰脾。中附上。

上為寸。左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

左內以候心。沉分以訣手太陰肺。

陰心。外以候膻中。浮分以訣手厥陰心包絡。右內以候肺。

右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。

右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。

右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。

右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。

右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。右內以候肺。

受氣前以候前。陽明行于前闕前。太陽行于後闕後。

太陽寒水之病。上竟上者。脈氣胸喉中事也。病在胸中。

太陽寒水之病。上竟上者。脈氣胸喉中事也。病在胸中。

太陽寒水之病。上竟上者。脈氣胸喉中事也。病在胸中。

太陽寒水之病。上竟上者。脈氣胸喉中事也。病在胸中。

太陽寒水之病。上竟上者。脈氣胸喉中事也。病在胸中。

者竟下腹腰股膝胫足中事也。病在少腹腰股。

股腰膝足中推而外之。以向外內而不外。訣得

沉脈有心腹積也。心腹中推而上之。推脈氣上而下。脈氣竟下。

脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。

脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。

脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。脉氣竟下。

而內之。以向內外而不內。脉得身有熱也。脉浮為推在表則為身熱。

浮脉身有熱也。表則為身熱。推而上之。以向上上而不下。上不下腰足清也。

上不下腰足清也。虛

虛

虛

虛

而腰足。推而下之。以向下而不上。脉氣竟頭項痛也。青陽下陷故頭項作痛按之至骨。脉氣少者。脈氣至沉。腰脊

痛而身有痺也。精血空虛故痺痛綿綿也五藏不同。心肝脾肺各有本脉。各藏皆有本。左寸之心。左寸之脉。

右寸之肺。肺脉應浮濶而短。肺金清。左關。肝脈應沉而弦長。肝木應沉石而滑。謂

之象。右闕應脾。脾闕應脉象和緩。脾土中和之象。右尺命門。命門應洪。封藏之象。春弦。肝木之象。夏洪。

洪主夏令。應毛。毛主秋令。應火。火之象。肺金之象。冬石。石主冬令。應火。水之象。各十八日主治。

過實強。邪氣盛則脉大。過病生於外。邪從外感則為身。不及虛微。正氣奪則脉氣不足。不及為虛微。病生於內。不及而病生于外。熱而病生于外。和緩不忒。和緩為有胃氣。太

內脉見側傍。側傍見脉不直。名曰側闕。側闕不循正位。從尺斜至側傍。覆手見脉從尺直。名曰反闕。反闕見手背三部九候寸口。

三部各有浮中沉。肺經動脈。兩手動脈皆屬肺經。以診藏府之三候。是為九候。肺經動脈病非五藏六府十二經所居之地。五藏六府。三焦。大腸。小腸。膀為六府。各以其

時令之時循序漸進。猶四時次序運合自然。合子自然。應時即至。時應氣。氣至先期為病。氣至當至。躁促為疾。躁促為病變。四時百

病。百病生。胃氣為本。有胃氣則生。脉貴有神。按之有力不失和緩。不可不審。不可不審。脈動之象。即是有神。

三至遲則為冷。脈遲為寒。為陽。六至為數。呼吸之間。脉來六至為數。數則熱症。脉數為熱為陰。遲數既明。既明遲數為

為遲。遲則為冷。虛陰冷之病。浮沉湏別。浮沉表裏。在浮沉遲數。遲今數熱。辨内外因。外因六氣。外因於天。外感天。內因於人。內傷人。

有陰陽。陰主冷。風雨晦冥。風淫末疾。雨淫濕疫。晦冥謂陰。人喜怒憂喜。喜傷心。怒傷肝。思悲恐驚。思傷脾。悲亦

傷陽。陽主熱。風雨晦冥。晦冥時陰晦冥。人為陰冷之病。寒傷肺。思悲恐驚。傷肺恐傷腎。氣獨立判死生。死生之機。自此判然。腎脉來彈石。發如奪索。臂弱如肝脈來弦勁。急益勁如新張弓。心脈來躁疾。形如

驚傷老弱不同。老少血氣不同。風土各別。宜有別之。既明至理。既明脉還貫通。是督脈。通脈察真藏。胃氣不至乎手

心經絕脉。脾脉來雀啄。如雀啄食歇止。不至數急疾。乃脾經絕脉。常乃脾經絕脉。命門脉來。如燭之轉豆。肺脉來吹毛。如風吹毛羽輕飄。形如

脈之體象

浮脉

手起伏不常皆為死脉。診得絕脉細載於經。吉凶相逆。

二經中衝任督帶。衝為血海為諸脈之衝要。

督行於背為諸脈之總督。任主胞胎為諸脈之承任。帶脉環腰為諸脈之約束。陰維為諸陰脈之維繫。陰蹻主諸陰脈之蹻捷。陽蹻主諸陽脈之蹻捷。高章納為。

有餘。高章為諸陽脈之綱。慄卑捐為不足。慄卑為諸陰脈之綱。

二十八脉。診病條分於後。

分晰條

註于後

脉之體象

浮脉

浮為陽為表。

浮為風為虛。

浮在皮毛。

浮在皮毛之內。輕取脈即應指。言脈在浮分按之脉勢即減非虛脈也。

如水漂木。

喻水中漂木言脉勢在浮分也。

舉之有餘。

輕取曰舉。舉之脉按之不足。重取曰按。按之脉氣不足。

數陰虛。

浮虛帶數。必屬陰虛。浮豁散亂。按空豁在必難治。

即是無根。

脉既無根。

寸闕尺

兩手六部

主病

論為風為虛。

浮脉為陽。

浮為陽脉。風邪表受。

右寸脈浮。

右寸應肺。主分布衛氣。肺受風邪則浮。傷風鼻塞。

風傷衛氣則肺失分布而肺

左寸

心

左寸

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

心

辨虛實

無力表虛。脈浮無力。為表陽虛。有力表實。脉浮有力。為表陽實。欲詳裡証。詳辨裏脉浮虛象最切。脉虛主裏。

辨兼脈

浮緊風寒。浮為風象。緊為寒。東浮緩風濕。浮數風熱。浮因風鼓。數乃熱氣。浮洪風火。浮為風傷。洪為火熱。浮濇傷營。浮為風虛。濇傷營血。

浮芤失血。芤血脉芤。裏虛則浮。浮短氣虧。短主氣虧。甚則浮。浮濁氣衰。濁主氣衰。甚則浮。

辨兼象

按浮之為義。浮脉之義。如木之浮水面也。喻其脉舉之有餘。在浮分者。按之不足。言脉在浮分者。按之不足。勢即減。非虛象也。最合浮脈之義。形容浮脈之浮而盛大為洪。洪如洪水。溢滿指浮而軟大為虛。虛脉浮軟。軟大而遲浮而柔細為濁。浮而且細。且浮而無根為散。浮散無根。浮而弦大為革。浮而弦大。且浮而中空為芤。芤脈中空浮沉俱有急為革脈。芤中候獨空。乃為芤脉。

診宗脉學

浮脉者。下指即顯浮象。按之稍減而不空。舉之泛泛而流利。不似虛脉之按之不振。芤脉之尋之中空。濡脉之綿軟無力也。浮為經絡肌表之應。良由邪襲三陽經中。鼓搏脈氣於外。所以應指浮滿。在暴病得之。皆為合脉。然必人迎浮盛。乃為確候。若氣口反盛。又為痰氣逆滿之徵。否則其人平素。右手偏旺之故。有始病不浮。病久而脉反浮者。此中氣虧乏。不能內守。反見虛痞之兆。若浮而按之漸良。不能無假象發見之虛。傷寒以尺寸俱浮。為太陽受病。故凡浮脈主病。皆屬於表。但須指下有力。即屬有餘客邪。其太陽本經。風寒營衛之辨。全以浮緩浮緊分別。而為處治。其有寸關俱浮。尺中遲濇者。南陽謂之陽浮陰弱。營氣

不足血少之故。見太陽一經，咸以浮為本脈。一部不速虛實懸殊。亦有六脈浮遲而表熱裏寒。下利清穀者。雖始病有熱可驗太陽。其治與少陰之虛陽發露不異。又有下後仍浮。或兼促兼弦兼緊兼數之類。總由表邪未盡。乃有結胸咽痛脇急頭痛之變。端詳結胸藏結及痞之證。皆為下早。表邪內陷所致。究其脉雖變異。必有一部見浮。死生虛實之機。在闊上沉細緊小之甚。與不其耳。惟陽明府熱攻脾。脈雖浮大。心下反硬者。急當下之。所謂從證不從脉也。其在三陰。都無浮脈。惟陰盡復陽。厥陰愈足溫而脉浮者。皆為愈證。故太陰例有手足溫。身體重。而脉浮者。少陰例有陽微陰浮者。厥陰例有脉浮為欲愈。不浮為未愈者。須知陽病浮遲。兼見裏證。合從陰治。陰病脉浮。證顯陽回。合從陽治。幾微消息。當不越於程度也。近世為尚文浮中沉三法。舉世共推。雖卓立已見。究其所云。不論脉之浮沉遲數。但以按之無力。重按全無者。便是陰證。曷知按之無力者。乃虛散之脉。與浮何預者哉。逮夫雜證之脉浮者。皆為風象。如類中風痱之脉浮。喘欬痞滿之脉浮。煩眠衄血之脉浮。風水皮水之脉浮。消脾便血之脉浮。泄瀉膿血之脉浮。如上種種。或與證相符。或與證乖互感可治療。惟內經有腸澼下白沫脉沉則生。脉浮則死之例。然風水乘脾之證。初起多有浮脈。可用升散而愈者。當知陰病見陽脈者生。非者沉細虛微之反見狂妄躁渴。難於圖治也。

### 沉脉

沉行筋骨。沉脈在筋骨之間。如水投石。

言石投水中。喻其脉在沉分而不浮也。

按之有餘。按之脉氣有餘。沉脈之象。舉之不足。

輕取無有。言脉在沉。

不分而浮

主病

沉為陰為裏。浮為陽為表。

沉脈為陰。陰脈邪伏在裡。邪於裏無伏邪。在裏無伏只為氣滯。沉為氣滯。鬱結之脉。若屬虛衰。虛衰之症與兼脈辨治。以沉脈兼象辨別其虛實為治。

### 寸闊尺

右寸脈沉。

沉為肺病喘歎。肺苦氣逆。氣逆則痰升而喘歎。

左寸脈沉。

沉為暴怒傷營。暴恚氣鬪。營陰暗傷。

左闊脈沉。

沉為肝膽氣鬪。

結。怒傷肝鬪。

右闊脈沉。

沉為中滿食滯。中滿傷脾。

右尺脈沉。

沉為寒侵便溏。寒濕在裏。

左尺脈沉。

沉為氣結氣滯。

伏溺閉。

氣不化濕。小便癃閉。

### 辨虛實

無力裏虛。

脉沉無力。裏氣虛衰。

有力裡裏。

脉沉有力。裏邪實滯。

外證未平。

惡寒發熱。治裏勿及。從證治表不

可遷導治裏。

### 辨兼脈

沉遲痼冷。

沉為裏遲。為寒遲。從沉。

沉數內熱。

沉為裏數為熱數。從沉。

沉滑痰飲。

沉見則為痰飲。內滯沉濇。

血結。

沉為裏濇傷血濇。從沉。

沉漏虛衰。

沉為裏弱。主虛衰。

沉牢堅積。

沉為裏牢。主堅積。

寒濕。

沉為陰緩為濕緩。從沉見則為寒濕。

沉弦伏飲。

沉為裏弦。主飲弦。從沉見則為伏飲。

沉細陽衰。

沉為裏細。主陽衰。從沉見則為真陽衰弱。

### 辨兼象

按沉之為義。

沉脉如石之存水底也。渝其脈在沉。

沉而細軟為弱脈。

沉而且細。且分而不浮。則為弱脉。

沉而弦勁為牢脉。

沉而既弦。則為牢脉。

且勁為沉。而推筋着骨為伏脉。

沉而推筋着骨為伏脉。

### 診宗脉學

沉脈者輕取不應重按乃得。學指減小更按益力縱之不即應指不似實脈之舉指逼通伏脈之匿於筋下也。沉為藏府筋骨之應。蓋緣陽氣式微不能浮運營氣於表。脉顯陰象而沉者則按久愈微。若陽氣鬱伏不能浮應衛氣於外。脉反伏匿而沉者則按久不衰。陰陽寒熱之機在於纖微之辨。傷寒以尺寸俱沉為少陰受病。故於沉脈之中辨別陰陽為第一義。若始病不發熱無頭痛而手足厥冷躁不得寐而脉沉者此真中陰經之寒症也。若先曾發熱頭痛煩躁不寐至五七日後而變手足厥冷躁不得寐而脉沉者此厥深熱深陽邪陷陰之熱證也亦因始本陽邪因汗下太過而脉變脉遲此熱去寒起之虛證也。有太陽證下早胸膈痞硬而胸上脉小細沉緊者此表邪內陷陽分之結胸也若能食自利乃陽邪下陷陰分之癓結矣。有少陰病自利清水口乾腹脹不大便而脉沉者此熱邪陷於少陰也。有少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯溫之是少陰而兼太陽即所謂之兩感也此與病發熱頭痛脉反沉身體痛當溫之宜四逆湯之法似是而實不同也。有寸閼俱浮而尺中沉遲者此陽證夾陰之脉也。若沉而實大數盛動滑有力皆為陽邪內伏沉而遲細微弱弦濇少力皆屬陰寒無疑。有久時伏邪發於春夏煩熱躁渴而反脈沉濇者此少陰無氣毒邪不能發出陽分乃下虛死證也。凡傷寒溫熱時疫感冒得汗後脉沉者為愈證。非陽病陰脉之比有內外有熱而脈沉伏不數不洪指下濇小急促無論傷寒雜病發於何時皆為伏熱。不以其脉之沉小而誤認陰寒也。至如腸澼自利而脉沉寒症積瘕而脉沉歷節痛痺而脉沉伏痰留飲而脈沉石水正水而脉沉胸腹結痛而脉沉霍亂嘔吐而脈沉鬱結氣滯而脉沉咸為應病之脈。若反浮大虛濇或雖沉而弦細堅疾為胃氣告匱未可輕許以治也。

遲脈

遲脈屬陰。遲為陰象為不及。遲本陽虛之義。

中之陰象為不及。不及之象往來遲慢。陽氣虛衰不能健運營氣於脉故脉來遲慢。

一息三至。吸之間脉來三至為遲。

主病

遲主藏寒。遲為陽虛故主藏寒其病為陰。

今人為病浮屬陽虛。

遲從浮見則陽虛于外脉必浮遲無力。

沉為火衰。遲從沉見則火衰於裏脉必沉遲細微。

寸闊尺

右寸脉遲。

遲見肺痿欬沫。

肺虛成痿或吐涎沫。

左寸脉遲。

遲見心痛停凝。

心陽氣虛

左闊脉遲。

遲見筋膜結繩。

筋內結

右闊脈遲。

遲見火虛冷滯。

胃火虛衰

左尺脉遲。

遲見冷物內滯。

小便不禁

右尺脉遲。

遲見火衰飧泄。

大便飧泄

辨虛實

有力積冷。

脉遲有力無力虛寒。

脈遲無力虛寒傷寒傳變。

寒化為熱兼滑非寒。

熱初搏裏脈必遲滑。

辨兼脉

浮遲表冷。

陰寒表感沉遲裏寒。

陰寒裏感脉必沉遲遲滑脈滿。

血結于寒脈必遲滑遲弦飲精。

寒飲冷積脈必遲微。

遲結物凝。

冷物凝滯脉必遲結。

遲細寒濕。

寒濕偽藏脉必遲細。

遲微陽脫。

真陽虛脫脉必遲微。

辨兼象

按遲之為義。

遲慢而不能中和也。

脈來遲慢失於中和脉以一息四至為平。一息四至是為平脉。遲則一息三至。一息之三至。

為遲而不流利則為濇脉。遲帶而不能流利乃為濇脉。遲而有歇止則為結脉。脉來緩時一息止是為結脉。遲而浮大且軟則為虛。

脈  
數脉來浮大遲  
軟為虛脉

診宗脈學

遲脉者。呼吸定息不及四至而舉按皆遲。不似濶脉之參伍不調。緩脈之脉勢遲緩也。遲為陽氣不能鼓運營氣之象。故昔人咸以隸之虛寒。而人迎主寒濕外襲。氣口主積冷內滯。又以浮遲為表寒。沉遲為裡寒。遲濶為血病。遲滑為氣病。此論固是。然多有熱邪內結。寒氣外鬱。而見氣口遲滑作脹者。詎可以脉遲概為之寒。而不究其滑濶之象。虛實之異哉。詳仲景有陽明病脉遲。微惡寒而汗出多者為表未解。脉遲頭眩腹滿者不可下。有陽明病脉遲有力。汗出不惡寒。身重喘滿。潮熱便鞕。手足濶然汗出者為外欲解。可攻其裡。又太陽病脉浮因誤下而變遲。膈內拒痛者為結胸。若此皆熱邪內結之徵驗也。當知脉遲雖見表證。亦屬藏氣不充。不能統攝百骸。所以邪氣留連不解。即有腹滿。而頭眩脉遲。陽分之患未除。禁不可下。直待裏證悉具。然後下之。聖法昭然。豈不詳審慎重乎。遲為陽氣失職。胸中大氣不能敷布之候。詳遲為在臟一語。可不顧慮藏氣之病乎。

數脈

數脈為陽。數為陽熱。其病為陽。陽熱有盛之脉。餘之病浮虛陰涸。浮數陰虛沉熱火熱。火熱內盛。脉必少力。沉數有力。氣急脉數。脈隨氣行一息六至。陽氣運行過度則來急數而不徐往。常度而為數脈

主病

數主府熱。數為陽熱。故主府病。其病為陽。陽熱有盛之脉。餘之病浮虛陰涸。浮數陰虛沉熱火熱。火熱內盛。脉必少力。沉數有力。氣急脉數。脈隨氣行亦急軟數氣虛。氣虛不能統攝。故數則為虛

寸關尺

右寸脈數數見古寸肺瘡喘咳。肺熱成癰。咳逆氣喘左寸脈數數見左寸火炎口瘡。心火炎上。舌生瘡。左關脈數數見左關肝膽火邪。肝火雷電。右闊脈數數見右闊脾胃實熱。脾火為紅炉之火。左尺脈數數見左尺遺濁淋閉。遺精赤白濁小便淋澀。右尺脈數數見右尺燥結便紅。燥結由陰虛火旺。是大腸溫火。

辨虛實

有力實火。火邪內實脉火少數而有力無力虛火。陰虛有火脉必數而虛衰。表證悉罷。頭疼發熱惡寒之證悉罷火越宜涼。火象發越清涼折之

辨兼脈

浮數表熱。浮數主表邪發熱沉數裏熱。沉數主裏有火邪弦數肝火。弦數主少陽若無半緩數溫火。緩數溫火。緩數主太陰若無腹滿吐利則為溫火之脉陽數君火。陽數在寸陰數相火。陰數在尺左數陰陽。左手脉數為君火盛右數火亢。右手脉數為相火隆火傷。右數火亢。右手脉數為火邪亢

辨兼象

按數之為義。數脉躁急而不能中和也一呼脈再至。來急數失於中和一吸脈再至。來二至呼吸定息。合呼一吸。脈來四至。四至為平脈閏以太息。閏息之長脉來五至太息之閏。脈來五至。至亦為平脈數則一息六至。一息六至為數脈數而弦急。則為緊脈。弦急有力轉動數而流利。則為滑脈。滑脈流利如珠數而有止。則為促脈。數而有歇止為促脉數而過極。則為疾脈。為疾脉數如豆粒。則為動脈。動脈動搖為動脉

診宗脈學

數脉者。呼吸定息六至以上。而應指急數。不似滑脉之往來流利。動脈之厥厥動搖。疾脉之過於急疾也。

數為陽盛陰虧。熱邪流傳於經絡之象。所以脈道數盛。火性善動而躁急也。故傷寒以煩躁脉數者為傳。脈靜者為不傳。有火無火之分也。即經盡欲解。而脉浮數。脈之不芤。其人不虛不戰。汗出而解。則知數而按之脈者皆為虛矣。又陽明例云。病人脉數。數為熱。當消穀引食而反吐者。以發汗令陽氣微。膈內虛。脈乃數也。數為客熱不能消穀。胃中虛寒故吐也。又胃反而寸口脉微數者為胸中冷。又脈陽緊陰數為欲吐。陽浮陰數亦吐。胃反脉數。中氣大虛。而見假數之象也。人見脉數。悉以為熱。不知亦有胃虛及陰盛格陽者。若數而浮大。按之無力。寸口脉細者虛也。經曰。脈細而從按之不鼓。諸陽皆然。病熱脉數。按之不鼓。甚者乃陰盛拒陽於外。而致病非熱也。形證似寒。按之鼓擊於指下者。乃陽盛拒陰而生病。非寒也。丹溪曰。脈數盛大。按之而潛外有熱證者。名曰中寒。蓋寒留血脉外證熱而脈亦數也。凡乍病脉數。而按之緩者為邪退。久病脉數為陰虛之象。瘦人多火。其陰本虛。若形充色澤之人。脉數者。濕熱鬱滯經絡不暢而蘊熱。其可責之於陰乎。若無故脈數。必生癰疽。如數實而吐臭痰者。為肺癰。數虛而欬吐涎沫者。為肺痿。又歷攷數脉諸例。有云數則煩心者。有云滑數心下結熱者。皆包絡火旺而乘君主之位也。有云細數陰虛者。水不制火。真陰虧損也。有云數為在府者。陽邪干陽。藏氣無預也。有云數則為寒者。少火氣衰。壯火食氣也。大抵虛勞失血效嗽。上氣多。有數脉。但以數大軟弱者為陽虛。細小弦數者為陰虛。非若傷寒。衄血之脉。浮大為邪伏於經。合用發散之比。諸凡失血。脉見細小微數無力者為順。脈數有熱及實大弦勁急疾者為逆。若乍疎乍數。無問何病。皆不治也。

## 滑脉

滑脈替替。替替然。指往來流利。往來之勢。圓滑盤珠之形。如盤中荷露之義。滑利之象。殆無遺義。

### 主病

滑為血盛。血盛則脉滑。此言平人無病之脉。

主瘀主孕。

滑主有餘。非瘀即孕。

滑為邪盛。邪盛則脉滑。此言病人有病之脉。

百病皆順。百病脉滑無為。

順利

之脉。

### 寸關尺

右寸脈滑。滑見右寸。

喘咳因于痰。痰伏於肺。則喘。

左寸脉滑。滑見左寸。

心包則憊。心包則憊。

左寸脉滑。滑見左寸。

心包則憊。心包則憊。

左關脉滑。滑見左關。

膽府邪侵。疾延天胆。持胸驚惕。

右關脉滑。滑見右關。

痰滯脾胃。痰滯內帶。

左尺脉滑。滑見左尺。

遺精白濁。病濕下注。

右尺脉滑。滑見右尺。

滑。滑見右尺。

上利窘迫。痰滯腸胃。

啓閉無權。

### 辨虛實

無力虛痰。痰因虛動。

有力實滯。痰因實滯。

脉滑有力。脉滑有力。

六氣之痰。痰生於六氣。

七情之變。痰變于七情。

### 辨兼脉

浮滑風痰。

浮為風。況滑痰食。

沉為裏。滑為痰。

况滑主痰。

沉為裏。滑為痰。

滑數短火。

滑為痰。數為火。

短氣病。

短氣。

滑而浮大。

浮大為陽。脈滑浮。

大是痰火內熾。

痰火熾則腎水傷。

浮而滑散。

浮散為中氣虛滑。

而中風癲癇。

氣虛而外。

滑而不密。

風邪易入。痰伏則經絡凝滯。

滑而冲和。

滑為血有餘。冲和為氣獨治。

懷孕可決。

血盈氣調。

### 辨兼象

按滑之為義。

滑脉往來流利。而不滯滯也。

往來之脉勢流利與滑。

陽中之陰。

此陽中之陰脉。兼浮者。毗於陽。

浮見。

則為兼沉者。比於陰陽。滑從沉見。是以或寒或熱。則寒從數則熱。或表或裡。浮見從裏。之惟衡之以浮沉。浮沉以辨之。以尺寸。尺寸以始為定斷耳。

始可為陰陽表裏。權衡之辨。以尺寸。尺寸以始為定斷耳。

始可為陰陽表裏。熱寒虛實之定斷。

### 診宗脈學

滑脉者。舉之而浮。按之滑利。不似實脉之逼逼應指。緊脉之往來勁急。動脈之見於一部。疾脈之過於急。疾也。仲景曰。翕奄沉名曰滑。滑者緊之浮名也。言忽浮忽沉。形容流利之狀。無以過之。滑為多血少氣之脈。而昔人又以滑大無力。為內傷元氣。曷知滑脈雖浮沉之分。却少無力之象。蓋血由氣生。若果氣虛。則鼓動之力先微。脈何由而滑耶。惟是氣虛不能統攝餘火。而血熱脉滑者有之。嘗攷諸內經。有脉滑。曰病風緩而滑。曰熱中。脉浮而滑。曰新病。脉盛滑堅者。曰病在外。脉弱以滑。是為胃氣滑者。陰氣有餘也。則知滑脉之病。無虛寒之理。他如傷寒溫熱時行等病。總以浮滑而濡者為可治。故先師論脉。首言大浮數動。滑為陽。而雜病以人迎浮滑為風疾。緩滑為中風。氣口緩滑為熱中。滑數為宿食。尺中弦滑為下焦畜血。又嘔吐而寸口遲滑。為胸中實。下利而關上遲滑。為下未盡。厥逆而脉滑。而裏有實。詳此則滑脈之病。可不言而喻。即經有滑者陰氣有餘一語。是指陰邪搏陽而言。豈以陰氣有餘。多汗身寒之病。便可目為血多。又以滑大之脈。牽合無力。而為內傷元氣乎。平人肢體豐盛。而按之綿軟。六脉軟滑。此痰濕漸清於中外。終日勞役。不知倦怠。若安息則重着痰疾矣。夫脉之滑。而不甚有力者。皆浮滑緩滑濡滑微滑之類。終非無力之比。滑為血實氣盛之脉。悉屬有餘。婦人身有病。而脈滑和者。為孕。臨產脉滑疾者。曰難經。若滑而急強。譬譬如彈石。謂之腎絕。滑不值手。按之不可得。為太陽氣。子不足以。其絕無和緩。胃氣故經與之。