

問齋醫按
診略



問齋醫校卷第四腎部

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

伏邪

伏邪乃冬傷於寒春必病溫夏必病熱邪從中發表裏分
傳卽數月後化熱之傷寒非正傷寒數日後化熱可比既
從熱化從無寒症以洩赤爲據今第三日苔黃洩赤神煩
不寐身熱有汗不透六脉皆數顯是伏邪化熱傷陰有神
糊呃逆之慮醫話雙解飲爲宜

羌活

柴胡根

甘葛

黃芩

炙甘草

鷄心枳椇

川厚朴

枳殼

苦桔梗

赤芍藥

生薑

第四日進雙解飲得大汗熱退不靜舌苔轉黑起刺漫更
渾赤大便未解夜煩詬語邪入陽明胃府熱極亡陰之象
速宜下結存津不至呃逆神昏爲吉

柴胡根

黃芩

赤芍

枳實

製半夏

生大黃

元明粉

炙甘草

第五日服下結存津法大解三次色如敗醬夜寐稍安苔刺稍軟詰語雖止神志未清心下反覺拒按伏邪傳胃化之不盡宜復下之

黑山梔

薄荷

連翹

黃芩

生大黃

元明粉

炙甘草

第六日復下夜來大解頗多中帶痰涎汁沫遂得大汗發背沾衣諸症如失然脉猶帶數餘氛未靖養陰滌熱主之

犀角片

大生地

粉丹皮

白芍

黃芩

薄荷

黑山梔

連翹

第七日進養陰滌熱之劑數脉已緩胃氣亦醒澁色澄清陰傷未復善後宜慎食肉則復多食則遺此其禁也

北沙參

大麥冬

五味子

君眉茶葉

生薑

滾水浸代茶解渴

第三日惡寒自罷身熱無汗竟夜神煩不寐苔白澁紅脉數伏邪化熱傷陰慎防呃逆神糊之變

柴胡

黃芩

赤芍

尖板榔

羌活

炙甘艸

川厚朴

草果仁

黑山梔

生姜

第四日夜仍不寐舌轉乾黃澁更渾赤得汗蒸蒸發熱脉數大便未解伏邪併入陽明液耗陰傷可慮

柴胡根

黃芩

枳實

赤芍

薄荷

海南樛榔

川厚朴

草果仁

生大黃

第五日大便未解黃苔變黑起刺未申潮熱澁赤而渾夜煩詰語陽明府實已著宜急下之公訂小承氣合犀角地黃應手乃吉

生大黃

厚朴

枳實

犀角尖

大生地

牡丹皮

赤芍

第六日大解三次色如敗醬竟得戰汗諸証雖平餘氣未靖尚宜清理

犀角片

粉丹皮

大白芍

大生地

銀柴胡

連翹

元參

麥冬

活水蘆根

暢和中氣以掃餘氛

當歸身

大白芍

赤茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

炒穀芽

六和神麴

活水蘆根

第五日苔白淺紅身熱汗不透神煩不寐脉數伏邪盤踞
膜原化熱傷陰不至神糊呃逆爲順

柴胡

尖枳榔

川厚朴

草果仁

知母

黃芩

赤芍

炙甘艸

生薑

第六日舌苔轉黃淺更渾赤六脉仍數得汗身熱未減竟
夜神煩不寐間有錯語協熱下利口渴反欲熱飲熱極反
兼寒化邪傳入胃之始有亡陰之慮

柴胡根

甘葛

尖栴榔

川厚朴

草果仁

黃芩

知母

赤芍

炙甘草

製大黃

秋梨汁

第七日黃苔轉黑起刺赤澀涓滴作痛熱汗如雨夜煩詰
妄糞水旁流陽明邪火暴甚少陰營液就枯謹防呃逆之
變宜急下之

生大黃

芒硝

枳實

厚朴

第八日服大承氣大下結糞如膠如漆遂得戰汗見在脉

靜身涼神清氣爽惟陰分受戕未復血中餘熱未清宜服
犀角地黃湯以善其後

靈犀角

不大生地

粉丹皮

大白芍

三日苔白洩紅巔痛身疼發熱無汗夜煩不寐脉數邪伏

膜原化熱傷陰出表爲順入裏爲逆

羌活

尖檳榔

川厚朴

草果仁

赤芍

炙甘艸

黃芩

生薑

四日得汗未透苔轉深黃洩更渾赤表熱雖減頭身之痛

未除數脉未緩夜煩益甚內陷之象慎防呃逆神昏之變

柴胡根

甘葛

黃芩

尖枳櫚

川厚朴

草果仁

知母

赤芍

製軍

五日便解如醬赤沒更少黃苔起燥夜煩詰語脉數伏邪
直入陽明胃府陰液受戕堪慮

犀角片

大生地

粉丹皮

赤芍

生大黃

枳實

炙甘草

六日下後得汗如浴諸症雖平餘氛未靖陰傷未復尚宜

清理

大生地

北沙參

當歸身

白芍

赤茯苓

炙甘艸

製半夏

新會皮

七日諸症悉退惟胃氣未開胃爲倉廩非穀不養宜用同氣相求之品

白花百合

六和神麴

炒穀芽

炒麥芽

炒薏仁

黑大豆

黃小米

法製半夏

活水蘆根

第二日舌苔黃厚無津身熱有汗胸滿夜煩作渴溲赤而

渾六脉皆數膜原伏邪潰入陽明急症急攻不可拘未滿
三日不宜下之說

柴胡

黃芩

枳實

厚朴

尖檳榔

赤芍

生甘艸

生大黃

三日下後大解不爽黃苔轉黑起刺大熱人胃水竭煩躁
洩更渾赤脉如釜沸宜再下之

生大黃

芒硝

川厚朴

枳實

炙甘艸

四日昨服三乙承氣大下結糞盈盈得汗衣被皆濕諸症

霍然而愈善後靜養爲宜

元參

大麥冬

五味子

鮮石斛

金銀花

滾水浸代茶解渴

第九日下後熱退不靜有汗夜煩口渴脉數伏邪餘熱

遊於表宜重劑汗之

生石膏

白知母

炙甘草

大生地

柴胡根

黃芩

東洋參

陳倉米

荷蒂

十日進重劑發汗竟得大汗熱退脉靜神安宜和中胃

當歸身

白芍

赤茯苓

炙甘草

製半夏

陳橘皮

炒穀芽

六和神麴

白豆蔻

活水蘆根

經以其滿三日者可下而已四日下後脉浮身熱邪氣復還於表醫話柴胡白虎湯加減爲宜

柴胡根

黃芩

炙甘草

生石膏

白知母

東洋參

當歸身

甘葛

陳倉米

五日昨進柴胡白虎加減得汗諸症脫然宜養陰和胃

大生地

當歸身

白芍

白朮

雲茯苓

炙甘草

製半夏

珍珠母

陳橘皮

鮮石斛

活水蘆根

屢下得汗汗出輒復熱脉不躁非陰陽交乃伏熱中潰加

爐火撥開烟焰上騰不久自散無足慮也

大生地

銀柴胡

黃芩

炙甘草

薄荷

連翹

黑山梔

元參

大麥冬

脉症雖平大便三旬不解嘔吐不能納穀非反胃可比乃

留邪宿滯凝結腸胃之中前路未服下藥故也吳氏所謂

下格危症勉擬醫話中承氣湯加參挽之

生大黃

元明粉

枳實

人參

昨進中承氣加參大解紫黑惡臭結糞頗多嘔吐竟止陳
米清湯亦受向愈有機再以醫話歸芍二陳用和中胃

當歸身

赤芍

赤茯苓

炙甘艸

製半夏

新會皮

炒穀芽

六和神麴

始得病苦黃如杏寒戰後身熱如烙無汗漫紅脉數金匱
要畧言苦黃者下之黃自去不必拘一二日不可下之說