

臨證指南醫案

臨證指南醫案卷五

古吳葉 桂天士先生著

錫山鄒錦曉滋九全較

暑溼

寒語極明  
立方與集  
相反何故  
此乃正法  
不類也

沈

補暑邪無有出路。胸痞不饑不食。粘膩未化而肛門沈墜裏結。三焦皆受邪蒸。上下渾如雨霽。延為休日病。疾纏綿展轉。豈旦晚驟愈之病。龍節並斷不可用。雖有余症不能拔也。

徐

夏季痢症多是濕熱食積。初起宜分消其邪。但肌柔白嫩乃氣虛之質。且性情畏藥。只宜少與勿過。

枳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒銀花

麥芽

生薑

小川連

人參

枳實

炒黑山楂

峻攻耳

厚朴

黃芩

川連

木香

查內

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣不能去病。今微嘔不飢不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不和。總是胃病。人參一錢。吳萸炒川連四分。泡淡生乾薑五分。茯苓三分。川棟子肉一錢。生白芍一錢。

某女。舌色灰黃。渴不多飲。不飢惡心。下利紅白積滯。小溲不利。此暑溼內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。不必見積以攻滌下藥。

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

薏香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏經來暑濕

瘀脹

心煩

自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳氏瀉痢兩月。肢體浮腫。高年自屬虛象。但胸脘痞悶。納穀惡心。每利必先腹痛。是夏秋暑熱鬱滯於中。虛體

挾邪焉。有補濇可去邪扶正之理。恐爻節令變症。明是棘手重症矣。

人參

茯苓

川連

淡乾薑

生白芍

枳實

某臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑氣。與病異岐。先理新病。

論是方非



某下溼熱內蒸下痢紅積

炒黑神麴、炒黑查內

茯苓皮

飛滑石、新會皮、厚朴、淡竹葉、扁豆葉

祝三十年久痢須推飲食避忌酒客溼滯腸中

非風藥之輔佐苦味入腸何以勝溼逐熱久病飲食不減腸中

病也

此非煎藥所能治者

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某形瘦陰虧溼熱下痢误投消食反却津液邪未盡津先耗咽喉痛且嗰欬所謂溼未罷已上燥矣

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某溼熱內阻氣分腹痛下痢目眴黃舌光不渴讓清裏泄濕熱

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山十五溼鬱腹痛痢紅如豆汁

生茅术錢

炒山楂錢

厚朴錢

紅麴半錢

廣皮一錢

猪苓一錢

某夏秋痢疾固是溼熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連丸

取其青夏熱必佐理氣謂氣行斯溼熱

積聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與痢門溼熱大異蓋滋則呆滯氣鍊空塞宜乎欲便

不出究竟溼熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直

透腸中再用大黃重華兼知母生地等味更令傷及下焦

亦不盡良

亦不盡良

亦不盡良

亦不盡良

亦不盡良

亦不盡良

亦不盡良

症議與升陽亦須下治

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風根

羌活

細辛

生薑

某舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微嘔有痰口味有礙頭中空痛兩頰皆赤此穀氣蒸濁

熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩燥難鳴苦况法當苦寒泄熱苦辛香流氣滲泄利溼蓋積滯有形溼與熱本

無形質耳

川連

黃芩

鬱金

厚朴

猪苓

槐米

秦皮

某先厥下利腹血腹痛嘔逆乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致變經

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

白頭翁湯加芩芍

又溫邪誤表。劫津神昏。恐致瘧厥。

炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍 炒丹皮 女貞子

邱姬進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利宜柔。宜通血虛有風顯狀。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑糟豆皮

某熱漸入裏胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

病協  
熱

潘

內虛邪陷。協熱自利。脈左小右大。病九日不減。是為重症。議白頭翁湯方加黃芩。白芍。

時令暑溼都從口鼻而受。氣鬱則營衛失於轉運。必身熱無汗。其邪自上以及中。必循募原。致腸胃亦鬱。

腹痛瀉積。無非濕熱之化。此分消利溼則可。若以表藥。則傷陽氣矣。

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山楂

人

協熱下痢。沾膩血水。是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某

春溫內陷。下痢最易取脫。

川連

阿膠

淡黃芩

炒生地

生白芍

炙草

火草

王

熱毒逗留。不化潮熱。下利。

川連

黃芩

炒白芍

茯苓

澤瀉

木瓜

火草

張三

江南地薄氣弱。夏季食物內蘊。時令熱迫內聚。溼熱赤痢。入冬不愈。皆飲食不忌之累。宜淡薄滋味。

生茅木

厚朴

南山楂

草果仁

樗根皮

槐花

廣皮

銀花

又

痢血三月。晝痢夜止。肛門欲墜。以氣陷門戶不藏。

白芍

肉桂

吳草

白朮

廣皮

煨薑

南棗

某四

血痢半載。少腹痛。六味地黃加炒查肉炒延胡。

人參

當歸

白芍

肉桂

吳草

白朮

廣皮

煨薑

某五

血積痛痢。起於夏令。秋半不減。明是濕熱滯於腸胃。久延面色消瘦。右脈搏大。乃痢症所大忌。稍通積聚。

兼以和血 酒炒大黃 川連 黃芩 丹皮 肉桂 歸身 白芍 生甘草  
袁二久痢腹疼下血 生黃芪錢 生白朮三錢 炒歸身一錢 炒查內錢 炒地榆錢 廣皮錢 厚朴錢  
羌活五分 防風根五分

朱三下痢帶瘀血 肛中氣墜腹不痛 炒黑樗根皮一兩 生茅朮錢 生黃柏錢 少炒黑查肉錢  
炒魚銀花錢 赤苓錢 猪苓錢 炒黑地榆半錢 半錢 半錢 半錢

某 痛痢不爽已有血下 暑濕不獨在氣分且積勞如素攻奪宜慎

當歸

白芍

南山查

厚朴

草果

炮薑

某 脹緩脅上痛便稀溺短此乃濕鬱脾胃之陽致氣滯裏急宗古人導溼分消意

生茅朮

廣皮

厚朴

官桂

飛滑石

赤苓

澤瀉

五苓散加

張七脈沉伏久痢腹痛畏寒少食氣弱腸滯以溫通方法

熟附子

生茅朮

生大黃

赤苓

厚朴

木香

生麥芽

又 溫下相投腸滯不通皆因腑陽微弱古賢治痢不離通瀉二法

當歸

內桂心

赤苓

厚朴

南山查

生麥芽

王二平昔溫補相投是陽不足之體間患痢兩月不忌食物脾胃滯壅今加嘔惡夫六腑宜通治痢之法非通

即濁肚腸結閉陽虛者以溫藥通之

熟附子

製大黃

厚朴

木香

赤苓皮

范七痢稱滯下謂有滯必先痛後下況病起不慎口腹陽氣窒塞積聚留着試閱前方宣通者有効守補則病

劇六腑皆以宣通為用

附子

大黃

赤苓

厚朴

生草果

廣皮

又 溫下已效腸胃留滯都因陽不主運再佐理氣兼之

附子

製大黃

赤苓

廣皮

厚朴

生益智

木香

猪苓

李 利將兩月日微黃舌白口乾唇燥赤腹滿按之軟竟日小便不通病者自述肛門塞努挣不已僅得逆

出粘積點滴。若有稀糞。自必傾腸而多。思夏秋間暑溼內着為痢。軒岐稱曰。滯下謂滯著氣血。不獨食滯一因。凡六腑屬陽。以通為用。五臟皆陰。藏蓄為體。先瀉後痢。脾傳腎則逆。即土冠水意。然必究其何以傳旺之由。蓋伏邪垢滯。從中不清。因而下注矣。遷延日久。正氣困虛。仲景論列三陰。至太陰篇中。始挈出腹滿二字。樣脾為柔臟。惟剛藥可以宣揚驅濁。但今二腸室。脾氣不留。行理中等法。決難通腑。考內經二虛一實者。治其實。開其一面也。然必溫其陽。佐以導氣逐滯。欲圖扭轉機關。捨此更無他法。

方倫  
製附子

生厚朴

木香

製大黃

炒黑大茴

陽虛  
又解弛半月。脾腎復憊。脾敗不主健運。納食皆變痰沫。腎真火可納氣。水液上泛阻咽。皆刑傷濁壅。變服未傳。脈見弦勁。是無胃氣。小愈變病。最屬不宜。入冬為藏陽之令。今陽漸消散。而陰液枯槁。渴不多飲。飲不解渴。治陽必用剛藥。其陰更涸矣。轉展無可借箸。勉與脾腎分調。脾陽動則冀。腎陽靜可望。藏王道固難速功。揆之體用。不可陰藥。早服炒焦腎氣丸。午服參苓白朮散。加益智仁。

許三

勞倦咳嗽失血。仍然不避寒暑。食物腹中瀉利。病上加病。後感法當先治。以分病有新舊。

厚朴

益智

廣皮

茯苓皮

白芍

炙草

木瓜

炒扁豆

炒砂仁末

茯苓

廣皮白

炒砂仁

穀芽

砂仁殼

又咳嗽瀉利。藥治相背。治肺礙脾。治脾礙肺。方今交冬。治痢為要。病人說早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已乏。勿徒消滯寒越矣。白芍  
桂枝  
百益智  
廣皮  
茯苓  
焦白朮  
炙草  
穀芽  
砂仁殼  
張下痢瀉泄之後。診脈右弦大。胃虛少納。陽弱不司運化。法當通腑之陽。

人參

益智仁

炒  
絲餅

炒砂仁末

茯苓

厚朴

乾薑

陸二腹滿自痢。脈來濡小。病在太陰。況小便清長。非腑病溼熱之比。法當溫之。

生於术

附子

茯苓

厚朴

乾薑

桂枝

白朮

砂仁殼

炒砂仁

茯苓

廣皮白

炒砂仁

穀芽

砂仁殼

許二痢疾一年。已浮腫溺濁。古稱久痢必傷腎。月前用理陰煎。不應。詢及食粥吞酸。色痒脈濡。中焦之陽日憊。水穀之溼不運。仍半溫以甦脾陽。佐以分利用。胃苓湯去甘草加益智。

陳 痘精雖然少緩。諸款不減。面色青晦。四肢厥冷。仍在陰。逢服。

人參。煨益智仁。公丁香。茯苓。廣皮。青皮。木瓜。炒冬米。

益黃散法。

某 脈微細。肢厥下痢無度。吳茱萸湯。但能止痛。仍不進食。此陽敗陰濁。腑氣欲絕。用桃花湯。

赤石脂。乾薑。白粳米。

某 痘後大便不實。食不健運。色脈俱是虛象。此清陽失曠於中。陰氣先走泄於下。先理中焦。再當攝陰。

人參。白朮。附子。茯苓。炙草。廣皮。炮薑。益智。

某 自痢不渴者屬太陰。呃忒之來。由乎胃少納穀。衝氣上逆。有土敗之象。勢已險篤。議金匱附子粳米湯。

人參。附子。乾薑。炙草。粳米。

某 長齋有年。土薄氣餒。加以久痢。少穀欲嘔。脾胃之陽衰矣。由夏及今。半載不痊。倘忽腫脹。何法施治。

人參。白朮。乾薑。炮薑。丁香。茯苓。

袁 中下陽微。嘔呃下利。溫中不應。恐延襄脫。夫陽宜通。陰宜守。此關閘不致清散。春回寒谷。生氣有以把握。

候王先生議。人參。附子。炮薑。炒粳米。赤石脂。生白芍。

某 眼沉微。下痢紅紫黑舌。胎粉白並不渴飲。此太陰脾營虛寒也。做理陰煎。

當歸頭。白芍。炮薑。炙草。茯苓。益智。

唐氏下痢四十餘日。形寒腹痛。炒當歸。生白芍。肉桂。炒山楂。青皮。茯苓。

沈 議堵截陽明一法。人參。炒白朮。炮薑。赤石脂。

某 四高年下痢。痰多舌乾。脈右空大。神困音低。乃脾腎兩虧。二氣交虛。有年致此。恐非所宜。

人參錢半。菟絲子錢半。赤石脂錢三錢。炮薑錢。茯苓錢。木瓜錢。

王 五久痢久瀉。為腎病。下瀉久而陰傷氣墜。四神丸治脾腎晨泄。辛溫香燥。皆剛佐入五味酸柔。不過稍製其

脾腎兼虛  
不闇  
陽明

脾腎

入痢忘陰  
久屬有年  
其津液  
溫中自然  
不應

陰傷

雄烈此。肛墜尻瘦。乃。腎液內少。而。氣陷矣。腥油肉食須忌。

熟地

禹餘糧石  
五味子

蔣五久。痢用半甘溫而效。是脾陽久傷。治由東垣法極。是迷食血腥。滑必便溏。四肢忽有肉疹。營衛內應脾胃。氣血未得充復。五旬外下亦法。用脾腎兩補。

人參 山藥 茶芩 湖蓮 艾實

補骨脂 蓬谷 英肉 五味 巴戟

菟絲 覆盆子

熟地炭 炒歸身 炒白芍

炒查肉 茶芩 美草

澤瀉

下痢腹痛舌乾。肛墜。傷陰也。

熟地炭

阿膠

丹皮

山梔

猪苓

澤瀉

滯濁下行痛緩。議養陰通腑。

生地

阿膠

丹皮

山梔

猪苓

澤瀉

某其孫

熟地炭

當歸炭

山查炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

脈左數。下利腹不甚痛。暮夜微熱。所伏暑熱。乘陰虛下陷。是清熱理脾。不效。當攝陰升陽。

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

照方去山查麥芽。加人參。焦白芍。

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

瀉痢久必陰損。液耗此口渴微咳。非實火客邪。與甘酸化陰。

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

瀉痢久陰消亡。無以上承。必唇燥舌乾。奈胃關不和。善噫難飢。此由陰膩柔潤所致。擇其不膩滯者調之。

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

蔡

脈右數。左細數。面垢舌燥。白苔點點。肌膚甲錯。左脅動氣。伏暑當秋涼而發。初病如瘡。當從苦寒法。裏

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

酸甘化陰法。人參 生地 烟草 木瓜

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

酸甘化陰法。人參 生地 烟草 木瓜

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

酸甘化陰法。人參 生地 烟草 木瓜

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

酸甘化陰法。人參 生地 烟草 木瓜

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又

酸甘化陰法。人參 生地 烟草 木瓜

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

人參 焦白芍

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

炒黑升麻

炒黑升麻

人參 焦白芍

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

炒黑升麻

炒黑升麻

某

陰液涸則小水不通。胃氣逆則厭食欲嘔。此皆痢之欬症也。治以中下二焦為主。宜理陰煎。

熟地炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

炒黑升麻

此為正論

此方無效不可用

白芍

附子

五味

炮薑

茯苓

吳三痢久陰傷。腹痛肛門墜脹。秋病入冬不愈。已屬休息症。和陰劑中仍有升。做東垣法。

久痢  
傷腎

陳七瀉痢久則傷腎。多見下焦沉墜。先傷在陰。剛藥不效。

下焦  
不攝

人參。鹿茸。菟絲子。茯苓。柏茴香。製補骨脂。砂仁。

少熟地

熟地

張一晨泄痢血屬腎病。無痛墜等。因用黑地黃丸。

范瀉痢起於長夏。醫謂時令溼熱。胃苓芍法固非謬說。因高年腎陽肝陰先虧。使客氣內擾。阻遏中流。

乏砥柱坐鎮。致狂瀉滔天耳。病經兩旬不減。重陰無陽。驗諸神識甚清。其外邪為少。而內損為多。八脈無權。

下無收攝。漏危不已。理必生陽泄下焦冷。此皆陰陽二氣微絕。治病則分治本則宜。非置之不理。實究天人。

而已。人參錢。鹿茸錢。炒黑當歸錢。生杜仲錢。生沙苑錢。茯苓錢。

李十五自痢五六年。即周身痛痺。蓋腸胃病致經絡筋骨藩籬疎撤。陽失衛。藥難效。靈書此代煎。

朱七痢久肛墜。是下焦腎虛失於收納。治脾胃藥無功。

冬於木

從容

熟附子

河水煎

熟附子

吳九治痢大法。無過通塞二義。夏秋濕熱固多。初痢不痛。已非溼熱。色滯者。腸中陳腐也。至今痛而痢。痢後復

痛。按之痛減。屬虛小雪不愈。陽不來復。久痢治腎。然非滋膩。先用苓薑木桂湯。

某氏治痢古法。不越通濫。經停有瘕。腹浮腫。八脈之病。醫惑於見痢認為脾胃症。議用濟生腎氣丸。

朱七痢久肛墜。是下焦腎虛失於收納。治脾胃藥無功。

熟地炭

炒歸身

赤石脂

五味子

炒查肉

肉果

周四六痢久必傷腎陰。八脈不固。腸膩自滑而下。但孰健脾無用。病不在中。納穀遲延。下焦坎陽亦衰。用三神丸。

某痢久陰陽兩傷。少腹肛墜。連兩腰胯脊牌痠痛。由臟腑絡傷已及奇經。前議輕劑升陽順投。仍從下治。

五味子

補骨脂

肉果



張氣東熱。腹痛下痢。脫中瘧門。不欲納食。由瘧變痢。經邪入腑。斯病勢已重。清理濕熱以開痞。延久必須

扶正

淡黃芩

川連

人參

生白芍

乾薑

枳實

某

邪陷瘧後變痢。傷及厥陰。症見氣上撞心。飢不能食。乾嘔腹痛。全是肝病。肝為至陰之臟。相火內寄。仲景治法不用純剛燥熱之藥。以肝為剛臟故也。今正交土旺。土木為讎。五日內未為撻當。

人參

炒當歸

炒白芍

炒烏梅肉

茯苓

淡吳萸

生杏附汁

真北秦皮

腸風

孫

下痢血積。肛墜。腸間汨汨有聲。此屬腸風。當用攝固。

熟地炭

萸肉炭

炒歸身

炒杞子

川斷

澤瀉

北味肉

煎藥送赤石脂丸三錢

某當年痢久。用三神丸得效。是脾腎兩困。兼理氣分之滯。體質陽虛。遇冷病加。今病起長夏。小水不通。必係

夏熱阻其宣化。久則氣血凝著。而為腸紅。先與桂苓甘露飲分消其濕。

於木

茯苓

猪苓

猪苓

澤瀉

滑石

桂心

喟口

包

川連

人參

黃芩

白芍

草決明

炒山查

炒山查

炒銀花

桂心

又

噤口痢乃熱氣自下上衝而犯胃口。腸中傳導皆逆。阻以閉。腹痛在下。尤甚。香連梅芍。僅宣中焦。未能泄

下熱燔燎。若不急清陰液。同歸於盡。姑明其理。以俟高明備採。

白頭翁湯

又脈左細數。右弦。乾嘔不能納穀。腹痛裏急。後重。痢積不爽。此暑溼深入。著腑。勢屬噤口痢。症非輕渺。議

用苦寒清解熱毒。必痛緩胃開方。免昏厥之變。

川連

黃芩

銀花

炒山查

乾薑

白芍

桂心

又

下午病劇。乃陰氣消亡之徵。若但陰柔。恐生生不至。疎補胃藥。正宜進商。

生地

阿膠

人參

生白芍

炒山查

炒銀花

桂心

喬

初起無寒熱。即瀉痢嘔惡不食。乃噤口痢重病。夫暑邪之傷。由口鼻吸氣而入。邪與水穀交混蒸發。溼熱

釀為積滯膿血。腸胃氣窒。欲解不能通爽。遂致裏急後重。香連苦辛。理氣導溼清熱。初用頗是。皆緣勞碌之

人非膏梁溫養之質。淡薄積勞中氣易傷。四十日來。積少痛緩。醫稱病解而食不下咽。不知飢飽。診得脈弦形袁舌白。不渴飲水。日瀉數行。全屬胃倒氣奪。中宮損極。下關不攝。穀不能咽。焉能承受湯藥。藥味氣劣。胃衰必惡。久痢久瀉。務在能食。古人非醒脾胃。即安腎攝納。再詢粉漿下咽。或嗰或噎。議以上院宜通其清陽。下焦當固攝。其滑脫。倣古方中參苓白朮散末。當以米飲日服二次。間以不膩滑之物。食些少勿多。以示胃之所喜為補。必須胃氣漸醒。方可轉危為安。

人參二錢

焦術半錢

茯苓半錢

炙草五分

炒扁豆

二錢

苡仁半錢

桔梗一錢

砂仁七分

炮薑炭一錢

肉豆蔻一錢

右藥研細

秤准分兩

每次用香梗米湯調服

一錢五分。須日進二次。

鮑

內著。必脾胃氣醒。始可磨耐。以高年不可過清過消。用清暑益氣方法。

川連

黃芩

石蓮子

煨乾葛

青皮

人參

茯苓

厚朴

猪苓

澤瀉

又此攻病保真理。難捉摸矣。

川連

黃芩

草決明

石蓮子

烏梅

白芍

陰暑二字  
不通已極  
其用熟藥  
病根在此

人有陰暑

痢症古名滯下。惟夏秋暑溼挾積者居多。其次則風淫火迫寒侵也。推之燥氣獨不為患。攻前法悉有定例。不必再述。至於暑者有陰暑陽暑之分。其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧。加以貪涼喜冷。鬱折生陽。故主於溫。陽暑由於天之熱。伏阻氣化。濁則重於清。而醫之下手工夫。於此須細心認定。但邪之來也。似水之流。臟腑間一有罅隙。則乘虛而著。故有在氣在血之分。傷臟傷腑之異。若表之邪鬱。而氣機下流不息者。喻氏論人參敗毒散裏之積壅。而寒熱交粘者。潔古立芍藥湯。在氣分有苦辛調氣與辛甘益氣等法。在血分有酸苦行血及鹹柔養血諸方。若表症急從乎三陽。有桂枝湯。葛根芩連湯。小柴胡湯。青陽明。以或通或塞之去。則瘧症確宜庶乎不錯矣。但是症不治之條甚多。最難愈者。莫如休息。則久安。

得古方服  
藥之法

溼熱

鄭

夏至後溼熱內蒸。腸風復來。議酸苦法。

川連

黃芩

烏梅肉

生白芍

廣皮

厚朴

荆芥炭

菊花炭

火駕車丸

二錢

某

脈右數

形色蒼黑

體質多熱

復受長夏

濕熱

內蒸

水穀氣壅

血從便下

法以苦寒

佐以辛溫

薄味經月可

冀病愈

茅木

川連

黃芩

厚朴

荆芥炭

菊花炭

火駕車丸

二錢

程

年前痰飲哮喘

不得安卧

以辛溫通陽切飲而愈

知脾陽內弱

運動失職

水穀氣蒸

飲邪由溼而成

溼屬

陰

又變化熱

熱入絡血必自下

但體質仍屬陽虛

凡腸紅成方

每多苦寒

若臟連之類

於體未合

母欲速也

此非治便血之方

生於木

於糞後

血少

年淳朴得此

乃食物不和

腸絡空隙所滲

與升降法

陽虛  
寒溼

俞

陽虛腸紅洞寫

議劫胃水

理中換生茅木

生厚朴附子炭炮薑

丹皮

程十脈沉

是時屬非陽

少

年淳朴得此

乃食物不和

腸絡空隙所滲

與升降法

之法非一。予亦不贅。最危險者莫如噤口痢。却有兩端。若因暑溼外充格拒三焦者。氣機皆逆傳而閉上。下之勢渾如雨截。若治不得其要。則邪無出路。正立消亡。此丹溪立法最高。後世都宗其旨。先生又借用半夏瀉心湯減去守中之品。取補以運之。辛以開之。苦以降之。與病情尤為尤協。所以先生之見長。是集仲景理中易腎氣丸。及景岳理陰煎。胃關煎等法可也。吾鄉姚頤真先生。化出捷徑良法。以大劑葛根配參歸。歸附桂製白芍之類治之。靡不應手而愈。想葛之性。溫能達下。鹹可利胃。質之柔順。以補陽中之陰。較地黃阿膠尤勝。與之腸膏竭盡。絡脈結濤而痛者。堪稱神品。自此推廣用活甚多。若曰某方某藥。但治某症。不知活用反稱杜撰。則禁絕後人靈活之心。無從施發矣。邵新甫○傳人三陰之痢。由溼熱積滯與傷寒。遇大虛損中二則。夏秋之痢。總由溼熱積滯與傷寒。亦甚多一遇老年及久病。即混入陰經治法。并參附烏梅五味等全不對症。隨筆亂書。并與案中之論。亦自己相背。想是習氣使然。抑此中實無定見也。後人竟用溫補以為本之。此老殺人無算觸目傷懷。

此乃痔血  
不持此老  
不知天下  
名醫無一  
知者我見  
為一劇  
百計可見

茅木

厚朴

廣皮

炮薑

炙草

升麻

柴胡

地榆

地榆炭

又

脈緩濡弱。陽氣不足。過飲溼勝。大便溏滑。似乎不禁。便後血色紅紫。兼有成塊而下。論理是少陰腎臟失司。固攝而陽明胃脈但開無合矣。從來治腑以通為補。與治臟補法迥異。先擬緩胃通陽一法。

生茅木

人參

茯苓

厚朴

炮附子

炮薑炭

地榆炭

脾陽退溫

中虛

陷溫下火犯土

某陽虛體質。食入不化。飲酒厚味即瀉。而腸血未止。蓋陽微健運失職。酒食氣蒸。溼聚陽鬱。脾陽清陽日陷矣。

從謙甫先生法。人參二錢。茅木半錢。廣皮半錢。炙草半錢。生益智

厚朴二錢。茯神二錢。附子三錢。乾薑二錢。歸身錢

廣皮二錢。炙草二錢。白木錢。升麻三錢。葛根二錢。白芍錢。益智錢

地榆三錢。神曲半錢。右藥各製蜜丸湯丸。

劉六鬱怒。腸紅復來。木火乘脾。絡腹中。微痛。議與和陰。

冬桑葉。丹皮。生白芍。黑山梔。廣皮。乾荷葉邊。生穀芽。不切。

張二年前衝氣入膀。有形痛。嘔前後有血。此屬厥陽擾絡。風動內燥。頭顛皆眩。每日用龍鬚丸。

葉噴怒動肝絡。血乃下。按之痛減。為虛。夫肝木上升。必犯胃口。遂脹欲嘔。清陽下陷。門戶失藏。致裏急便血。

參木炮薑。辛甘溫緩。乃太陰脾藥。焉能和及肝胃。丹溪云。上升之氣自肝而出。自覺冷者。非真冷也。駐車丸二錢。

程四少陽絡病。必犯太陰脾陽。衰微。中焦痞結。色痿加痺。便後有血。論脾乃柔臟。非剛不能逆陽。然鬱勃致病。

溫燥難投。議補土泄木方法。人參。當歸。枳實汁。炒半夏。桑葉。丹皮。參歸養脾

之營。枳半通陽明。滯桑丹泄少陽之鬱。

某凡有痔疾。最多下血。今因嗔怒。先腹滿。隨瀉血。向來糞前。近日便後。是風木鬱於土中。氣滯為膨。氣走為

此何以竟  
道著

大腸  
熱

瀉議理中陽泄木佐之。

人參 附子

炮薑 茅木

厚朴 地榆 升麻 醋炒

柴胡 醋炒

某便紅脈數。

生地錢

銀花錢

黃芩錢

白芍一錢

槐花錢

程二脈數能食腸紅陰自下泄。腸腑執職所致。

非溫補之症。

丹參 黃柏

黑櫻豆皮

地榆炭

柿餅炭

槐花

金石斛

某三內熱腸紅發痔當清陰分之熱。

生地

炒丹皮

酒炒黃芩

炒黑槐花

柿餅炭

元參

銀花

黑山梔

汪嗽血已止。糞中見紅。中食之熱下移。腸胃屬腑。止血亦屬易事。花甲以外年歲熱移入下到底下元衰矣。

細生地

川石斛

柿餅灰

天冬

趙三勞倦便後血。

炒黑櫻根皮

炒澤瀉

炒黑地榆

炒黑丹皮

五加皮

炒黑銀花

元參

銀花

錢八十陰虛內熱。腸紅不止。

炒黑櫻根皮

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

歸身

禹糧石

赤石脂

木瓜

炒烏梅

蔡三脈濡小食少氣衰。春季便血。大便時結時溏。思春夏陽升陰弱少攝。東垣益氣之屬。升陽恐陰液更損。議

以甘酸固濡闡明為法。

人參 炒粳米

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

禹糧石

赤石脂

木瓜

炒烏梅

某能食腸血脈細色痿。肛痔下降。議酸苦燥風堅陰

炒白芍

炒丹皮

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

禹糧石

赤石脂

木瓜

炒烏梅

吳八中滿過於消。剋便血。食入易滯。是脾胃病。血統於脾。脾健自能統攝。歸脾湯據其守。疎腑養臟相宜。

炒肉炭

五味炭

地榆炭

禹糧石

赤石脂

九蒸白木

南山查

茯苓

廣皮

穀芽

薑棗湯法

凡痔血多而外

脾胃虛

人參

焦木錢

茯苓錢

火草五

木瓜錢

炮薑五

心脾  
營損四陽  
血則年者持  
者基多  
久持

歸脾鈎糖丸

附論

李十三上。年夏季。絡傷下血。是操持損營。治在心脾。

歸脾鈎糖丸

入暮腹痛鳴響。累丸久已偏墜。春正下血。經月顏色鮮明。此痛決非傷於積聚。乃營損寒乘。木來侮土。致

十四載之缠綿調營培土以甘。泄木散鬱宜早。節口戒怒。百天可效。

人參 炒當歸

炒白芍

肉桂

炮薑

茯苓

炙草

南棗

又

細推病情。不但營氣不振。而清陽亦傷。洞泄不已。而辛潤宜減。甘溫宜加。從桂枝加桂湯立法。

人參

桂枝

茯苓

生白芍

炙草

肉桂

煨薑

南棗

又

仍議理營

人參

於木

茯苓

炮薑

桂心

白芍

真武丸二錢

某

甚便後下血

此遠血也

焦木錢

炒白芍錢

炮薑錢

炙草五分

木瓜一錢

炒荷葉邊二錢

方

脈小左數。便實下血。乃肝絡熱騰。血不自甯。醫投參芪歸桂。甘辛溫緩。昧於相火。寄藏肝膽。火燄風翔。上

蒙清空。鼻塞頭暉。喰咳不已。一悞再悞。遺患中厥。夫下虛則上實。陰傷陽浮。陰乃一定至理。

連翹心

竹葉心

鮮生地

元參

丹皮

川斛

茯神

炒牛膝

又

下血陰傷走泄。虛陽上升。頭上清敷。參芪桂。辛甘助上。致鼻塞耳聾。用清上五六日。右脈已小。左仍細

數。乃陰虧本象。下愈虛則上愈。實議以滋水制火之方。

生地

元參

天冬

川斛

生地

元參

川斛

生地

元參

生地

又

脈左數。耳聾脣痛。木失水涵養。以致土泛。用補陰丸。

補陰丸五錢

又虎賁丸

羊內膠丸

又虎賁丸

羊內膠丸

又虎賁丸

羊內膠丸

又虎賁丸

某

腸紅粘滯。四年不痊。陰氣致傷。肛墻刺痛。大便不爽。藥難驟功。當以潤劑通腑。

姚

勞傷下血。絡脈空乏為痛。營衛不主循序流行。而為偏寒偏熱。診脈右空大。左小促。通補陽明。使開闊有

序。歸巽建中湯

唐七

內經以陰絡傷則血內溢。蓋燒酒氣雄。擾動臟絡聚血之所。雖得小愈。而神采爪甲不榮。猶是血脫之色。

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

虛

陰虛

血溢

營衛

勞傷

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

歸巽建中湯

脾腎

虛

血溢

營衛

勞傷

歸巽建中湯

歸巽建中湯