

9
審視瑶函

卷之二目錄

淫熱反尅之病

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

黃連爐甘石散

龍腦黃連膏

啗鼻碧雲散

蕤仁春雪膏

風熱不制之病

羌活勝風湯

杏仁龍膽草泡散

七情五賊勞役饑飽之病

柴胡復生湯

黃連羊肝丸

當歸養榮湯

助陽活血湯

決明益陰丸

加減地黃丸

血爲邪盛凝而不行之病

川芎行經散

消凝大丸子

氣爲怒傷散而不聚之病

千金磁硃丸

滋陰地黃丸

石斛夜光丸

滋陰腎氣丸

血氣不分混而遂結之病

防風散結湯

熱積必潰之病

竹葉瀉經湯

蜜劑解毒丸

陽衰不能抗陰之病

決明夜靈散

陰弱不配陽之病

中和養胃湯

東垣瀉熱黃連湯

益氣聰明湯

心火乘金水衰反制之病

還陰救苦湯

菊花決明散

神驗錦鳩丸

萬應蟬花散

內急外弛之病

黃芪防風飲子

無比蔓荊子湯

奇經客邪之症

撥雲退翳丸

梔子勝奇散

磨障靈光膏

消翳復明膏

爲物所傷之病

益損湯

傷寒愈後之病

人參補胃湯

強陽搏實陰之病

抑陽酒之散

亡血過多之病

芎歸補血湯

痲疹餘毒之病

羚羊角散

消毒化痲湯

深府爲害之病

茯苓瀉濕湯

升麻龍膽草飲子

傅氏眼
審視瑤函目終

傅氏眼科審視瑤函卷之二

祿陵傅仁宇九科纂輯

增張文凱廷獻參閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

目病有三因

陳無擇曰喜怒不節憂思兼併以致臟腑氣不平鬱而生涎隨氣上厥乘腦之虛浸淫目系陰注於目輕則昏澀重則障翳眵淚努肉白膜遮睛皆內如數冒風寒不避暑濕邪中於項乘虛循系以入於腦侵於目而生目病

者

皆外因

若嗜慾無節飲食不時頻食五辛過啖炙煇馳

騁田獵冒涉烟塵勞動外情皆喪明之具

此內外因也

徐彥純曰人之眼目備臟腑五行相資而神明故能視若

內障乃瞳神黑小神光昏昧也外障則有翳膜可見矣

凡見內障有因於痰火氣鬱血熱偏陽偏陰虛脫榮衛

種種不同外障有起於內眦睛上睛下睛中視其翳色

從何經來惟宜分治蓋目之為病肝熱則昏暗心熱則

煩痛風濕則癢血少則溢腎虛則睛損甚則陷突微則

翳看矣

診視

經曰左寸脈洪數心火上左關脈弦而洪乃肝火盛也左尺

脈微弱乃腎水不乃右寸關脈俱弦洪乃肝木挾相火

勝之金而戕已右尺脈洪數為相火邪火上炎挾肝木

所勝之士也右尺脈洪數之邪而燥目也按六脈

浮緊有力者為寒沉數有力者為熱微細而弱者為虛

洪大而滑者為實夫五臟常欲相順相生如心見緩肝

見洪肺見沉脾見濇腎見弦此五臟相合相生之理稟

太和之氣其疾何以生焉是為疾者五臟必相尅相反

如心見沉細肝見短濇腎見遲緩肺見洪大脾見弦長

此五臟相形相尅遯相互變之機其疾再無不作者萬

物生尅一定之理豈止於病目而言哉經謂五臟不和

卷之二

二

二

大者或伏而大者皆痰也眼皮及眼或如灰烟黑者亦痰也然治法痰因火動降火爲先火因氣逆順氣爲要亢則害承廼制者寒極則生熱熱極則生寒木極而似金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土也
左手寸口心與小腸之脉所出君火也左手關部肝與膽之脉所出風木也左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也右手寸口肺與大腸之脉所出燥金也右手關部脾與胃之脉所出濕土也右手尺部命門與三焦之脉所出相火也

六脉者浮沉遲數滑濇也浮者爲陽在表爲陽爲虛也沉者爲陰在裏爲濕爲實也沉遲者爲陰寒在臟也浮數者爲陽熱在腑也滑者血多氣盛也濇者氣滯血枯也

八要者。表裏虛實寒熱邪正也。表者病不在裏也。裏者病不在表也。虛者五虛也。脉細皮寒氣少泄利飲食不入也。漿粥入胃瀉止則生。實者五實也。脉盛皮熱腹脹前後不通。脅悶也。大小便通利而得汗者生。寒者臟腑積寒也。熱者臟腑積熱也。邪者外邪相干也。正者臟腑自病也。

內經謂目病赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病從內走外者少陰病太陽病宜溫之散之陽明病宜下之寒之少陽病宜和之少陰病宜清之。

保命集云。眼之爲病。在腑則爲表。當除風散熱。在臟則爲裏。當養血安神。暴發者爲表。易治。久病者爲裏。難療。按此論表裏之不同明矣。用以治病。如鼓應桴也。

靈樞顛狂篇云。目眥外決於面者爲銳眥。在內近鼻者爲內眥。上爲外眥。下爲內眥。

凡看目疾者。男子多患左目。女子多患右目。此陰陽氣血不同故也。或有左右無常者。乃邪熱攻迫故也。如男先傷左目。而右目屢發。定不可保。女先傷右目。而左目屢發。亦不能救。必須觀人老少壯弱爲主。少而壯者易治。老而弱者難治。易治者用藥溫和。難治者用藥滋補。隨

症用藥。不可執一目症雖有多端。然看者先將難易預定。用藥不致有悞。如瞳神凸凹者。不治。青綠白色者。不治。純黑者。不治。睛少光彩者。不治。此老人血衰之症。若翳障如半月之狀。俱難治之。若睛圓不損。不論星多少。翳厚薄。悉皆治之。翳怕光滑。星怕在瞳神。總宜翳膜輕薄。星點細小。若遇翳障未盡。切不可用刀割目得血。而能視。刀割則傷血。亦不可用火灸。翳膜生自肝火。又以火攻之。是以火濟火。豈是良法。惟服藥於先。必兼點藥。則病漸退。根除而不復發也。

按目病有外感有內傷。外感者風寒暑濕燥火。此標症也。

患者致目暴發疼痛白睛紅腫眵淚赤爛其勢雖急易治內傷者喜怒憂思悲恐驚此七情也患者致黑珠下陷或起蟹睛翳膜障朦或白珠不紅瞳神大小視物昏花內障不現其勢雖緩難治又有不內不外而飲食不節饑飽勞役所致當理脾胃爲主目病雖多不外風熱虛實之候治亦不離散清補瀉之法然補不可過用參朮以助其火惟用清和滋潤之類瀉不可過用硝黃龍膽以凝其血惟用發散消滯之類藥用當則目自愈今人治目往往非大補則驟用大寒多致受傷治目毋投寒劑固是要法又當省其致病之源以治之如貪酒者

徐徐戒其酒好色者。緩緩戒其色暴怒者。戛言戒其暴怒。不聽則難療也。然心生血。脾統血。肝藏血。血得熱則行。得寒則凝。凝則生翳。生膜。目斯患矣。不可不慎。凡病目後。宜滋腎水。何也。目以肝為主。肝開竅於目。目得血而能視。若滋腎水。則水能生木。木能生火。火能生土。土能生金。金能生水。生生不已。其益無窮。若腎水虧耗。則水不能生木。木不能生火。火不能生土。土不能生金。金不能生水。肝血虧而火妄熾。其害可勝言哉。

目不專重診脉說

夫目有是病。卽有是脉者。此亦大槩言之。其微渺未必皆

可恃乎脉也。如目病必視其目爲內障。爲外障。內障有內障之症。外障有外障之症。必辯其爲何症。所中所傷之淺深。果在何輪何廓。辯之明而後治之當。今閨閣處子。暨夫貴介之族。但舒手於帷幔之外。診其脉。卽欲治其病。且貴其用藥。當而効之速。不知卽方脉之專重乎脉者。尤望聞問居其先。而切脉居於後。蓋切而知之。僅謂之巧耳。况症之重者。關乎性命。而惟恃巧以中之。何輕視乎性命耶。必精詳審辯。而後治之可也。重性命者。當必以是言爲然也。初目爲五官之最要者哉。假令一瞽目。隱身於帷幔之中。如其手於帷幔之外。其六脉未嘗不與有目者相同也。切