

葉橘泉

近世內科
國醫處方集

中華民國二十五年一月初版
中華民國二十六年三月再版

近世
內科
國藥處方集
第一集傳染
病篇全兩冊

實售國幣壹元

外埠另加寄費壹角叁分

有 著 作 權
翻 印 必 究

著作者	吳興葉橘泉
鑑定者	北平施今墨
校正者	南京葉古紅
印刷者	上海家庭工業社
總發行處	蘇州鐵瓶巷
分售處	全國各大書局
及醫藥出版社	

吳興葉橘泉先生著

合理民間的單方

葉氏醫學叢書之二

本書爲著者二十年來研究藥學之結晶
係搜集古來經驗民間實用確有良效而
且極合學理的國藥單方一百則用近世
科學方法說明其所以奏效的藥理作用
公開秘傳陋習揭破藥效真相人人可以
按方自療爲最切實用之書

書用桃林紙精印袖珍本 美術紙面每冊五角

新聞紙印本每冊二角 寄費另加郵票九五折用

蘇州鐵瓶巷存濟醫廬發行

上册刊誤表

頁	行	字	正	誤
二(陳序)	四	十八	豁	谿
八(葉序)	八	九	付	村
九(郭序)	九	十四	戟	戰
九(郭序)	十八	十五	蓋	益
一五(張序)	六	十六	舊	奮
一六(李序)	十四	十八	科	料
二〇(凡例)	十二	十	君	居
二一(凡例)	十二	六七	求科	科求
四(原文)	十一	廿三	緩	縱

八

六

十七

織

識

二五

十七

二八

acid

acids

二六

十三

十四

續

續

二八

十七

大棗上少〔方解〕

下冊刊誤表

頁

行

字

正

誤

六八

八

化字下脫「道」字

八七

七

十九

末

未

八八

十五

草烏頭下脫「五靈脂」

九七

五

四

弄

美

九八

六

發字下脫「寒」字

九九

二十

十四

洩

洩

一〇〇

八

十六

筋

筋

一〇二

四

七

羹

羹

一〇四

十三

十一

熟

，

一〇六

五

十一

貓

描

一〇七至一一〇頁 頁邊均係「回歸熱」誤爲「瘧疾」

一二六

七

六

苓

岑

一二二

十

六

麝

麝

一二三

三

一

麝

麝

一二八

十九

十七

傳

傅

一三三

七

脫「黃柏六・〇」

一三五

十四

六

苓

苓

一三八

十

十五

痘

疫

一四六

九

三

蜜

蜜

一五五

二

二

癰

瀝

連珠多

其花葉有攻毒祛風作用。用於中風。溼痺。筋

脈拘急。麻風。

當歸

見前

(十七)

肺結核(肺癆)

(中醫稱肺癆)

〔病原〕

為結核桿菌

Bacillus Tuberculosis

所致之傳染病。該菌

略彎曲。染色後有時顯含球形。此則究係芽胞。抑或係空泡所致。尚

為一問題。至其傳染之路徑。大抵皆由呼吸道而侵入於肺。則為肺

結核。若由消化而受染者。則為腸結核。由腭扁桃直接受染。則成淋

巴腺及全身性結核。

〔病理〕

「肺結核」係結核菌由呼吸道染入。乘肺臟因感冒咳

嗽。或其他疾病等之弱點。而侵入肺之淋巴管。遂蔓延於四圍之組

組織致生乾酪樣變。結核之中央因菌或其毒素而細胞質凝死。或變透明質。因纖維質增加而成堅硬之組織。無論何種結核。必有此二種變。乾酪樣變者破壞可危。堅硬變者自限不佈。病最後之結果。全仗抵抗力如何。而轉移。有一種組織。結核桿菌一入即死。另有一種組織。該菌能屯居。多少致害。然自限不佈。終則因抵抗力增加而菌死。最壞之組織。却宜於該菌之孳生。有乾酪樣變而無硬變之限制。於是病日益增。菌日益多。不可收拾矣。

〔症狀〕 肺結核大概可分急性與慢性兩種。

急性肺結核。起病如跑馬癆。病起驟突。寒戰。體溫速升。脅旁作痛。咳嗽。痰中有鐵鏽色。與急性肺炎相似。病起後八至十日之間。所期望之肺炎病徵期。病勢更劇。溫度不規則。痰粘液膿性而色綠。

此為要徵。至第二星期時症狀頑梗。醫者或猶認係未退之肺炎。豈知症狀逐漸加重。而有肺軟化之理學徵狀。痰內有彈力性纖維及結核桿菌。其顯著明期最早者六日或十三日。大多數延至三月之久。更有病起驟突而且劇烈。後則症狀漸減而成慢性類者。慢性肺結核之症狀大概可分作三期論。(一)為結核發生期。(二)為結核軟化期。(三)為成窩期。惟此等解剖而分之病期。於臨床時所顯之症狀每不相符。茲為易以明瞭計。且論局部症狀。胸痛或早顯。或僅在咳嗽時覺之。咳嗽乃一最早之症狀。且本病多始終患之。初起時咳嗽聲而短。繼則鬆而頻。兼吐粘涎膿性痰。或咯血。及痰內間或帶血。呼吸困難。(氣促)發潮熱。下午或至九十九度半。甚至百度不定。更有起病時即發顯明之間歇熱者。熱降之時常兼出汗。

(盜汗)身體消瘦。若病勢進行則體重逐漸減輕。故稱身體之重量。即可知病勢之進行。當病之早期消瘦最速。每一星期內可減五六磅。迨至病勢停止進行及溫度低降則病者之體重逐漸增加。每星期增重兩磅。即係佳兆。喉常受累。或為聲音嘶嘶。或疼痛嚙時尤然。咳嗽作哮聲。或失音。或難嚙。精神易興奮。性神經更然。精力逐漸耗失。死時大概平靜無劇烈狀。精神至死不昏昧。

〔治法〕結核病之治療法。首在食物營養身體。以促進其抵抗力之增加。暨需要良好之空氣及環境。以怡悅其身心。其次則與以藥物作對症之施治。以減其痛苦而已。

處方一 千金補肺湯 五味子二。○桂枝三。○麥門冬

一〇。○大麥一二。○粳米一四。○桑白皮一二。○款冬花

一〇・〇 乾姜二・〇

右八味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應證 肺勞咳嗽氣促。痰涎稀薄。畏寒而體溫低落。古稱肺痿者。

〔方解〕 五味子為祛痰鎮欬藥。應用於肺癆喘息。及腸癆下利。有收斂性之強壯作用。對於盜汗及衰弱患者有效。

桂枝有健胃及強壯作用。能預防心臟衰弱。融和溫壯神經。活潑血行。治畏寒汗出。及咳嗽等症。

麥門冬為滋養性強壯藥。有祛痰鎮欬作用。用於虛勞咳嗽短氣。煩渴及肺痿吐膿血等症。

大麥為營養品食療藥。有健胃助消化之作用。因其內含蛋白質澱

粉麥芽糖等。故用於一切衰弱患者及結核病之兼現消化不良者有效。

粳米功效與大麥相似。

桑白皮為祛痰解熱清涼利尿藥。治虛勞客熱。喘息咳嗽。水腫腳氣等。

款冬花為鎮咳祛痰藥。對於咳嗽喘息。肺痿吐膿。肺癆久咳等症有特效。

乾姜為芳香性刺激藥。有健胃逐水祛痰鎮咳止嘔作用。治喘咳脹滿。痰涎稀薄。肺痿肺寒。痰飲上氣。畏寒等症。

處方二 補肺阿膠湯 阿膠一二。○馬兜鈴一○。○鼠

粘子一○。○杏仁一二。○甘草四。○糯米一五。○

右劉細作三百西西煎劑。去渣。後加入阿膠溶化。一日分三次溫服。
適應症 肺癆咳嗽咯血。咽痛聲嘶等。

〔方解〕 阿膠為滋養性強壯藥。含有生膠組織之軟骨膠質等。用
於出血性諸疾患。如咯血吐血。下血。婦人子宮出血等。有增加血液
之凝固及粘補血管之破裂等作用。對於肺癆咳血。不僅有止血之
功。抑且有潤肺之力。為陰虛肺癆治本之良藥。

馬兜鈴為祛痰鎮咳藥。治肺熱咳嗽喘促。及欬逆連連不止等症。其
性清涼。又能解毒除瘡。對於肺癆久咳。咽痛生瘡等有特效。

鼠粘子為清涼性解毒祛痰藥。專治氣管及咽喉諸病。如喉痺咽痛
生瘡。痰嗽肺熱喉痛。及一切腫毒斑疹等。

杏仁為鎮靜鎮咳藥。專治欬逆上氣。喘息煩滿。又能潤氣管利咽喉。

及消積化痰等作用。

甘草為粘滑性滋潤藥。能滋潤喉頭粘膜。緩和鎮靜效嗽。

糯米為粘和性滋養強壯藥。有滋潤呼吸氣管以奏緩和鎮效及粘補血管之功。能止肺癆久咳出血及咽喉乾燥等症。

處方三 百合固金湯 百合一二。○芍藥七。○甘草五

。○麥冬一二。○當歸一○。○地黃一四。○桔梗八。○貝

母一○。○玄參一二。○

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣濾清。一日分三次溫服。

適應症 結核性咽痛。肺癆久咳痰血。聲音嘶啞。喉頭乾燥粘

痰不易咯出者等。

〔方解〕 百合為滋養性強壯藥。有鎮效祛痰作用。

地黃為滋養強壯藥。善理血分。有清血補血。行血通經。利尿等作用。治婦人崩漏胎產。及男子五癆七傷。女子傷中胞漏。能逐血痺。增骨髓。長肌肉。利大小腸。解熱消痰。惡血止吐衄。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。因其內含安息香鞣酸及葡萄糖等。能緩和緊急。斂攝神經。平降血壓。又有收斂消炎作用。

當歸為清涼性通經藥。富含揮發性當歸油。有行血補血鎮痛鎮靜諸作用。治欬逆上氣。諸瘡。婦人崩中。月閉。男子虛癆血痺等。

桔梗為排膿祛痰藥。利咽喉。療口瘡。止欬逆。治下痢。癰疽。肺癰。胸脅滯痛等症。

貝母為祛痰鎮欬藥。治煩熱咳嗽。喉痺咽痛。肺癰肺痿。吐血。化痰消癭。瘰癧。瘰癧。

玄參為清涼性消炎藥。能利咽喉。清肺熱。消瘡腫。治骨蒸傳屍癆傷。寒溫瘧。心驚煩熱等。

甘草 麥冬 見前

處方四 人參養榮湯 人參四。○白朮六。○茯苓一二

。○甘草三。○乾姜二。○大棗四枚當歸六。○芍藥五。○

地黃一二。○桂枝三。○黃耆四。○遠志三。○橘皮四。○

五味子一。五

右十四味剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 肺癆。身體消瘦。倏寒倏熱。睡中盜汗。咳嗽咯痰不鬆。

或吐血貧血萎黃。行動氣喘。食後痞脹。或大便泄瀉。四肢疲軟衰弱無力等。