



東醫寶鑑外形篇卷之四上

醫患勤戛扈 聖功崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

手

手部度數

肩至肘長一尺七寸肘至腕長四寸腕至中指本節長四寸本節至無名指長四寸

半

臑

手領肩臑寸臂腕

項傍缺盆之上曰肩

肩

下臂上通

臂上接處曰肘

肘

卽

臂節也

肘

下掌上名曰臂

臂

臂有二骨

臂

下掌

上節處曰腕

又

曰掌

後曰腕

腕

腕有二骨

腕

者人之管

以趨上

者也

臚

手五指有名

一曰大指二曰鹽指三曰長指四曰無名指五曰小指

燭

四肢爲諸陽之本

內經曰四肢者諸陽之本

也陽盛則

四肢實又曰諸陽受氣於四肢也

手掌以候胃

靈樞曰掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中

寒魚上白肉有青血脉者胃中有寒

燭

胃中寒

則手

魚際之絡多青胃中有熱則魚際

之絡赤其暴黑者久留痺也

其有赤有黑者青者

寒熱氣也燭

大指本節後白肉際名曰魚以其

寒熱氣也燭

大指本節後白肉際名曰魚以其

形似魚也

有穴名魚際

燭

傷寒手心熱者邪在

裏也手背熱者邪在表也

手足溫

者陽證也

手足冷者陰證也

燭

四肢熱

黃帝曰人有四肢熱逢風寒如炙於火者何也

岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩

陽相得而陰氣虛水不能滅盛火而陽獨治

獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙於

獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙於

獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙於

獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙於

火者是人當  
肉爍也 繱

## 四肢不用

黃帝曰脾病而四肢不用何也岐伯對曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得

稟也今脾病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生

故不用焉繱

四肢解墮者脾精之不行也繱

帝曰人之蟬者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈

虛諸脈虛則筋脉解墮筋脉解墮則行陰用力而不能復故爲蟬蟬謂手足蟬曳也

帝曰脾寒

胃以膜相連而能爲之行其津液何也岐伯聚燄

失陰者脾也爲之行氣於三陰陽明者胃也

之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣於陽

胃行其津液也繱

脾實則四肢不舉內氣而

脾太過則令人四肢不舉是也此謂膏梁病

治宜瀉三化湯助胃承氣湯寒門選其事

若脾虛則四肢不用益脾病不能與胃行其津  
液其治宜補十全大補湯

此去邪留正

確

## 肩臂病因

靈樞曰肺心有邪其氣流於兩肘不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在

骨守骨在筋守筋

之痺多爲項睡臂痛

蓋熱在上焦不能清利故醣釀日久生痰涎聚飲

氣流走於項臂之間不腫不痛耳

搘

臂爲風寒

濕所博或睡後手在被外爲寒邪所襲遂令臂痛

或乳婦以臂枕兒傷於風寒亦致臂痛寒痛宜五

積散

方觀風痛宜烏藥順氣散

濕痛宜蠲脾湯

颶加蒼术酒

已醫氣血凝滯臂痛宜

薑黃散

舒筋散

風濕臂痛宜活絡湯

七情臂痛宜白

芥子湯

臂脾痛宜五靈脂散

折傷

後手足痛宜應痛元

治臂痛非風非疾蓋氣血滯也

薑黃三錢白

甘草各二分半右剉作一貼

## 薑黃散

治臂痛非風非疾蓋氣血滯也

薑黃三錢白

水煎服  
之脚

舒經湯

治血氣凝滯於經絡臂痛不舉薑黃二錢當歸海桐皮白术赤芍藥各一錢羌活甘草各

五分右剗作一貼薑三片同煎入沉香磨汁少許

服之

一名通氣飲子有人常患左臂痛不能

舉或以爲風以爲痰以爲濕諸藥鍼灸皆不效得此方而愈蓋氣血凝滯經絡不行所致

濟

活絡湯

治風濕臂痛羌活獨活川芎當歸甘草各一錢白朮二錢右剗作一貼薑五片煎服

白芥子散

治七情鬱結榮衛凝滯肩臂脾牽引作痛時發時止白芥子木鱉子各一兩沒藥

木香桂心各二錢半右爲

末每取一錢溫酒調下

麝

五靈脂散

治風寒濕氣血壅滯脾胃疼痛五靈脂荆芥穗防風羌活獨活穿山甲骨碎補草烏

製甘草節各五錢麝香半錢右  
爲末每二錢溫酒調臨睡服

### 應痛元

治折傷後爲風寒濕所侵手足疼痛生瘡

珠生草烏各二兩茴香一兩牛又將草烏剉爲麥  
大同連皮生薑四兩搗爛淹兩宿焙乾同前藥爲  
末酒糊和丸桐子大溫酒

下五十丸小麻無妨辨

### 痰飲多爲臂痛

凡人忽患脅背手脚腰胯隱痛不可忍  
連筋骨牽引鈎痛坐臥不寧時時走易

不定意謂是風證或疑是癱疽皆非也此乃痰涎  
伏在心膈土下變爲此疾

治臂痛不能舉或  
治臂痛不能舉或

左右時復轉移由伏痰在中腕停滯脾氣不能流  
行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不升故上行攻臂

其脈沉細者是也氣實者控涎丹麝兜最效宜用

牛硝九消痰茯苓丸

痰飲臂痛宜加減茯苓丸

九青活湯半夏茱萸湯

臂痛或麻木或戰掉皆

痰飲所作二陳湯

劑附觀吞下青州白丸子

數劑

半硝丸

治痰飲流注疼痛半夏二兩風化硝一兩右爲末薑汁糊和丸梧子大薑湯下五十丸

消痰茯苓丸

治痰飲流注臂痛不能舉時復轉移脉沉細半夏二兩赤茯苓一兩枳殼五錢

朴硝二錢半右爲末

薑汁糊和丸梧子大薑湯下

三十九丸無朴硝則以焰硝代之

有人爲痰飲所苦兩手戰掉痛不

能舉服此卽愈

效

加減茯苓丸

治濕痰壅滯經絡不通兩臂作痛不能梳洗半夏三兩以白礬皂角生薑各一

兩煎湯浸七日取用陳皮鹽水炒白芍藥酒炒黃

芪鹽水炒各二兩白茯苓一兩半朴硝一兩三錢

海桐皮酒洗薑黃木瓜各一兩薄桂甘草各五錢

右爲末薑汁竹瀝糊和丸梧子大四

錢

**芎活湯** 治水飲停住經絡發爲臂痛川芎半夏赤芍

荅獨活陳皮枳殼各一錢白朮甘草各五分

右判作一片水煎服效

**半夏茯苓湯**

治痰飲臂痛不能舉半夏蒼朮各一錢半片芩酒炒白朮南星炮香附子各七

分陳皮赤茯苓各五分威靈仙甘草各

三分右判作一片水煎服效

**臂痛有六道經絡**

當以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂臑之

前廉痛屬陽明經後廉痛屬太陽經外廉痛屬少陽經內廉痛屬厥陰經內前廉痛屬太陰經內後廉痛屬少陰經視其何經而用鍼藥治之也據

**風淫末疾**

詳見

結陽證

詳見浮腫

## 十指麻木

詳見皮部

## 肩臂骨脫臼

兩肩頭冷痛尤不可忍屢見將中風人臂骨脫臼不與肩相連接多有治不愈者要

知纔覺肩上冷痛必先炙肩髃等穴毋使至於此極可也

則令人骨節蹉跌宜導

痰湯敷兜加減用之

## 手循衣撮空摸牀

傷寒熱病之極手循衣撮空摸牀者凶產後血脫亦有此證

痺

拘人手

尋衣領及亂捻物者肝熱也手撮眉目鼻面者肺熱也

傷寒熱病尋衣撮空詳學上說作脾熱

風淫末疾此論雖然莫若斷之爲肺熱似爲愈矣

其人必譫語妄言經曰肺邪入心爲譫語兼上集

有痰肺必主之手經者上焦也此肺之體肝之用  
旺主血血者陰物也陰不能自動蓋肺主氣爲氣  
所鼓舞故靜者得動一者說肝之用二  
者說肺之體此天地互爲體用也

### 心虛手振

心虛手振見神門

酒客手振見內門

### 心虛手振

### 心虛手振

### 手爪占病

內經曰肺之合筋也其榮爪也

肺熱者色

### 手爪占病

蒼而爪枯疎

病人爪甲白者不治

病人

### 手爪占病

爪呈青者死

病人手足爪甲下肉黑

### 手爪占病

者八日死

病人手掌腫無文者死

偏

### 代指

代指者指頭先腫燬熱掣痛然後於爪甲邊結膿

破甚者爪甲俱脫

代指亦謂之天蛇頭瘡

### 代指

潰破甚者爪甲俱脫

天蛇頭瘡開口腫痛以雄黃入雞子內以患

指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒烟熏病指一二

### 指浸

其中一宿次早更以蜈蚣燒烟熏病指一二

指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒烟熏病指一二

指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒烟熏病指一二

### 好諸濃前浸

治代指蒲公英與蒼耳草等分爲末

蒲公英搗細水煮去滓

水煮去滓

服之溼食患處累效

冰指忽腫痛名爲代指

烟硝煎湯淋漬之又取烏枚核中仁爲末醋調成

膏入指漬之自愈

鉢又猪膽和蚯蚓搗爛敷之

又田螺生擣碎敷之

鉢生雞卵開一孔將指浸

之三個卽愈

瞞手足觸木惡刺及狐尿

刺腫痛蒲公英摘取自汁多塗立差

眼

## 手足皸裂

疽

冬月手足皸裂作痛豆用黃蠟膏臘亨膏貼

手足皸裂取生薑汁紅糟白鹽臘猪脂

同研爛炒熱擦入皸肉一時雖痛少頃卽安

瞞

冬月手涉凌凍面目手足皸裂血出作痛猪腦髓

着熱酒中以洗之差

鉢又凡腦髓生塗之雀腦髓亦可

髓亦可鉢又百沸湯洗後油髮灰敷之卽安

白芨末水調塗

之亦效

糊

## 黃蠟膏

治冬月手足皸裂作痛清油五錢漫火煎沸大黃蠟一塊再煎候熔入胡粉五倍子末各

少許熬令紫色爲度先以熱湯洗患處火上焙乾  
用藥敷上以紙貼之其痛立止入水亦不落爛

單方

凡十種

羌活

治四肢節痛煎

防風

治四肢拘攣煎

細辛

治手足拘急或煎服

蒼耳子

主四肢拘攣痛取二兩炒搗末水一升半煎至半去滓呷服

天麻

蒸熟食或生食並佳

淫羊藿

治四肢不仁水煎服並佳

**地膚皮** 主手足煩渴水煮服日三鉢

**桑枝茶**

療臂痛可常飲之有人療兩臂痛百藥不效服此卽愈瞬

**五倍子**

治手足皺裂牛腦髓填封卽愈搗爲末調

**松脂**

療代指入蠟熔化候

**醬清**

溫治手指裂痛和蜜

**鹿髓脂**

酒主四肢不隨和

**馬糞**

治毒熱攻手足腫痛欲脫水煮馬糞取汁溫洗之鉢

**虎骨酒**

治臂脛痛不計深淺皆放虎脛骨熬黃擣末二兩羚羊角屑一兩白芍藥剉二兩右以好

鍼炙法

靈樞曰

手太陽之脈病

肩似拔

臑似折

手少

陽之脈病

肩臑

皆痛小指次指

不用手少

陰之脈病

不用

手太陽之脈病

肩似拔

臑似折

手少陰之脈病

肩

臂內

後廉痛

腋掌中熱

手太陰之脈病

肩

厥陰之脈病

手心熱肘臂攀急腋腫

手太陰之脈病

脉病

腋臂內前廉痛

腋掌中熱

手少陰之脈病

腋臂內後廉痛

腋掌中熱

隨其經鍼炙之

肩

髓係

兩手之安否

頸

五指拘攀

取三間

前谷

腋

兩手攀急偏

臂

不可動臂

枯

取大陵

腋

肘攀筋急

取尺澤

腋

肩不可動臂

不可舉

取肩髃

巨骨清冷

淵闊衝

腋

臂攀急

取曲池

手上廉

合谷

腋

痺

取肩

臑

手三里

外閣

肩井

曲池

手上廉

合谷

腋

肘

痛

手可屈伸

取天井

尺澤

腋

臂攀急

取肘醪

腋

肘臂脫痛

前谷

液門

中者

腋

臂攀急

取肘醪

腋

臂攀急

取腋窩

腋

谷

後谿

綱

腕痛

取陽谿

曲池

腕骨

腋

臂攀急

取腋窩

肩取井  
支翻講

足

足部度數

靈樞

曰橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半

內輔

下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地

長三寸膝膕以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下

至地長三寸 醉樞以下至膝中長一尺九寸膝

以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三

寸京骨以下至地長一寸 兩醉之間

廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半翻

足領髀股膝膕腨胫腔膝

膝上曰髀膝上骨曰髀骨髀骨與骻骨接處曰醉樞骻多骻內

曰股髀外曰腿腿下胫上接處曰膝膝之蓋骨曰

蹠膝下曰胫一名曰髀膝之下骨曰骱骨骱骨之

外骨曰輔骨脛之後魚腹曰腨 一云足肚曰腨腫  
下跗上接處曰腕腕骨曰踝 鍼 足通謂之脚脚  
者却也以其坐時却在後也翻

## 脉法

脚氣之脉其狀有四浮弦爲風濡弱濕氣遲濇因  
寒洪數熱鬱蹶 微滑者虛牢堅者實脈 脚氣  
之脉浮爲風緊爲寒緩細爲濕洪數爲熱又曰沉  
而弦者爲風沉而緊者爲寒沉細爲濕沉數爲熱  
旺 脾脉緩甚爲痿厥蹶 尺脉虛弱緩濇而緊  
病爲足痛或痿病蹶 瘦脉多浮而大柯 診人  
之痿蹙其脉虛者

生緊急疾者死

經外

## 厥有寒熱

王太僕云厥者氣道上也世謬傳爲脚氣內

經曰寒厥者手足寒也熱厥者手足熱也蓋

陽衰於下則爲寒厥陰衰於下則爲熱厥陰陽之氣不相接續則爲厥

厥證多以不勝乘其所