

外科正宗
八七

色建公

今改昌瑞



重訂外科正宗自錄

卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法燒灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病王治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五 附癰疽諸症瘡各十條

卷之四

腦疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

瘰癧論十九

鬚疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癰瘡論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六 附乳岩

附骨疽論二十七 附鶴膝風

腸癰論二十八

臍毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

腎癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

疔發四十一

癰疽四十二

小腹痛四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

翻花瘡四十

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癰風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

瘡癰六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合公毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血瘰七十一

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

臙瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘰癧瘡八十八

卷之十一

疥癩八十九

痰包九十

癩風九十一

溼腫九十二

咬傷九十三

風犬瘡九十四

女人面生鰐黑斑九十五

鈕叩風九十六

枯筋箭九十七

婦人腳了作癢九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

黑子一百一

眼胞腫毒一百二

體氣一百三

白赤癢一百四

奶癬一百五

蟻拱頭一百六

小兒遺毒爛斑一百七

蟻蛄串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬疳一百十一

重舌一百十二

胎瘤一百十三

鵝口瘡一百十四

痘癰一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躑一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

腹痛一百二十三

陰虱一百二十四

葡萄疫一百二十五

百蟲入耳一百二十六

蟬蟲叮咬一百二十七

人面瘡一百二十八

誤吞針鐵骨哽咽喉一百二十九

中砒毒一百三十

落頭須拿法一百三十一

救自刎斷喉法一百三十二

陰毒一百三十三

失榮症一百三十四

試知百病死生法一百三十五

造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論二百三十七

拾遺症一百三十八

唇風一百三十九

綳縛皆瘡一百四十

癰疽肉不合一百四十一

煉元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金頂砒法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法二百四十八

製寒食麵法一百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

咒神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼收針形一百五十六
汗斑方一百五十七

重訂外利正宗卷之七

乳癰論第二十六明乳岩

夫乳病者乳房陽明胃經所司乳頭厥陰肝經所屬乳子之母不
調養以致胃汁濁而壅滯爲膿又有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫
起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛疼甚宜牛蒡子湯主之厚味飲
暴怒肝火妄動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝思慮傷脾
想在心所願不得志者致經絡痞滯聚結成核初如豆大漸若
棋子半年一年二載三載不決不瘳漸漸而大始生疼痛痛則
解日後腫如堆栗或如覆碗紫色氣穢漸漸潰爛深者如岩穴
者若泛濫疼痛連心出血則臭其時五臟俱衰四大不救名曰乳
岩見犯此者百人百必死如此症知覺若早只可清肝解鬱湯
益氣養榮湯患者再加清心靜養無忌無碍服藥調理只可苟延

歲月若中年已後無夫之婦得此死更允速故曰夫乃婦之天也
惟初生核時急用艾灸核頂待次日起但挑破用拔針針入四分
用水蠅散條補入核內糊紙封蓋至十三日其核自落用玉紅膏
生肌斂口再當保養不致又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男
損肝腎蓋怒火房慾過度以此肝虛血燥腎虛精怯血脉不得上
行肝筋無以榮養遂結腫痛治當八珍湯加山梔牡丹皮口乾作
渴者加減八味丸腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補湯
懷孕之婦乳疾曰內吹因胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫宜石
膏散清之亦可消散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流
出其口難完有此者純用補托生肌其口亦易完矣

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口微疼者順已成掀腫破熱

痰痛有時一囊結腫下侵別囊者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸
西邊作癢生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易
者順初起一乳通腫木痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不
不紅堅硬如石口乾不眠胸痞食少者逆已潰無膿正頭腐爛腫
愈高痛勢愈盛流血者死潰後肉色紫黑痛苦連心凝氣日深形
曰削者死

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脈浮數邪在表宜散之發熱益寒惡
嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬
微痛者宜疎肝行氣已成掀腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜托重
消毒膿已成而脹痛者宜急開之又脾胃虛弱更兼補托潰而不斂
膿水清稀腫痛不消疼痛不止大補氣血結核不知疼痛久而漸大

破後惟流污水養血清肝

乳癰治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作以人參敗毒散一劑表症已退又以牛蒡子湯二服腫消漸漸而安

一婦人憂思過度久鬱成癆左乳結核如桃年年似痛非痛咳嗽生痰身發潮熱診之脈微數而無力此真氣雖弱而邪火尚未有餘如用藥合理亦堪調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而咳嗽漸止寒熱間作又以八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠志十餘服身熱去其八九又以益氣養榮湯加青皮木香兩月餘其胸膈得利暖氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化瘡膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼痛腫如覆碗診之脈數有力此有餘症欲作膿也以

托裏消毒散數服而脹痛卽針之出膿碗許又以十全大補湯加香附十餘服而安

一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲二服疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑腫痛反作形體日弱予診之脉浮數而無力此屬真氣虛而邪氣實也非補不可以益氣養榮湯四五服其腫始高寒熱亦退又十餘服而膿潰兼以十全大補湯兩月而痊此非純補之功其疾豈能得愈

一男子年過五旬因妻喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脉弦數先以小柴胡湯加青皮山梔遠志貝母數服而肝脉稍平又以八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐爲膿更服益氣養榮湯庶保收斂彼爲內醫所惑謂鬱怒傷肝肝經有火不必用補更服降火流氣寬中散劑致食少便秘發熱作渴復請予治肝

脉復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而為燥為熱已上俱內損症也辭不治後月餘果死

一婦人左乳結核三年方生腫痛診之脉緊數而有力此陽有餘而陰不足也况結腫如石皮肉紫色不澤此乳岩症也辭不治又一婦左乳結腫或大或軟或硬俱不為痛已半年餘方發腫如覆碗堅硬木痛近乳頭壘壘遍生疙瘩時痛時癢診之脉弦而數腫反慘黑不澤此氣血已死辭不可治又一婦已潰腫如泛蓮流血不禁辭後果俱死

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯瓜蒌仁黃芩連翹柴胡粉

跟花山梔甘草陳青皮牛子角針平

治乳癰乳疔結腫疼痛母論新久但未成膿服

陳皮

牛蒡子

山梔

金銀花

甘草

瓜蒌仁

黃芩

天花粉

連翹

角針各一錢

柴胡

青皮

水二鍾煎八分入酒一杯和勻食遠服

橘葉散

橘葉散內有柴陳石青黃芩連翹等

川芎山梔青皮迎甘草加之效有也

治婦人有孕胎熱為內吹有見啞乳名外吹致乳結成腫痛寒交作甚者惡心嘔吐並服之

柴胡

陳皮

川芎

山梔

青皮

石膏

黃芩

連翹

各一錢五分

甘草二十

水二鍾煎八分食遠服

清肝解鬱湯

青肝解鬱湯陳芍青皮生附併蘇葉

桔半芎歸貝決神通草山梔遠志評

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久激作瘰或胸膈不利體倦怠面色痿黃飲食減少

陳皮

白芍

川芎

當歸

生地

半夏

香附各八分 青皮

遠志

茯神

貝母

蘇葉

桔梗各六分 甘草

山梔

木通各四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

鹿角散

鹿角散効獨稱雄每服三錢酒調下

消乳專於建大功能殺腫痛永無踪

治乳癰新起結腫疼痛增寒發熱但未成俱効鹿角尖三寸用炭火內煨稍紅存性碾末每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再一服必消

四乳四物湯

四乳四物湯最靈加上麥芽能散乳

芎歸白芍熟地星更消腫脹得和平

治產婦無兒啞乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

川芎

當歸

白芍

熟地各二錢

麥芽

二兩炒為齋末

水三鍾煎八分食遠服用腳布束緊兩乳以手按揉其腫自然消散甚者再用一服