

晉江儒醫伍喬年先生遺著

知醫西吟

診脈歌

口鼻一呼吸。脈來四五跳。此是無病者。平和氣血調。三至為遲候。六至作數教。遲則寒之象。數則熱之標。一二寒愈盛。七八熱更饒。

知醫吟

知醫吟

萬病能醫數頁書。如何臟腑何方除。

數頁書。豈能療乎。蓋其有綱。張之。病總由臟腑。總不外虛實熱寒。審知其為何臟。何腑之虛。症實。症熱。症寒。症。而聯其病類。以集之。則藥歸同路。瘥一病。可瘥千萬病。亦無不可。

診脈歌

病人雙腕仰。高骨定為關。

依掌後之高骨。定為關脈。

寸脈量虎口。尺脈準臂彎。

關前距虎口一寸。故曰寸。關後距臂彎一尺。故曰尺。

寸。關後距臂彎一尺。故曰尺。

左寸心胞絡。左關膽與肝。左尺司何職。膀胱腎係焉。右

寸胸中肺。胃脾屬右關。要知大腸腎。右尺自昭然。

輕舉得皮面。表邪脈故浮。若是病在裏。重取須沈求。洪長徵實健。細弱

識虛柔。水濕并痰飲。滑利又弦道。緊促氣內亂。伏瀕氣凝留。妊娠中止

三

代失血中空孔代脈中止口只此尚易見其他渺以幽

數止曰促緩止曰結至數不差曰代

舌色

舌色能知症顯然尖心中主胃脾焉

舌者心之竅凡病俱現於舌舌尖主心舌中主脾胃舌根主腎舌邊主肝肺右邊主肺

舌根主腎邊肝肺內病外形舌敷前

肝肺左肝右肺

不渴有津熱屬表白苔厚膩胃邪傳

口不燥渴雖或發熱尚屬表症若舌苔粗白漸厚而膩是寒邪入胃接濁濕而欲化火此時已不

濕將化火不知味解表微溫葱豉煎

辨滋味辛溫解表法

厚膩轉黃已化火苦辛解表杏苓連

厚膩轉黃色邪已化火

黑苔裏熱膏知主燥裂宜加冬粉天

失治變黑或黑而燥裂胃火甚也涼解裏熱法清熱保津法

苔退底紅津液涸救陰沙斛地冬鮮

至厚苔漸退而舌底紅色大灼水虧也或風動癰癰以上表邪之傳裏者也或神昏譫語

以上表邪傳裏與春溫變症相同故摘錄其一至五方歌

試觀脾胃虛寒者潤白面唇痿白

無苔白潤甚者連唇口面色痿白。

泄瀉火衰或受濕四君桂附補其偏

四君薑棗湯以振之虛甚欲脫者加桂附。

薄黃脾熱黃芩對心熱赤芒竹捲蓮

若舌中苔黃而薄為脾熱舌尖赤起芒刺為心熱舌邊赤起芒刺為肝熱。

肝熱赤芒梔子膽厚黃胃熱斛參玄

舌中苔厚而黃胃微熱也。

厚而黑燥胃大熱將爛牙牀唇黑沿

連牙牀唇口俱黑胃將爛矣。

大劑膏黃諸科露焚焦救沃命斯全

生石膏三四兩生大黃一兩金汁銀花露生地二冬大劑救之。

疹癍時疫曾親見十四斤膏效力專

治一熱極者先後用生石膏十四斤而癍始透病始退。

更有黑而潤澤者無苔紅紫絳如澱

再有舌黑而潤澤者或滿舌紫紅色而無苔者此名絳舌俱屬腎虛更有絳舌如鏡舌底

底乾不飲鏡光亮腎涸地黃大劑煎

地天冬麥冬六味地黃等投之。

望聞問切

望者看形色也。聞者聽聲音也。問者訪病情也。切者診六脈也。四事本不可缺一而惟望與聞為最要。何也。蓋聞聲一道。不過審其音之低響。以定虛實。而切脈一道。不過辨其浮沈。以定表裏。達數以定寒熱。強弱以定虛實。其他胸中了了。指下難明。且時大時小。忽浮忽沈。六脈亦難定準。故醫家謂據脈定証。是欺人之論也。惟細問病情。則先知病之來歷。細問近狀。則又知病之淺深。而望其部位之色。望其唇舌之色。望其大小便之色。病情已得八九矣。而再切其脈。合諸兩向所求。果相符否。稍有疑義。則默思其故。而兩相形。虛其寒相形。寒其熱相形。表其裏相形。其中自有把握之處。即可斷定。慎斯術也。以往其無所失矣。

聞詳低響頗堪推。切脈如神事似欺。診病先從望問審。淺深來歷問孜孜。舌唇部位溺尿色。望得病情八九知。脈切未符思厥故。相形斷定可無差。

表裏虛實寒熱辨

良醫救世辨陰陽。虛實熱寒表裏彰。

表嗽熱寒頭痛涕。脈浮不渴舌如常。

裏潮惡熱腹疼燥。便澀脈沈舌則黃。

口燥

鼻涕塞

凡人之病。不外乎陰陽。而陰陽之分。總不離乎表裏。虛實寒熱。六字盡之。夫裏為陰。表為陽。虛為陰。實為陽。寒為陰。熱為陽。良醫之救人。不過能辨此陰陽而已。庸醫之殺人。不過錯認此陰陽而已。

虛弱汗多氣短悸按心脈細畏肢涼

體弱驚悸手按心腹四肢畏冷脈來無力

實狂不卧躁無汗拒按腹疼脈勢強

脈實有力

寒冷舌唇溺俱白脈遲喜熱便尤澀

手足冷唇舌俱白不渴喜飲熱湯大便澀

熱乾唇舌目紅渴脈數喜涼便結腸

舌乾唇燥舌赤目紅口渴喜冷煩燥溺短便秘

寒裏與虛陰病是病陽熱實表同行

以上皆陰陽之分也至按邪盛正衰陰虛火亢等則又有陰中之陽陽中之陰其間毫釐千里命在反掌辨之者安得而不慎

正虛邪盛陰陽亢千里毫釐慎審詳

表治

表宜發散忌寬消頭痛風寒發熱標

咳嗽涕清或鼻塞辛溫解表汗和調

確有風寒方可用辛溫藥

裏治

裏要歸經發表危熱寒虛實辨無遺。

七情之裏症之最難治者但寬其心而藥始效

虛治

虛分氣血補虛宜雙補十全大補之。
血地枸烏歸芍鼈氣參芪木附薑芪。

實治

實治以瀉速為功。心有火邪肺有風。
脾有食蟲痞濕熱肝腸包絡各能叢。

食積蟲痞濕熱

寒治

寒看表裏治從溫。表惡風寒蘇杏門。
裏喜熱湯木朴夏。誤投寒藥命難存。

熱治

熱治涼中虛實分。實因內外火將焚。

火微銀竹翹冬斛。火甚苓連白虎云。

火極大黃龍膽等。外邪內鬱解其紛。

口脣脈不渴紅數。外熱陽虛主四君。

目舌頭如乾絳痛。陰虛晡熱地黃員。

表治裏治虛治實治寒治熱治四

和醫公

虛火之症。或陽虛外熱。口不渴。脣不紅。脈不數。宜四君子湯以補其陽。

若陰虛內熱。目或乾。舌或絳。頭或痛。過午便熱。宜四物湯。或地黃湯以補其陰。

內傷外感雜治

前言表裏虛實寒熱六字。病已盡在其中矣。而表裏之中。又有內傷外感之治法。內傷者裏症也。而有氣血痰鬱四字之公。外感者表症也。而有風寒暑濕燥火六字之別。再詳其治法。皆無餘蘊矣。

虛實熱寒表裏明感傷表裏未全情

也。而有風寒暑濕燥火六字之別。再詳其治法。皆無餘蘊矣。

感風寒暑濕燥火傷氣血痰鬱再呈

氣虛者四君子湯。

氣乏四君湯以補實香蘇飲滯胃平

若氣實而滯者宜香蘇飲平胃散。

血虛四物補其血實痛手拈血壅行

若血實而凝者宜手拈散。

痰少二陳君子六靈頑小半滾痰征

若頑痰膠固變生怪症或停飲隔間宜滾痰丸。

鬱鬱輕越鞠道遙可膨腫便關神佑迎

若五鬱互結腹膨腫滿二便不通宜神祐丸承氣湯之類。此氣血痰鬱四者內傷之治也。

風中曰真中不輕傷寒中腑治毋更

非表治中之偶感也。有中腑中臟中血脈之殊。中腑者與傷寒同。太陽用加味香蘇飲。陽明用葛根湯。

太香陽萬少柴主中臟什昏痰鋸鳴

少陽用小柴胡湯。中臟者眩仆昏冒痰涎如鋸。內有熱風寒風二種。熱閉先用搐鼻散。以半

熱閉^{胎風}牛黃搐鼻類使關三化^甘化縱橫

胎風散黃丸灌之便結脹用三化湯冷脫則汗珠頭搖以附子理中丸急救之或三生飲中風十也

冷看珠汗頭搖脫附子理中飲三生

冷脫則汗珠頭搖以附子理中湯急救之或三生飲

62血脈喎斜半不遂大秦薑竹鉤陳并

血脈者口眼喎斜半身不遂大秦薑竹鉤陳并薑汁鉤陳以上風一也

21寒治亦與傷寒等表散裏溫兩路兵

寒在表則與風之中府治同合裏用附子理中湯法詳傷寒論此寒二也

A2暑淺益元散已足暑深消暑起昏醒

暑輕者但煩渴益元散足矣暑重者汗喘昏醒消暑丸灌之

兼寒四味香薷飲受濕藿香亂反正

暑天受濕而霍亂藿香正氣散主之乾霍亂吐瀉不得名攪腸痧痧飲入口即敗危症也陳香圓煎湯救之以上暑三也

乾亂攪腸痧症險香圓經久煮湯攪

煎湯救之以上暑三也

濕黃身重平胃散黃疸茵陳目溺橙

黃疸則目共溺色黃如橘茵陳大黃湯茵陳五苓散茵陳薑湯若發腫五苓散五皮飲若滲

入絡背肩臂作痛秦艽蠲痹濕寒成

入筋絡背肩臂痛用秦艽天麻湯蠲痹湯治風寒濕成痹

腫由水蓄皮苓五氣化胃和去滿盈

以上濕四也五苓散化氣利水五皮飲和胃行水

燥渴鼻咽舌目火便關乾熱色皆煩

燥症惟秋冬時久晴有之而吃鴉片者更易犯其症口渴鼻乾咽痛舌燥目火便秘乾熱不宜發表

多因晴久或煙癖五汁沙元冬地生

宜用生地天冬麥冬花柳沙參元參歸身梨藕蔗汁之類以潤之以上燥五也

大本詳於熱治內審其臟腑無偏傾

此火二也

猝然昏倒風類中寒痛濕痰火竅絛

然中寒則暴痛中濕則昏倒中火則竅閉中暑則猝倒皆能猝然昏倒非中風而似中風謂

暑則猝昏分別治概歸真中是問旨

之類中勿概作中風治以上風寒暑濕燥火六者外感之治也

痰塞

傷寒脈論

周氏曰傷寒一書後漢張機所著發明內經奧旨啟萬世之章程為醫門之秘訣其文信屈其義宏元其方簡峭而警闢托跡昭潭容舍清潤竊舉茅廬

誦讀時所心得者擇要成篇余因而順為韻語以便記誦

傷寒一日巨陽時經受風先證桂枝

一日日次也不以日數拘巨陽太陽也太陽經也膀胱腑也經脈從顛絡腦抵腰受謂受其邪也

浮緩惡寒頭項痛鼻鳴熱汗惡風遲

稍遲時即鼻鳴而熱有汗惡風不以病名病而以藥名病者重乎其藥也

倘如消渴溺難利衛分膀胱五苓之

邪入膀胱腑之衛分矣五苓散主之

經先寒受麻黃證浮緊體疼寒嘔而

其中寒也經先受其寒麻黃証脈浮而緊體痛（統頭痛身疼腰痛骨節疼痛言）嘔逆而惡寒

少頃惡風熱喘滿汗無亦與桂枝差

無汗麻黃証有汗桂枝証

如狂腹結膀胱腑營分桃仁承氣宜

倘如狂（痰熱沖心）而小腹急結（痰熱不行）邪入膀胱腑之營分矣桃仁承氣湯主之

煩燥風寒經兩中大青龍主鬱蒸施

寒鬱於外熱蒸於內陰陽攻擊

風寒兩中腑乾嘔主小青龍加減支

小便不利心下有水氣乾嘔或兼汗兼渴兼噎兼喘

中風經症桂枝湯

中風腑症五苓散

中寒經症麻黃湯

中寒腑症桃仁承氣湯

風寒兩中經症大青龙湯

風寒兩中腑症小青龙湯

受邪二日屬陽明鼻額外循目系行

陽明經也胃腑也經脈起鼻額循鼻外繫目系

浮大渴煩鼻目痛不眠白虎治其經

脈浮而大煩渴目痛鼻乾不得眠者陽明經病也治以白虎湯

譫潮腹滿脈浮實便硬胃家承氣清。

脈浮而實潮熱譫語腹滿大便鞭者胃家腑病也治以三承氣湯。

類聚三陽明作牢太明不苦衣無更。

三陽類聚而牢之者陽明太陽陽明不更衣而無所苦太陽陽明脈浮而濡麻仁脾約丸。

少陽陽明時煩燥以法下之相病情。

少陽陽明時煩燥而大便難相胃家虛實加減下。

轉屬三陰明雜見腹疼大實太陰并。

陽明雜見太陰桂枝大黃湯。

水乾土燥少陰混滑厥厥陰明與爭。

陽明少陰急下之陽明厥陰脈滑而厥裏有熱白虎湯。

陽明經症

白虎湯時錢仲陽葛根湯葛根升麻白芷炙甘草大棗生薑。

陽明腑症

三承氣湯。

陽明太陽

麻仁脾約丸。

陽明少陽

以法下之。

陽明太陰桂枝大黃湯

陽明少陰急下之

陽明厥陰白虎湯

或用桂黃或急下或湯白虎要權衡

三日少陽經邪蒙脇疼胸滿耳又聾

腑邪口苦目眩也嘔逆熱皆膽上冲

脈大變弦熱轉瘧陰陽之界小柴通

變而有辨逆而痛湯主黃連寒熱融

少陽經也。膽腑也。經脈循脇絡耳。邪犯經。胸滿脇痛而耳聾。邪犯腑。口苦。膽熱上蒸。目眩。膽熱上蒸。嘔逆。膽熱上冲。脈之大者。變而為弦。症之熱者。轉而似瘧。居陰陽之界。半表半裏。通陰通陽。無汗下之方。禁汗禁下。邪正相持。進退互持。小柴胡湯為和解少陽之統劑。而其變則有辨焉者。嘔逆（膽熱）而腹痛（胃寒）黃連湯公理陰陽。

嘔吐滿煩表裏鬱膜通火下大承充

嘔吐而滿煩（胸下硬滿胃寒）煩替熱（大柴胡湯表裏雙清表裏）

少陽症

小柴胡湯 黃連湯 大柴胡湯 乾薑花粉黃芩牡蠣炙草

備錄少陽症方胸脇微結小便不利柴胡桂枝

四日陽邪入太陰脈來尺與寸皆沈

太陰經也脾臟也經脈循胃中絡於嗌邪入陰分經臟齊病陰陽變化之妙有不見其朕兆陽邪入陰

腹滿吐食兼自利症辨熱寒宜細心

尺寸皆沈

時痛有寒實痛熱理中九與桂黃尋

有腹滿時痛之寒症（理中丸）有腹滿實痛之熱症（桂枝湯加大黃）

有寒吐緩熱即吐寒理蓋連熱吐甚

有得食緩吐之寒症（理中丸通治）有得食即吐之熱症（乾薑黃連湯）

不渴當溫穢當下理中承氣症分臨

有自利不渴當溫之寒症（理中丸通治）有自利腐穢當下之熱症（大承氣湯）

轉移寒熱從形質直中傳經豈古箴

蓋人之形有厚薄氣有盛衰臟有本寒本熱無從賦稟以為轉移必以直中為寒傳經為