



東醫寶鑑雜病篇卷之九

東醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君許公教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有在在在腸者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸也

半死

小腸三日死腸兩頭見者連連之先以鐵

縷如法

連續之斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣

泄即推

納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以

漬納之

且作粥稍稍飲之二十餘日乃吃糜粥

百日後

乃可進飯○金瘡失血其人當苦渴然

須忍之

常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不

得交飲

粥則血溢出血殺人又忌嗔怒及大言笑

動作勞

力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發

甚者即死。凡金瘡及折傷不可

飲冷水。血見寒則凝。人心即死。

不治證

十不治證。凡破傷入於肺者縱未即死。二七

難過。

左脇下傷透內者。

腸傷斷一半可

醫全斷不可治。

小腹下傷內者。證候繁多者。

○脉不實重者。○老人左股壓碎者。○傷破陰子

者。○血出盡者。○着內耳後傷透於內者。皆不必

用藥。○凡金瘡傷天窓欲省角腦後臂裏跳脉

脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑俞

皆死處。又破腦出髓而不能語。戴眼直視。喉中沸

聲。口急。唾出兩手

妄舉。皆不治。

金瘡脉候

金瘡出血太多。其脉虛細者。生數實者。死。

不止。脉來大者。七日死。滑細者。生。○金瘡出血

虛細。則宜實。大則碩。○傷雖淺。命脉虛促。可慮。

傷至重命脈和緩永無慮也。血出甚者脉不要洪大只要平正重實。

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者

白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之腸子則以清油擦活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮需皮開用藥糝待生肉。○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散。○與服用手擘去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘。○

金瘡先宜調血

大凡金瘡及折傷墜墮內損者必有瘀血停積先宜遂去瘀血若亡血過多則調養氣血為主。

散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用。○

止血生肌合瘡藥

傷至重者海味中鹹白鰓成片鋪在傷處以帛托定血立止。○

血收口方白膠香老松皮白芷血竭爲末付之單
血竭末付之尤妙○黃丹滑石末付之夏月以薄
荷葉貼之一日一次以藥水湯洗爛○金湯散糝
付神效○金瘡血不止黃丹白礬爲末慘之又
下子蚕蛾燒灰付之○下蚕室瘡不合取所割
勢火煨爲末酒調服昔有一人自割其勢瘡久不
合用此方不
數日而愈○

箭鏃及金刃中骨脉不出

白歛半夏等分爲末每取
一錢淡薑湯調服日三至

二十日自出○箭鏃及鍼入肉不出家牙屑和
水塗其上又蠅蚋取汁頻塗又鼠腦塗之又加磁
石着其上
自出○

救急方

金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納
其人於牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭

未醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿
體氣貫胸膈悶絕者亦甦○傷重暈絕不省人
熱尿多灌卽甦
童尿尤好研

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷
續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各

等分右爲末每三錢溫
酒調服日三立驗

花蕊石散

治一切金刀所傷及打撲損傷牛馬咬踢
或至死者急於傷處糝藥其血化爲黃水

再服藥便活更不疼痛如臟腑有瘀血內損煩悶
欲死服此藥則化爲黃水或吐出或下泄出花葉
石四兩硫黃一兩爲末入瓦罐內鹽泥固濟曬乾
安四方博上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取
出研細每取一大匙童
尿入酒煎熱調服

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五

錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱

酒調下過數時無效再用一服以下惡血為度燭

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二七粒研右剉

作一貼酒煎雞鳴時服次日

下瘀血即愈治折傷亦妙

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅鬱欲死大黃一兩當歸二錢牛麝香少許右為末每三錢

熱酒調

下

破血消痛方

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡另研三錢柴胡連翹

當歸梢各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一

錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作一貼酒

水相半煎去滓入蛭麝
調服空心而貼立愈疎

復元活血湯

治同上 大黃二錢半 當歸一錢七分 柴胡一錢半 穿山甲炒 研瓜蒌根 甘草各

一錢 桃仁十箇 爲泥 紅花五分

右判作一貼 酒水相半煎服 竈

金湯散

治一切金瘡 重午日早朝使四人各出四方

採草木莖葉各半把 至日午時人石灰一斤 同搗極爛 鑿大桑木三兩 株作孔 納藥實 築以桑

皮蔽之 油調石灰密塗之 勿令泄氣 更以桑皮填 固至九月九日午時取出 陰乾百 日 搗羅爲末 如遇傷慘之神效 藥

單方

凡二十 四種

新汲水

人被金鎗及損傷腸出以新汲 泉水噴之令身噤腸自入也 韃

石灰

療金瘡甚良人爲金刃所傷以石灰末裹之定痛止血神效○又石灰和雞子白火燃爲末付

瘡立差

葛根

療金瘡止痛爲末付之又濃煎取汁服之

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐安金藏剖腹用此法便愈○神仙刀箭藥妙

不可言桑葉爲末乾炒之○

金瘡

止痛桑柴灰付之佳

韃

蝮蛇

箭鏃在咽喉胸膈不出蝮蛇搗取汁滴上三五度自出○鍼入肉不出蝮蛇腦同硫黃研付覺

痒鍼自出

韃

蟻娘

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蟻娘同研勻塗傷處待極痒便憾動拔之立出後以生肌膏貼

之○出箭鏃方蜣蜋全者麝香少許
同為末搗動箭頭膠藥瘡內自出

旋菑根

即旋花根也合金瘡續斷筋取
根搗汁滴瘡中滓封瘡上妙

象牙

主箭鏃及鍼入肉不出為末和
木付瘡上即出舊牙梳尤佳

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和
水服令一日服盡當下如水乃血消也

黑虱

主箭頭入肉不出取頭上黑虱
及人牙齒同研塗之即出

葱

治金瘡因驚出血不止取葱炙熱按取汁付之血
即止○金瘡中風水腫痛葱莖葉煨研罾付立愈

乾

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓
令極冷使人含嚙瘡上又嚙其背腸漸自入勿

金匱要略
卷之六
見衆人

見衆人

石榴花

治金瘡血不止石榴花和石
灰搗爲末糝之血便斷

壁錢

主金瘡血不止取
汁點瘡上良

鼠腦肝

治箭鏃及鍼刀在咽喉胸膈諸隱處
不出取生鼠腦及肝搗付之卽出

紫檀香

治金瘡急刮紫檀香末付
之止血止痛至妙

血竭

療金瘡止血止痛生肌最妙刮
屑付之但性急不可多用

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之○中弩
箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙

蛇含草

主金瘡搗付之佳○又云
蛇含膏連已斷之指

青蒿

生援付金瘡止血
止痛生肌最妙

熱艾

搗金瘡止血止痛易合
或煎湯或熏烟亦好

小薊

主金瘡血不止
援葉封之

藍葉汁

金瘡血悶取
藍汁飲之

車脂

鍼入肉不出取車軋脂攤紙上
罨之二日一換三五次自出

擗撲墮落壓倒傷

凡墮落死者急安好處以神掩其口
鼻上一食頃候眼開先與熱小便飲

之若初覺氣絕急擊開口以熱小便灌之利去瘀
血

○卒墮損壓倒打死心頭溫者皆可救將本
人如僧打坐令一人將其頭髮控放低以半夏末

或皂角末吹入鼻內如活却以薑汁香油打勻灌

之。○若取藥不及急，按開口以熱小便多灌之。
○人爲刀斧所傷，或墮落險地，或撲身體損傷，
筋骨皮肉皆出血不止，或瘀血停積，若去之不早，
則有入腹攻心之患。○跌撲傷損，須用蘇木活
血，黃連降火，白木和中，以童便煎服，妙傷在上宜
飲韭汁。○凡顛打壓傷，或從高墮落，皆驚動四
肢五臟，必有惡血在內，專怕惡心，先用通二便藥
和童便服之，立效。大小腸俱通利，則自無煩悶攻
心之患矣。○凡傷損專主血論，肝主血，不問何
經所傷，惡血必歸於肝，流於脇，鬱於腹，而作脹痛。
實者下之宜，通導散桃仁承氣湯，勦奪命散，助
上虛者復元活血湯，坊見當歸鬚散，調之。○見
出血已多而又嘔血不止者，難治。宜用蘇木煎湯
調蚌霜散服之。○諸傷疼痛，宜乳香定痛散，乳
香散雙烏散，尋痛元陣王丹，補損當歸散，蘇
合香丸，治打撲墮落，挾驚悸氣血錯亂，昏迷不省。

急取三五丸溫酒童便調灌卽甦防覬窺門○頭上有傷或打破或金刃傷用藥糊絹縛不使傷風

頻之

通導散

治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此

仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右判作一貼水煎空心服○一名大成湯

當歸鬚散

治打撲損傷致氣凝血結胸腹脇痛當歸尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一

錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右判作一貼酒水相半煎服

蚌霜散

治傷損大吐血蚌粉甘草霜各等分右爲末每二錢糯米飲調服

乳香定痛散

治諸傷損疼痛白芷當歸生丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白末甘草各等

分右爲末每二錢溫酒重便各半調
勻服之〇一名活血止痛散

乳香散

治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷
桂皮乳香沒藥甘草各等分右爲末每二錢

溫酒調

下

雙鳥散

治諸傷百損久後時常疼痛者及新被傷作
痛亦宜川烏草烏略炮各三錢當歸白芍藥

蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右

爲末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痒無害但草

烏生用恐太猛

所以略炮

尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用
乳香火熨沒藥火熨五靈脂各三錢生麝香

少許右爲末酒糊丸如指頭大硃砂

爲衣每一丸薄荷湯薑汁磨化服

陣王丹 治諸折傷止血定痛 大黃一兩 石灰六兩 同炒紫色為度 去火毒 搗篩為末 敷傷處 妙

補損當歸散 治墮撲折傷疼痛 川芎一兩 半桂心 川

椒當歸甘草各七錢 半附子炮澤蘭各二錢 半右為末 每二錢溫酒調服 效如神 崩

打撲傷消腫滅癥 凡鬪毆被打成破傷風頭面腫大

汗外用杏仁搗爛入白麩少許新汲水調付瘡上 腫即消 輒○治傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼

上青黑不散大黃為末生薑汁調付患處即消 各

將軍膏 醫 ○

被毆癥痕亦治跌撲麻油清酒各

一杯同煎數沸服之服了臥火燒熱地上一夜痛 止腫消無痕有被傷者仇家陰令術士以此治之

次日驗審了無一毫傷痕翻○打撲傷肌膚青腫

茄子種通黃極大者切作片瓦上焙乾為末臨卧

酒調二錢服一

夜消盡無痕

脉侯及不治證

凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者

多脉當虛細若得急疾大數者死○打撲傷損去血過

損筋骨者可治內損臟腑裏膜及破陰子耳後者

並不治續和叶不入論證○如傷臟腑致命處一觀其脉虛促危矣

單方

凡十

蒲黃

治撲損瘀血在內煩悶蒲黃末三錢熱酒調下

白楊樹皮

治撲損瘀血痛不可忍取樹皮酒漬服之