

醫統正脈全書

活法機要目錄

泄瀉門

黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃耆湯

防風芍藥湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

訶子散

漿水散

黃連湯

芍藥黃連湯

導氣湯

加減平胃散

地榆芍藥湯

厲風證

樺皮散

二聖散

破傷風證

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

防風湯

蜈蚣散

左龍湯

羌活湯

養血當歸地黃湯

頭風證

消風散

泄青丸

雷頭風證

升麻湯

胎產證

黃龍湯

二黃散

半夏湯

增損柴胡湯

秦艽湯

荆芥散

防風湯

三分散

血風湯

血運血結四物湯

沒藥散

加減四物湯

四物湯

紅花散

崩

當歸散

惡物不下

生地黃散

吐血

麥門冬飲子

血衄

頭風證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘡證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子

金花丸

涼膈散

當歸承氣湯

牛黃膏

熱入
血室

白虎湯

眼證

散熱飲子

地黃湯

四物龍膽湯

點眼藥

洗眼藥

嚙藥

消渴證

黃連膏

八味丸

腫脹證

水腫方

瘡瘍證

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃耆湯

內消升麻湯

復元通氣散

五香湯

赤芍藥散

桃紅散

冰霜散

火燒

乳香散

杖瘡

五黃散

火燒

花藥石散

截疳散

生肌散

平肌散

碧霞挺子

用藥加減例

迴瘡金銀花散

雄黃散

療癰證

桑椹膏

連翹湯

瞿麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸

黑地黃丸

八味丸

地黃丸

吐證

桔梗湯

木香散

厚樸丸

心痛證

金鈴子散

煮黃丸

厚樸丸

藁本湯

朮附湯

疝證

酒煮當歸丸

苦練丸

活法機要

江陰朱氏校刊本

元 丹溪朱震亨著

泄痢證

臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多
故曰暴泄非陰久泄非陽洩而便膿血知氣行而血
止也宜大黃湯下之是爲重劑黃芩芍藥是爲輕劑
治法宜補宜泄宜止宜和和則芍藥湯止則訶子湯
有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難喘
息脈微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也後重則宜

下腹痛則宜和身重者除濕脈弦者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之驚澹爲痢當溫之在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂破血則黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂茯苓下焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去

濕白朮茯苓芍藥三味水煎服如發熱惡寒腹不痛
加黃芩爲主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也
加黃連爲主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥
如見血加黃連爲主桂當歸佐之如煩燥或先便白
膿後血或發熱或惡寒非黃連不能止上部血也如
惡寒脈沉或白腰痛或血臍下痛非黃芩不能止此
中部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不能止下
部血也唯脈浮大者不可下

黃芩芍藥湯

方在寶鑑
泄痢條下

大黃湯 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者

大黃 一兩

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯和之以徹其毒也

芍藥湯

方在寶鑑內痢疾條下

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮 一兩

黃耆 七錢

甘草 三錢

一方無黃

耆用黃芩 半兩

右咬咀均作三服水煎服清

防風芍藥湯 治泄痢飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭

痛微汗

防風

芍藥

黃芩 各一兩

右咬咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿

困弱無力不欲飲食暴洩無數水穀不化宜此和之

白朮

芍藥

各一兩

甘草

半兩

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯

治痢疾痛甚者

蒼朮

二兩

芍藥

一兩

黃芩

肉桂

各半兩

右剉每服一兩水煎

訶子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

訶子皮

一兩生熟各半

木香

半兩

黃連

炙甘草

各三錢

右爲細末每服二錢以白朮藥

湯調下如止之不

已宜歸而送之也 訶子散內加厚樸一兩竭其邪氣也

漿水散 治暴泄如水周身汗出身上盡冷脈微而弱

氣少不能語甚者加吐此謂急病

半夏

二兩
易洗

附子

炮

乾生薑

炙甘草

肉桂

各半
兩

良薑

二錢
半

右爲細末每服三五錢漿水二盞煎至半和滓熱服

黃連湯

治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連

當歸

各半
兩

炙甘草

二錢
半