

印刷品

道光乙巳年金陵胡保安堂輯刊

濟世良方

刷印時留餘紙以備存心選擇者遇有
效驗良方便於書首各類之上登記

板存粵東省城
西湖街以文堂

濟世良方卷伍目錄

保嬰論

保嬰經驗方

回氣法

初生不啼法

硃蜜法

抵口法

斷臍法

裹臍法

臍風方

撮口方

白膜裹舌方

浴兒法

初生血皮

方 疳肚

不尿方

不乳方

吐乳方

乳兒法

哺兒方

月內胎驚

夜啼

日啼不止

護兒法

養子真訣

清上散

仙傳方

痰喘方

齁喘方

失音不語

舌瘡方

牙疳方

犀角解毒飲

丹瘤方

盤腸氣痛方

臍內潰爛方

陰癩方

脫肛方

受寒吐瀉方

中惡卒死方

瘧疾方

青黃散

受暑方

禿瘡二方

梅瘡方

耳邊腮腫方

熱瘡方

黃金餅

小兒初

生七日各症方

竹衣乖方

蓐瘡方

走馬牙疳

初起方

小兒胎毒爛

頭方

頭上黃水瘡方

胎毒夏天瘡

疥方

胎毒瘡疥外

洗方

黃膿白

泡遍身痛癢方

小兒疳積五方

小兒消積方

導蟲方

小兒面黃生

蟲方

小兒小便白濁方

肥兒藥方

肥兒餅方

三朝七日

不飲乳方

小兒瘕氣方

小兒夜發鷄

盲方

望月散

小兒夜啼方

小兒哮喘方

小兒脫肛大腸出方 小兒疳積神方 小兒胎毒方 小兒生癩經驗方

慈幼編 小兒剃頭方 小兒爛頭胎毒方 小兒斷臍帶方

生癩方 小兒鎖喉方 急慢驚風火穴方 小兒夜啼方

五虎丹 諸蟲積方 小兒肚痛積痛方 頭上胎毒禿瘡濕潮方

孩兒勞方 小兒赤遊風胎毒方 赤遊內服末 小兒諸病方

胎毒如癬禿頭濕瘡方 小兒驚風症辨 鎮驚散 急慢驚風兩歌訣

千金散 驚風初起方 神效散 神仙一粒金丹

驚風啼哭方 驚後瞳斜方 驚癇方 急驚慢驚慢脾等風方

童氏千金保命散 紫金錠 秘傳至寶丹 七氣散

齊上夏方 卷五日錄

吳春山稀痘方

又二方

小兒急慢驚風方
小兒驚風身熱方

驚風貼臍方

小兒鎮驚丸

驚風痰熱仙方
驚風失語方

小兒保和丸

又方

應驗七厘散
驚癇及夜啼方

痘症喫臍帶法

初生解毒方

稀痘方
保嬰靈丹

浴兒免痘方

萬金丹

復生丸
痘疔方

痘入眼方

黑靨方

痘潰難靨方
痘毒二方

痘疔方

小兒初出痘方

神方
小兒痘入眼起膜方

不出痘秘方

又方
痘瘡壞症方

小兒痧疹不出方
小兒各種火丹

小兒夜啼不止狀若鬼祟方

二方
痘後餘毒方
解毒護童膏

闕痧

痧疹治法

小無比散

大無比散

痘瘡入目方

痘後生瘡方

痘毒方

疳症歌

集聖丸

奇驗方

疳痢歌

疳症遇仙丹

布袋丸

疳症方

肥兒丸

疳症眼積翳障方

疳症壞目方

淨府湯

千金消癖丸

尅堅膏

抓癖膏

治癖驗方

又治癖方

濟世良方卷伍

保嬰論

嬰兒性命關係全賴初生時乳母保護得宜一失其則生死頃刻醫莫措手容可忽乎卽如後患驚疳瘵痢等症亦莫不由調養失節所致及至臨病驚惶醫藥無效而父母終不知其病之由來誠可歎也。今峻窓下徧集古仙聖所錄保嬰要訣畧纂一二刊刻濟世惟冀爲人父者嘗於閑時講求使乳母稔知一一如法保攝免致兒患驚虞其間所遇不測雖有天數而保之得宜庶幾慈幼一

道不無少補焉爾

保嬰經驗方

回氣法 小兒初生氣欲絕不能啼者必是臨產或冒寒所致急

以綿裹抱懷中未可斷臍將臍帶且置炭火上烘之仍作大紙

條蘸芝麻油點着于臍帶上往來遍燎之使火氣入臍內則臍

中溫暖更用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴

斷臍切記 一方用石菖蒲搗生汁入口即活

赤水玄珠

初生不啼看是肛門為脂皮所塞用簪通開

保生碎事

初生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看喉間懸瘡前腭

上有一泡。用指摘破。以帛拭去惡血。勿令嚙下。卽能通聲吞乳。

硃密法

初生時先用甘草

一錢二分

黃連

二錢五分

煎汁拭口吐其惡汁

稍定更與硃密安神定。其法用好硃砂一大豆許細研水飛

過煉蜜一蜆殼許和硃砂成膏。旋抹口中。非獨鎮心安神亦解

惡毒。若面色青白。啼聲不響。卽不須服。

葛氏方

抵口法 嬰兒在胎口有熱物。蓋胎毒也。生下啼聲未出。急用軟

帛或綿裹指拭盡。貴在神速。遲則嚙下。伏之于心。遇天行時氣

久熱。乘心心得熱而散。流溢于胃。胃主肌肉。發出于外。成瘡疹

之毒。世之小兒無可免者。不知病源在此。若依此法。庶可免矣。

斷臍法 兒出胎洗後方斷臍帶。則不傷水生病。斷臍須將汁令

盡。否則寒濕入腹。或作臍風。又須于近臍四五寸處。以綿紮緊。

以帛包裹。以口齧斷。蓋紮緊則兒血不貫于胞衣。自然痿縮。弗

脹而易下。卽或延緩數日。亦無大害。口咬則斷臍不犯乎刀剪。

自無冷氣內侵。可免腹中弔痛之虞。如或天時寒冷難產。母子

勞傷者。先紮臍帶。以油紙撚點火燒斷。令煖氣入兒腹中。此又

爲同生起死之妙法。近用蘄艾灸臍亦妙。所留臍帶不可太長。

太長則難乾而傷肌。且恐引外風爲臍風。亦不可太短。太短則

逼內而傷臟。或致成腹痛而夜啼。只以兒之足掌爲度。

產家要訣

繆仲淳云兒初生不可剪臍帶。三朝用麩和水成薄餅。置兒腹穿

臍帶于麩上。將艾火炙臍帶。近臍處或三五炷。須下帳避風。灸

畢仍將臍帶紮好。聽其自落。至七日方脫者。元氣足也。廣筆記

凡兒生下。每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內。如齒邊有白

點。卽以指爪或細針挑破。取桑樹內汁瀝清塗之。永無驚風撮

口之患。慈幼外編

裹臍法 裹臍須令自練。搽軟方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。

緩急得中。急則令兒吐。不可輕解。解時閉戶下帳。冬間用火令

帳內溫煖。仍以溫粉敷之。若臍不乾。或用枯礬五錢龍骨黃丹各一

錢麝香少許為末敷之。亂髮燒灰敷之亦可。或黃蘗末敷妙。千金論

臍風 張煥論云小兒斷臍後宜用厚帛裹護。若乳母不慎或因

浴水入或兒尿糊中未換。濕氣所侵。或當風解視。七日內遂有

此疾。令兒臍腫多啼。面赤喘急。不能乳哺。即成臍風。用艾燒灰

填臍中愈。簡中方

撮口 撮口之症。必先大便熱。須用生犀角及真羚羊角磨和蜜

汁飲之有效。急則用大黃甘草各二錢煎服。繆仲淳方

初生七日內面赤喘急啼聲不出。即名撮口。臍風看齒齦上有小

泡如粟米狀。急以溫水蘸青軟帛裹指擦破。即愈。方用白殭

蚕四枚炒為末。蜜調敷唇內即好。保生碎事

白膜裹舌 兒生白膜裹舌。刮出血。以白礬少許敷之。否則發驚。

若初生百日內口中生白點無數。抵之則去。少刻復有口角流。

涎。日夜啼哭不乳。又名鵝口白屑。皆由胎熱。或母貪嗜酒麵。遺。

熱于兒。用甘草黃連各一錢煎濃。以帛裹手指口中拭去。再不。

復發。又法用黃丹為細末。竹瀝調塗口中洗之。其白點即落。

一日洗三次。再以辰砂益元散燈心湯調下。神效。赤水玄珠

浴兒法 第三朝洗兒用五枝湯極妙。五枝湯者桑槐榆柳桃。

是也。各取嫩細枝二三十節煎湯。看冷熱入猪胆汁洗之。週歲。

內可免瘡疥毒又可避惡邪

赤水 玄珠

初生血皮

赤色有紅筋因受胎未足也

早白稻粳米粉撲之肌膚自生

聖濟方

初生鑽肚

由胎下熱毒結于肛門生下遂致閉塞

急令婦人溫湯漱淨口吸啞兒之

前後心手足心并臍心共七處每處吸啞五七口以輕粉五分

蜜少許溫水化開時時與少許以通為度

全幼心鑑

不尿

亦由胎熱

大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分四服即通不

飲乳者即飲乳若臍四圍有青黑色及口撮者不可救也

用母羊角

燒存性

酒下立效

保生碎事

不乳 新產小兒或剪刀股裏緊吃乳不下用獨郎大蒜切薄片

放在兩腮以艾炙之如哭即好不哭無救。懷德堂抄本

吐乳 白蔻 砂仁 各十粒 生炙甘草 各二錢 為末常摻入兒口中即

止 若直出不停留者炒麥芽 三錢 橘紅 一錢 丁香 三分 水煎服立止。

危氏得效方

乳兒法 凡乳兒不可過飽滿而溢則成嘔吐太飽以空乳吮之。

即消初乳須常捏去宿乳夏天不去熱乳令兒嘔逆冬天不去

冷乳令兒咳痢母與兒臥以臂枕之令乳與頭平則兒不噎母

欲寐即奪其乳恐睡熟則不知飽足而成嘔吐也 母有娠乳

兒必患胎黃母大醉乳兒必患驚熱母傷飽乳兒必患喘急母

新房乳兒必患消瘦。母大怒。乳兒必患癩狂。母新吐。乳兒必患虛瀛。夏天盛熱時。乳母浴後。卽與兒乳。使兒熱毒成痢。必須熟揉良久。方可乳兒。願願經

哺兒方 乳者妳也。哺者食也。乳後不得與食。哺後不復與乳。乳

食相併。難以克化。大則成癖。小則成積。疴氣自此始矣。或云

小兒無傷乳法。卽乳滿而溢。爲害尙淺。惟與食相併。則乳裹食不化。遂結成痰癖。是傷食。非傷乳也。故小兒以乳爲主。三歲後方可食糕粥。五歲外方可食葷腥。則一生永無脾胃之疾。而孫

真人葛氏巢氏聖濟經皆云。三日卽當用哺。以助穀神。導腸胃。