

名醫類案

十二卷

胎毒

胎暈

臍風

腎縮

咯血

熱症

寒症

癰為潮熱

汗併盜汗

吐瀉

驚搐

驚回

慢驚

腹脹

腹痛

嗽喘

嗽痛

赤丹

斑疹

痰癆

癰積

黃胆疸

口瘡

喫泥

痘瘡

疹瘡

嗜卧

異症

湯火金瘡

食忌

丹毒

中毒

脾風

疳積

走馬牙疳

名醫類案卷第十二

新都篁南江瓘集一後學

仁和余錢塘魏之琇王橫
重校
仁和沈鮑廷博以文

胎毒

東陽陳叔山小男二歲得疾下利常先啼日以羸困問華佗
佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時
愈佗與四物女宛丸十日即除三國志

東垣云一人中年以來得一子一歲之後身生紅絲癰不救
後四子至一二歲皆病癰而死問何緣致此翌日思之謂

曰。汝乃腎中伏火。精中多有紅絲。以氣相傳。故生子有此疾。俗名胎癰是也。汝試觀之。果如其言。遂以滋腎丸數服。以瀉腎中火。邪補真陰之不足。忌酒肉辛熱之物。其妻以六味地黃丸養其陰。血受胎五月之後。以黃芩白朮作散。與五六服。後生子前症不作。

丹溪治一兒。二歲滿頭有瘡。一日瘡忽自平。遂患痰喘。詢其母。孕時喜食辛辣熱物。視其子精神昏倦。受病特深。知其爲胎毒也。解利藥大非所宜。遂以人參連翹黃連生甘草。陳皮川芎白朮木通濃煎入竹瀝與之。數日而安。一婦形瘦性急。身本有熱。懷妊三月。適夏暑。口渴思水。時發

小熱遂教以四物湯加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡痍遍身忽一日其瘡頓愈遂成疹癰此亦胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

一女得癰遇陰雨則作遇驚亦作口吐涎沫聲如羊鳴此胎受驚也其病深痼須調半年可安仍須淡味以助藥力與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減果半年而愈

一人連年病瘡後生一子三月病左脇下陽明少陽之間生一癰甫平右腋下相對又一癰膿水淋漓幾死醫以四物湯敗毒散數倍加入參以香附爲佐犀角爲使大料乳母

三月而愈。踰三月忽腹脹生赤疹如霞片。取剪刀草汁調原蠶砂敷隨消。又半月移脹入囊爲腫。黃瑩裂開。二九顯露水出。以紫蘇葉盛桴炭末托旬餘而合。

一子年十六生。七箇月得淋病。五七日必一作。其發則大痛。水道方行。下如漆和粟者。一盞方定。脉之輕則瀉。重則弦。視其形瘦而長。青而蒼。意其父必服固下部藥。遺熱在胎。畱於子之命門。而然遂以紫雪和黃栢末丸。梧子大。曬極乾。湯下百丸。半日又下二百丸。食壓之。又半日痛大作。連腰腹。水道乃行。下漆和粟者。碗許痛減十之八。後與陳皮一兩。桔梗木通各半兩。又下合許而安。父得燥熱尚能病。

子。況母得之者乎。

一小兒胎受熱毒生下兩目不開燈心黃連秦皮木賊棗各五錢水一盞煎澄清頻洗而開。

程仁甫治一兒一歲之內大便三四日只通一次每次通時腹脹盛此乃胎毒熱結所致用元明粉米飲調下一錢三五次之後再不復秘矣。

薛已治少叅史南湖孫乙未生丙申正月陰囊赤腫薛作胎毒治之而瘥後患發熱痰盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉小便赤澁兩眼瞶動投參朮之類不應或以爲慢驚欲用附子之

藥請薛議視其寅卯關脉亦此風熱傷脾用柴胡清肝散加
釣鉤藤木賊草一劑卽愈至丁酉正月初旬頸患熱毒潰
而膿出感風發熱翌日頭面黯腫如斗大兩耳厚寸許此
風熱上攻血得熱而然急砭兩額出黑血二盞許次砭面
額亦如之隨用清熱化毒湯腫黯十退七八翌日又砭各
處血不甚黑乃止仍用前藥去牛蒡子加熟地黃而愈此
症若砭緩則血凝滯或爲破傷風皆致死

劉欽天之子腿如霞遊走不定先以麻油塗患處砭出惡血
其毒卽散用九味解毒散一劑而安

一小兒患之外勢雖輕內苦便閉此患在臟也服大連翹飲

數神功散而瘥。

胎暈

江篁南治一兒產數日。常昏暈。一日五六見。醫作驚風治。不效。江以大補氣血之劑。濃煎湯喂之。并飲乳母。多服漸減而愈。

臍風

樞密孫公抃生子數日。患臍風。已不救。家人乃盛以盤合。將送諸江道。遇老嫗曰。兒可活。即與俱歸。以艾灸臍下。即活。

江應宿曰。凡兒臍風。須看牙齦有水泡點如粟粒。以銀針挑破。出汚血。或黃膿少許而愈。

又一法。以熱水蘸綿子。包指擦之。輕挖破。以金頭蜈蚣炙未敷之。仍以厚衣包裹。納母懷中。取大汗出而愈。再服歸命散解之。

近來江南臍風之症最多。蓋由赤子落臍之時。不慎照顧。風邪流入心脾。五七日而發。面青口撮。吐白沫。倉卒急迫。失救。遂致夭折。急用蒜一兩。搗捏作餅子。納于臍上。以艾火灸五七壯。以拔出風邪。仍用艾茸。或綿子如

錢大一塊。貼於臍上。外以膏藥封之。兼行前二法為妙。

必有青筋。發在腹。有二道。生又以艾灸。絕截住。又頭稍遲。則上行攻心而死。

撮口臍風

方

生川烏尖三個為末。全足蜈蚣半條。酒浸。炙為末。加麝香少許。吹鼻得嚏。乃以薄荷

湯灌一匙。

腎縮

思村王氏之子。生七日。兩腎縮。一醫云。硫黃、茱萸、研大蒜塗。

其腹。仍以萵草、蛇牀子薰之。愈。蓋初受寒氣而然也。錄瑣碎

咯血

錢氏治段齊郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔
梗湯及防已丸治之不效其涎上攻吐喘不止錢用礬銀
丸一大服下之復以補肺散治之醫曰今咯血肺虛何以
下之曰肺雖咯血有熱故也久則虛癯今涎上潮而吐當
下其涎若使不吐涎爲甚便也蓋吐涎能虛又生驚也痰
實上攻亦使發搐故依法只宜下痰後補脾肺必涎止而
吐愈若先補其肺爲逆先下其痰爲順先下後補爲良也

熱症

錢仲陽治朱氏

一兒五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤面唇

紅煩燥引飲。遂用牛黃丸三服。以一物瀉心湯下之。來日
不愈。反加無力而不能食。又下之。便利黃沫。錢曰。心經虛
而留熱在內。必被攻藥下之。致此虛勞之病也。先用白朮
散。生胃中津液。後以生犀散治之。宜參連並用朱曰。大便黃沫
如何。曰。胃氣正。則瀉自止。此虛熱也。朱曰。醫用瀉心湯。如
何。錢曰。瀉心湯者。黃連一物耳。性寒多服。則利能寒脾胃
也。諸醫皆曰。實熱何以瀉心湯下之。不安。又加面黃頰赤。五
心煩躁。不食而引飲。醫曰。既虛熱。何以大便黃沫。錢笑曰。
便黃沫者。服瀉心湯多也。因與胡黃連丸而愈。

鄭人齊郎中子。忽臟熱。自取青金膏三服。併一服而餌之。至

三更瀉五行。其子困睡。齊言子睡中多驚。又與青金膏一服。又利三行。加口乾而身熱。齊言尚有微熱未盡。又與青金膏一服。其妻曰。用藥十餘行。未安。恐生他病。錢曰。已成虛羸。先多煎白朮散。時時服之。後服香薷丸。十三日愈。

朱氏子五歲。夜發熱。曉卽如故。醫有作傷寒治者。有作熱治者。以涼藥解之。不愈。其候多涎而喜睡。他醫以鐵粉丸下。涎其病益甚。至五日大引飲。錢曰。不可下之。乃取白朮散一兩煎藥汁。三升。使任意取足服。朱曰。飲多不作瀉否。錢曰。無生水不能作瀉。縱多不足怪也。但不可下耳。朱曰。先治何病。錢曰。止瀉治痰。退熱清神。此藥是也。至晚服盡。錢

視之曰。更可服三升。又煎白朮散三升。服盡得稍愈。至第三日。又服白朮散三升。其子不渴無涎。又投阿膠散二服而安。

一見感冷。身大熱。惡寒。此有表症。用發汗藥。汗出遂涼。過一日復熱。醫謂表解裏未解。驗之。服四順飲子。利動臍府。一行遂涼。隔一日。又復熱。醫云。經熱未解。驗之。小便赤。故知心熱未解。服生氣湯。遂涼。過二日。又熱。醫云。脉已和。非病也。既發汗。又利大小便。其兒已虛。陽氣無所歸。皆見於表。所以身熱。以和胃氣藥。如六神散之類。加烏梅煎。令微覺有酸味。收歸其陽氣。自此全愈。

此表裏俱虛氣不歸元而陽浮于外所以再發熱非熱症也。

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀角龍麝生牛黃治之一月不愈其症喘嗽悶亂飲水不止全不能食錢用史君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚未效錢曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈七分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺胡不虛也。

程明祐治一兒病日晡時熱衆皆以爲陰虛火動法不治程

診之曰兒氣方息日以生陰固無緣虛也火之動食飲積胃蘊蒸宿結則隆隆而熱遂宜洩輸瀉之其病忽已

薛已治李閣老子潮熱飲食如故自申酉

膀胱腎

時甚至子丑

時方止遍身似疥

肺主皮毛

大便秘結小便赤澁熱渴飲冷薛

以爲脾胃實熱傳於肺與大腸先用清涼飲四劑結熱始退又用四物柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速效另用槐角丸之類諸症益甚仍以前藥更加桃仁赤芍至百劑而愈

江篁南治一兒生方兩月時值酷暑又久雨溼令流行遍身大熱然初生小兒腸胃脆窄藥難區處乃取乾壁土春碎

撒地上。上以芭蕉葉鋪之。將兒臥葉上。又以芭蕉葉覆之。更少加乾壁土。干土睡少時。其熱如失。

寒症

東垣治一小兒二歲時。初冬患大寒症。明堂青脉。額上青黑。腦後青絡高起。舌上白滑。喉鳴而喘。大便微青。耳尖冷。目中常淚下。仍多收胸中不利。臥而多驚。無搐則寒。以黃柏、陳皮、葛根、連翹、蠅稍、炙草。以上各一分。升麻、黃芪、柴胡各二分。歸身、麻黃各三分。吳萸、生地黃各五分。名曰補陽湯。咬咀都作一服。水一大盞半。煎至六分。乳食後熱服。服後