

傷寒懸解

四本十四卷二  
八種共十六本

傷寒懸解卷三

昌邑黃元御坤載書

太陽經上篇 五十三章

太陽本病

太陽以寒水主令。統領六經。膀胱者太陽之府。太陽者膀胱之經。六經之次。三陰在裏。三陽在表。太陽主皮毛之分。次則陽明。次則少陽。次則太陰。少陰厥陰總以太陽爲主。陽盛於外。在外之陽謂之衛氣。衛者衛外而爲固也。衛氣之內則爲營血。營者營運而不息也。營司於肝。爲衛之根。

衛司於肺爲營之葉營衛二氣化於中宮飲食入胃游溢  
精氣傳輸經絡精專者行於脈中命曰營氣慄慄者行於  
脈外命曰衛氣營衛分司於金木而皆統於太陽故太陽  
經病有傷衛傷營之不同衛氣爲陽營血爲陰然血升而  
化神魂是陰含陽也故肝血溫煖而升散氣降而化精魄  
是陽含陰也故肺氣清涼而降歛人之汗孔冬闔而夏開  
者以肝心主營木火旺於春夏則營血溫散而竅開肺腎  
主衛金水旺於秋冬則衛氣清歛而竅闔寒去溫來而木  
火不得發泄衛氣歛閉而孔竅常闔襲之以風氣欲歛而

不能斂。故傷在衛氣。熱退涼生。而金水不得斂藏。營血發散。而孔竅常開。侵之以寒。血欲散而不能散。故傷在營血。風傷衛者。因於氣涼而竅閉也。寒傷營者。因於天溫而竅開也。春夏而竅開。則病寒而不病風。秋冬而竅闔。則病風而不病寒。故秋冬寒盛而非不中風。春夏風多而亦有傷寒。靈樞歲露四時八風之中人也。故有寒暑。寒則皮膚急而腠理閉。暑則皮膚緩而腠理開。因其開也。其入深。其病人也。卒以暴。因其閉也。其入淺。其病人也。徐以遲。開則傷營。閉則傷衛。以營深而衛淺也。風性疏泄。而寒性閉塞。氣

性收歛而血性發揚。衛歛而竅閉。中風則氣欲歛而風泄之。是以有汗。風愈泄而氣愈欲歛。故內遏營血而生裏熱。營泄而竅開。傷寒則血欲泄而寒束之。是以無汗。寒愈束而血愈欲泄。故外閉衛氣而生表寒。人之本氣不鬱則不盛。鬱則陽虛之人。藏陰內盛而爲寒。陰虛之人。經陽外盛而爲熱。是傳府傳藏之由來也。而其入府入藏必先施於皮毛。故六經之病總起於太陽一經。以其在外而先傷也。邪在營衛失於解散。則或入於府。或入於藏。視其人之裏氣爲分。途陽衰則入太陰而爲寒。陰衰則入陽明而爲熱。

無異路也。責於營衛方病。初治不差。則後日諸變無自生矣。衛行脈外而內交於營。營行脈中而外交於衛。營衛調和。是謂平人。寒邪傷營。則營血束閉。其衛氣故衛鬱而生表寒。風邪傷衛。則衛氣遏閉。其營血故營鬱而生裏熱。營衛外發則病解。營衛內陷則病進。陷而敗沒則死也。傷寒中風之死證。皆營衛之陷敗也。衛氣之外發。賴乎經中之陽盛。營血之外發。賴乎藏中之陰盛。陽統於陽明。陰統於太陰。陽明之經氣旺。則衛氣外發而汗出。其陽虛者。衛鬱欲發而不能。則振慄戰搖而後汗出。其再虛者。寒戰而

不見汗出。是陽不勝陰。衛氣將陷。當泄陰而扶陽。開皮毛而發衛氣。太陰之經氣旺。則營氣外發而汗出。其陰虛者。營鬱欲發而不能。則煩躁怫鬱而後汗出。其更虛者。躁悶而不見汗出。是陰不勝陽。營氣將陷。當泄陽以扶陰。開肌表而發營血。陽盛於府。陰盛於藏。衛氣之陷者。以其藏陰盛而內寒也。營血之陷者。以其府陽盛而內熱也。太陽爲六經之長。兼統營衛。方其營衛初病。外解經絡。內調藏府。使藏寒不動。府熱不生。異日無入藏入府之患。是善治太陽者也。太陽經病。不過風寒二者而已。風用桂枝。寒用麻

黃風而兼寒。寒而兼風。則有桂麻各半之方。風而火鬱。寒而水停。則有大小青龍之制。風寒已解而內躁。則有白虎清金之法。風寒未透而內濕。則有五苓利水之劑。風寒外散。血熱裏鬱。則有桃核承氣抵當湯圓之設。此皆太陽風寒之本病處治之定法也。人之本氣不偏。陽鬱不至極熱。陰鬱不至極寒。本氣稍偏。病則陰盛而爲寒。陽盛而爲熱。而以溫涼補泄。挽其氣化之偏。皆可隨藥而愈。不經誤治。斷不至遂成壞病。熟悉仲景太陽本病諸法。則風寒之證。解於太陽一經。無復壞事已。

太陽經提綱 太陽一

太陽爲六經之綱領。其經行身之背。其氣主一身之皮毛。故病則脈浮。頭項強痛而惡寒。緣邪在本經。但病其經脈所行之部分。而不及於他經也。在經失解。自此而內傳二陽。裏入三陰。府熱作則脈浮大。藏寒作則脈沉細。寒熱鬱發。諸病叢生。太陽之脈證。然後變耳。若其初感。府熱未作。藏寒未動之時。太陽之病情未改。證狀猶存。則祇有脈浮頭疼項強惡寒而已。卽令病於別經。別經病見而太陽未罷。亦必見太陽之脈證也。據太陽之脈證而分太陽之風。

寒何至淆亂於外經。亡羊於岐路也。仲景提太陽之綱。祇此一語。而太陽之情狀了了。所謂握片言而居要也。

太陽之爲病。脈浮頭項強痛而惡寒。

太陽在表故脈浮。其經行身之背起於睛明

在目內眥足太陽經之穴

名目頭下行而走足。病則經氣上鬱壅塞不降。故強痛也。風寒閉其營衛。氣鬱不能透泄。則外見惡寒。寒者太陽之令氣也。

風寒總綱

太陽二

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽

者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七。陰數六也。

此中風傷寒之總綱也。衛氣爲陽。風傷衛氣。是發於陽也。衛傷則遏閉營血。而生內熱。營血爲陰。寒傷營血。是發於陰也。營傷則束閉衛氣。而生外寒。故中風之初。先見發熱。傷寒之初。先見惡寒。中風內熱而營血不宣。亦外見惡寒。傷寒外寒而衛氣不達。乃續見發熱。中風非無外寒。究竟內熱多而外寒少。傷寒非無內熱。究竟內熱少而外寒多。營司於肝木。木升則火化。木火同情。故肝血常溫。衛司於肺金。金降則水生。金水同性。故肺氣常涼。肝藏營血。而脾

爲生血之本。中風營病。藏陰衰者。多傳陽明而爲熱。肺藏衛氣。而胃乃化氣之源。傷寒衛病。府陽弱者。多傳太陰而爲寒。風傷衛者。營鬱裏熱。若經中陰旺。則營氣不至內蒸。故七日經盡而自愈。寒傷營者。衛鬱表寒。若經中陽旺。則衛氣不至內陷。故六日經盡而自愈。此風寒之順證。在經而不入於藏府者也。若中風陽盛而入於府。傷寒陰盛而入於藏。則營衛方憂其內陷。非補泄以救其偏。不能應期而愈也。六日七日。水火之成數。大衍之數。天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。火陽也。故數七。水陰也。故數六。

滿其成數是以病愈也。

風寒總綱

太陽三

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

申明上章惡寒之義陰盛則內寒外熱內寒故欲近衣陽盛則內熱外寒內熱故不欲近衣以其欲不欲而內外之寒熱見焉經所謂臨病人問所便也

素問語

上章發熱惡寒

無熱惡寒者言其外也風傷衛者多內熱寒傷營者多外寒恐人畧內而詳外故發此章

太陽中風 十五章

風者天地發生之氣也。皮毛未開。風氣外客。傷其衛陽。則竅開而衛泄。衛性降斂。衛欲閉而風泄之。欲閉不得。則內乘陰位而遏營血。是以病也。

曰風泄者。風閉其衛。營鬱而外泄也。

太陽中風一 太陽四

太陽病發熱汗出惡風脈緩者。名爲中風。

太陽之經有營衛之分。營行脈中。衛行脈外。風寒客之。各有所傷。風則傷衛。寒則傷營。衛傷則閉其營血。故發熱。營傷則閉其衛氣。故惡寒。營爲寒閉則無汗。衛爲風鼓則有

汗。以衛氣初閉。營鬱猶得外泄也。汗出衛泄。是以表虛而惡風。寒性凝澁。傷寒則皮毛閉塞。故脈緊。風性動盪。傷風則經氣發泄。故脈緩。

### 太陽中風桂枝湯證

肺通衛氣。風傷於衛。行其疏泄之令。衛氣不斂。是以有汗。衛愈泄而愈閉。閉而不開。則營鬱而發熱。桂枝湯所以通經絡而泄營鬱也。

### 太陽中風桂枝一

太陽五

太陽病。頭疼發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。

風爲陽邪。衛爲陽氣。風邪中人。則陽分受之。故傷衛氣。衛秉肺氣。其性收斂。風鼓衛氣。失其收斂之職。是以汗出。風愈泄而衛愈斂。則內遏營血。鬱蒸而爲熱。是衛氣被傷而營血受病也。故傷在衛氣。而治在營血。桂枝湯。甘草大棗補脾精以滋肝血。生姜調藏府而宣經絡。芍藥清營中之熱。桂枝達營中之鬱也。汗者營衛之所蒸泄。孔竅一開。而營鬱外達。則中風愈矣。

### 桂枝湯一

桂枝

三兩  
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩  
炙

大棗

十二枚  
劈

生姜

三兩

右五味㕮咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫服一升。服已。須臾。飲稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。通身縻縻。微有汗出。益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出。病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。可服至二三劑。禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物。

### 銖兩升斗考

漢書律厯志量者。龠合升斗斛也。本起於黃鐘之龠用度。