

醫統正脈全書

八十

医统正脉全书

八函 八十册

北京市中国书店出版
北京市新华书店发行

定价：七百六十元

傷寒明理續論卷六

江陰朱氏校刊本

明 餘杭陶 華述

傷寒三陰三陽脈證論

傷寒汗下溫之法最不可輕據脈以驗證問證而對脈
太陽者陽證之表也陽明者陽證之裏也少陽者三陽
三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總謂之陰證也發
於外則太陽爲之首發於內則少陰爲之先太陽惡寒
而少陰亦惡寒但太陽之脈多浮少陰之脈沉細與其
他證狀亦自異也發熱惡寒身體疼痛或自汗或無汗

是爲表證可汗不惡寒反惡熱口燥咽乾壯熱腹滿小便如常而大便秘結是爲裏證可下厥冷囊拳自利煩燥而無身熱頭疼是爲陰證可溫浮洪緊數此表病之脈沉實滑數此裏病之脈微細緩芤此陰病之脈在表者邪傳於榮衛之間在裏者邪入於胃腑之內胃腑之下少陽居焉若傳之陰則爲邪氣入臟矣榮與衛俱爲表也亦均可汗也然有汗者爲傷風風傷衛氣則以桂枝助陽而汗之輕無汗者爲傷寒寒傷榮氣則以麻黃湯助陽而汗之重榮衛固爲表也胃腑亦可以爲表也

然以腑臟而分表裏則在腑爲之表在臟爲之裏胃取諸腑可以表言若合榮衛腑臟而分之則表者榮衛之所行裏者胃腑之所主而臟則又深於裏者矣審脈問證辯明定經真知其爲表邪則汗之真知其爲裏邪則下之真知其爲陰證則溫之表有邪則爲陽虛陰經受邪則爲臟病而溫裏之藥熱如此而汗如彼而下又如彼而溫桂枝承氣投之不差薑附理中發而必中大抵治傷寒有法投劑少差死生立見古人處方立論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下與夫先溫其

裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知奇者若網在綱
有條不紊論至於此則知古人之立論甚嚴而汗下溫
之法亦不可輕也信矣經曰傷寒六七日目中不了了
無表證脈雖浮亦有可下者少陰病二三日無裏證亦
有可汗者陰證四逆法當用溫而四逆散性寒豈可用
哉曰醫在九流之中非圓機之士不足爲語也脈雖浮
而亦可下者無表證謂六七日不大便借使大便不難
其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者少陰本無熱反發
熱而表猶未解故用溫藥微取其汗也借使身不發熱

其敢輕汗之乎四逆湯用薑附四逆散用枳柴一寒一熱病主四逆固不侔矣然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同四逆散用藥寒主先陽後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也若張氏之論日數多則日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數雖少若有裏證而脈沉實者卽須下之此日數之不可拘也至如陽極發厥陰極發燥陰證似陽陽證似陰差之毫釐繆以千里可不深思而熟慮也哉

陰陽虛實用藥寒溫辨

傷寒一書所謂陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛實出者爲虛入者爲實蓋表之眞陽旣虛故陰邪以盛出而乘陽是以脈浮於外其病在表法當汗之當其陰邪出表脈浮於外之時不可自感以爲陽脈盛也裏之眞陰旣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脈入於內其病在裏法當下之當其陽邪入裏脈實於內之時不可自感以爲陰脈盛也是說非古人之立言也蓋使人知如此之爲陰盛則抑陰而助陽如彼之爲陽盛則抑陽而助陰陰甚則邪出於外者發表

之藥當性溫以助陽氣如桂枝湯之類是也陽盛則邪入於內者攻裏之藥當性寒以抑陽氣如承氣湯之類是也或曰陰出而乘於外是陽之不足也陽病則當有以發表而汗之何哉是大不然陰邪傳於外不汗之則邪何由而去桂枝之性溫溫之乃所以助陽陽有所助而長則陰邪之所由以消辛甘發散爲陽者此也張氏所謂承氣入胃陰盛乃亡者正恐陰盛出外而誤以承氣下之安得而不亡或者有陽入而承於內是陰之不足也陰病則當有以溫養而下之何哉是又不然陽邪

入於內不下之則邪從何而出承氣之性寒寒之乃所以抑陽陽受其抑則微而眞陰之所由以長酸苦湧泄爲陰者此也張氏所謂桂枝下咽陽盛則斃正恐陽盛入內而誤以汗之又安得而不死觀古人發表之藥多溫攻裏之藥多寒則知陰陽虛實之意微非止於汗下設矣所以爲用藥寒溫設也

六經用藥格法

太陽屬膀胱寒水非發汗不能愈亦有桂枝麻黃以助陽祛邪此膀胱寒水之經有標本之作風寒初客仍在

表宜用辛溫之劑以發散之若無頭痛惡寒或非冬時皆不可用

陽明屬胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疎利陽熱此言表證已罷頭痛惡寒已除則熱歸陽明之本矣宜承氣湯寒劑以泄熱若惡寒未除則爲表寒邪尙在不可下也冬時亦宜用不可拘忌

少陽屬膽無出入之道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之

太陰脾土惟惡寒溼非乾薑白朮不能燥溼也

少陰腎水惟惡寒燥非附子不能溫潤

厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此用藥經常之道也

陰陽虛盛用藥寒溫辯

夫傷寒發表攻裏之藥寒熱殊途用之一差死生反掌所以越人仲景深致意於其間也難經云傷寒陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈且寒邪之傷人也有淺深焉淺者汗之深者下之此古今不易之定法也方其風寒初客皮毛之間陰氣乃盛

閉塞腠理身中陽氣已虛不能禦衛遂有惡風惡寒之證見焉當此之時止宜桂枝湯辛甘溫之藥助陽抑陰而發之陰邪既散表氣冲和而愈經云辛甘發散爲陽者是也不知用此而反以承氣湯苦寒之藥下之表裏俱傷不亡何待表邪既罷寒作爲熱陽陷入深而盛於裏則津液消耗腸胃燥澁而臟腑之眞陰虛矣陰氣既虛卽譫妄狂燥煩渴惡熱之病而作也當此之時宜用承氣湯苦寒之劑扶陰抑陽而泄去熱氣陽邪卽退胃中眞陰來復裏氣和平而愈內經所謂酸苦湧泄爲陰

者是也不知用此乃以桂枝辛熱之藥助邪伐正安有
不斃者乎所以仲景云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃
陰盛乃亡良以此夫嗚呼此論誠爲傷寒汗下之樞機
乎俗醫不能達此爲妙昧於陰陽虛盛之道悖逆此理
而不殺人也幾希經云發表不遠熱攻裏不遠寒豈虛
語哉

三陰三陽脈證

經云尺寸俱浮大者陽受病也當一二日發以其脈上
連風府故頭項痛腰脊強傷寒則發熱惡寒傷風則鼻

塞惡風然傷風有汗傷寒無汗

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧又曰不惡寒而作渴皆爲在經不惡寒反惡熱自汗出大便難

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾口苦咽乾目眩往來寒熱而嘔此三經受病未入於腑者可汗而已

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嗌故腹滿而咽乾或腹痛手足溫自利不渴

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴惡寒口中和默默欲寐時時腹痛又咽痛三證

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮唇青舌捲筋急或渴不欲食卽吐蛔此三經皆受病也已入於腑者可下而已此皆自陽經傳來者故宜下而去之非若陰經自中之寒此則爲眞陰證矣當用四逆湯輩溫之

汗下溫正法

太陽傷風自汗惡風桂枝湯傷寒無汗惡寒麻黃湯陽
明不惡寒反惡熱自汗者大便難大柴胡湯小承氣湯
汗不止者胃汁乾急下之大承氣湯無汗惡寒升麻葛
根湯有汗脈遲微惡寒爲表未解桂枝湯無汗脈浮而
喘麻黃湯

少陽證病屬小柴胡湯

太陰自利不渴爲臟寒理中湯四逆湯胸中脹滿枳實
理中丸脹滿脈浮桂枝湯脹滿時痛桂枝加芍藥湯痛
甚桂枝加大黃湯