

本草綱目

金陵初刻本
何時希書齋



R291.3
12-1

本草綱目第十二卷 草部一

草之一 山草類三十一種

甘草 本經上品

釋名蜜甘 錄別蜜草 錄別美草 錄別路草 錄別靈通 記事國老 別錄云

草最為衆藥之主經方少有不不用者猶如香中有沈香也國
老即帝師之稱雖非君而為君所宗是以能安和草石而解
諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒
解一千二百般草木毒調和衆藥有功故有國老之號

集解 別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除
日采根暴乾十日成陶弘景曰河西上郡今不復通市

今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是
抱罕草最佳抱罕乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛味又

有細而實之時亦可破不復好青州間有而不如有紫甘
草細而實之時亦可破不復好青州間有而不如有紫甘

生青苗高二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角
子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下

皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅
實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之

謹按爾雅云葦大苦郭璞靈似地黃又詩唐風云采芣采芣
艸是也葦與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今

同者乎，生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不
註為其草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大
苦非片草也其草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而
濤似有白毛結角如相思角作一本生至熟則角拆子扁如
小豆極堅齒齧不破今出河東西界寇氏行義亦取此說而
不言大苦非其草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近
之今人惟以大徑寸而結緊斷紋者為佳謂之粉草其輕虛
細小者皆不及之錙績罪雪錄言安南其

草大者如柱土人以架屋不識果然否也
根修治雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾叶人每用切長
三寸擊作六七片入瓷器中臧用酒浸蒸從已至午

取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡為度又法
先炮令內外赤黃用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕
炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥
炙酒蒸者大底補中宜炙用瀉火宜生用

氣味耳平無毒寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫王好古
曰氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經

時珍曰通入手足十二經○徐之才曰木苦參乾漆為之使
惡遠志反大戟荒花甘遂海藻權曰忌猪肉時珍曰甘草與
藻戟遂荒四物相反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘草
人黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治
項下結核消腫貴堅湯加海藻舟溪朱震亨治勞瘵達心飲
用荒花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古

万功有相惡相反並乃不為害非妙達精微者不知此理主治五臟六腑寒熱邪氣堅

筋骨長肌肉倍氣力全瘡毒解毒久服輕身延年本經○他音時男切

也腫中下氣煩滿短氣傷臟欬止渴通經脉利血氣解百

藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草錄主腹

中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿

主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者加用之權安魂定魄補五

勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣

壯筋骨明大生用瀉火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣

養陰血補脾胃潤肺詩吐肺痿之膿血消五發之瘡疽古解

小兒胎毒驚癇降火止痛時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索苦楝子

七元

五生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫導毒震

主癰腫宜入吐藥時

發明震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載物之君

降陰中陽也欲達下焦須用稍子某曰甘草氣薄味厚可升可

散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急

痛脹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之

不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒散酸收鹹軟其上行而

之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹軟其上行而

發而本草言甘草下氣何也蓋其味主中有升降浮沉可上

附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其

速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏

之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而

後脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃其補之

意又曰甘草者令人中滿中滿者勿食其甘緩而壅氣非中滿

所自也凡不滿而用炙甘草為之補若中滿而用生甘草為

之瀉能引諸藥直至滿所其味甘入脾歸其所喜此升降浮沉

之理也經云以甘補之以其瀉之以其緩之是矣時珍曰月

草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄質全上德協和群品自元

老之功普治百邪得王道之化黃帝力而人不知欬神功而

其而大戟荒花其遂海藻與之相反是亦緩不可以救
味而若子嘗見媒於宵人之意與○(頌曰)按孫思邈千金方
論云此草解毒如湯沃雪有中之烏頭巴豆毒其草入腹
即定驗如反掌方稱大豆汁解毒百藥毒子每試之不效加入
其草為其豆湯其驗乃奇也又葛洪明後備急方云席間刺
史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃
言二百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親仲乃得其詳凡飲
食時先取炙熟甘草一寸嚼之煮汁若中毒隨即吐出仍以
炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋藤
黃蘗二物酒煎溫常服則毒隨大小波出又常帶甘草數寸
隨身滿急若經含甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛
葉即土常山也三百兩銀藥
即馬兜鈴藤也詳見各條

附方舊十五傷寒心悸肺結代者甘草二兩水三升煮一傷

寒咽痛少陰證甘草湯主之服七合日一服傷寒類要肺熱

喉痛有痰熱者甘草半升服五合日二服張仲景傷寒論肺痿

多涎肺痿吐涎沫頭眩小便數而不效者肺中冷也甘草乾

合分服張仲肺痿久嗽兩灸搗為末每日取小便三合調

之廣一錢服小兒熱嗽甘草二兩緒膽汁浸五宿炙研末

名宗聖惠方物生解毒小兒初生未可便與未破蜜只以甘草

綿染點兒口中可為一指節長灸碎以水二合煮取一合以

便閉甘草枳殼煨各一錢水小兒撮口發噤用生甘草二錢

服令吐痰涎後以乳汁嬰兒目澀或出月內目閉不開或睡羞明

草一截以猪膽汁炙為末每用小兒遺尿夜服之危氏得

米其調少許灌之小兒尿血甘草一兩二錢水六合煎二合一小兒癰瘦甘草

三兩炙焦為木蜜丸綠豆大每大人羸瘦甘草三兩炙每

水下五升日二服金匱玉函大人羸瘦甘草三兩炙每

四沸頃服之良赤白痢下崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙

八合服之立效梅師方用甘草一兩炙舌腫塞口不治殺

肉豆蔻七個煨熟以水三升煎一升分服白礬一升發背癰疽

吐聖濟總錄太陰口瘡甘草二寸白礬一粟大發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用其

沸水使如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以細片及故紙

隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍

當喫黃芪粥為妙○又一法甘草一大兩水炙搗碎水一大

升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫

服之但足瘡腫發背諸般癰疽同浸瓶中用黑綿一片溶成

者甚效蘇頌圖經諸般癰疽一切癰疽諸發預期服之

汁接酒中取出如此九度令病者一切癰疽能消腫逐毒使

飲酒至醉後即愈也經驗方一切癰疽能消腫逐毒使

毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤按碎河水浸

一宿採取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以蠟錐

收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者癰疽必寒

亦解之或微利無妨名國老膏外科精要方癰疽必寒

生甘草二錢半并水煎服乳癰初起乃令甘草二錢新水煎服

能味導下惡物直指方乳癰初起乃令甘草二錢新水煎服

些小癰癰發熱時即用粉草節曬乾為末熬酒服一痘瘡煩

渴粉甘草炙搗樓根等分水煎服之計陰下懸癰生於穀道

如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿即破破則

難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盃河
水并水不用以文武火慢上煎水炙之自早至午令水盡為
一度開視之中心水潤乃止細判用無灰好酒二小盞煎至
一盞溫服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二十口
盡興化守康朝病已破衆醫拱手服此兩劑即合口

也 李迅 從向方 陰頭生瘡 蜜煎甘草末 頰七塗 陰下濕癢

其草煎湯日洗二 度 古今錄驗 代指腫痛 其草煎湯漬 千金方 凍瘡發裂 其草煎

次以黃連黃芩黃花木入輕 湯火瘡灼 其草煎蜜塗 李樓奇方 蠱毒藥

粉麻油調傳 談埜翁方 毒 其草節以直麻油浸之年久愈妙每 小兒中蠱 欲死者其

一盞煎五分服當 吐 金匱王函 牛馬肉毒 其草煮濃汁飲一二升或煎酒

之即死 千金方 飲饌中毒 未審何物 卒急無藥只煎其草薺 水良

若毒 菜中有水菰若菜圓而光有毒誤食令人狂亂狀若中 風或作吐以其草煮汁服之即解 金匱王函妙方

黃耆 本經 上品

釋名黃芪 綱目戴縻 經本戴堪 別錄又 芟草 別錄又 百本 錄王孫

藥性論 時珍曰 耆長也 黃耆色黃為補藥之長故各今俗 通作黃芪或作耆者非矣耆乃耆龜之耆音尸王孫與壯家

同名 異物

集解 別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月采陰乾

馬水若馬老色白即理對新者其色不溫補又有赤色者可作膏貼俗方多用
道家不須黍曰今出原州及原者最良蜀漢不復采明宜
州寧州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多有之根長二三尺
以來獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀
又如蒺藜前七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中
禾根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆赤
水耆木耆功出並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人
多以首宿根假作黃耆其皮亦似綿頗能亂真但首宿根堅
而晚黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳承曰黃
耆本出綿上者為良故各綿黃耆非謂其柔韌也今圖
經所繪靈州者地與綿上相隣也好古曰綿上即山西沁州
白水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥首宿根味
苦而堅脆俗呼為土黃耆能令人瘦用宜審嘉謨曰綿上
沁州鄉名今有巡檢司白水赤水二鄉俱屬隴西時珍曰黃
耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微濶人謂白色開黃
紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭
幹者為良嫩苗亦可時淘茹食其子收之十月下種如種菜
法亦可

修治

散曰凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫
上頭去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧土上切用時珍曰

但槌扁以蜜水塗灸數次以熟為度亦
易開透器盛於湯瓶蒸熟切用者

本方少耳微溫無毒

本經

白水者冷補

別錄

元素曰味甘氣溫平氣薄味厚可升可降

陰中陽也入手足大陰氣分又入手少陽足少陰命門之才曰伏苓為之使惡龜甲白鮮皮

主治癰疽久

敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病

本經

婦人

子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹

痛洩痢益氣利陰氣

別錄

主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背內

補

權

助氣壯筋骨長肉補血破癥癖癰瘕贅腸風血崩帶

下赤白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目

治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及

諸經之痛

素元

主太陰瘧疾陽維為病苦寒熱督脉為病逆氣

裏急

古好

發明

弘景曰出隴西者溫補出白水者冷補又付赤色者可

冷月隴西黃耆天明日黃耆藥中補益呼為羊肉白水耆

時治用之元素曰黃耆其溫純陽其用有五補諸虛不足一
也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛活血生
血肉五也陰疽為瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛治脈弦自
汗瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之身古曰黃耆治
氣虛盜汗并自汗及膚痛是皮表之藥治諸血系脾胃是中
州之藥治傷寒尺脈不至補腎臟元氣是裏藥乃上中下內
外三焦之藥也果曰靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚
肥腠理而司開闔黃耆既補三焦實衛氣與桂同功特比桂
其平不辛熱為異耳但桂則通血脈能破血而實衛氣耆則
益氣也又黃耆與人參并草三味為除燥熱肌熱之聖藥脾
胃一虛肺氣先絕必用黃耆溫分肉益皮膚毛實腠理不令汗
出以益元氣而補三焦黃耆曰黃耆補元氣肥白而多汗者
為宜若而黑形實而瘦者服之令人胃滿宜以三拗湯瀉之
○宗頤曰防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新
蔡王外兵參軍時陳太后病風不能言脉沈而口燥胤宗曰
既不能下藥宜湯氣蒸之藥入陰理周時可瘥乃造黃耆防
風湯數斛置於床下氣如煙焉其父便得語也果曰防風能
制黃耆黃耆得防風其力愈大乃相畏而相使也黃耆曰人
之口通乎地鼻通乎天二以養陰鼻以養陽天主清故鼻不
受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形鄉太后
之病不言若以有形之湯緩不及事今接以二物湯氣灌室
則鼻但受非智者通神不可回生也○果曰小兒外物驚

安神丸鎮心藥若脾胃寒濕吐腹瀉瀉痢青白宜

藥如脾胃伏火勞後不足之證及服巴豆之類胃
成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命當於心經中以
甘溫補土之源也於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金
旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金益土為神治之
法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分小
太蓋煎半蓋溫服口機曰蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小
兒痘瘡惟有順逆險三證順者為吉不用藥逆者為凶不必
用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為安宜用保元湯加減
主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以
其內固營血外護衛氣滋助陰陽作為膿血其證雖異其理
則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯炙黃耆三錢人參二
錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅
少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起色不明也漿行
色灰不赤也漿走光潤不消也漿老濕潤不乾也結痂而胃
弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而飲
遲也凡有諸證並宜此湯或加芍藥加官桂加糯米以助之
詳見本書嘉謀曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡
寒吐泄急引脹滿痞塞神短味微者當以人參為君黃耆為
臣若表虛自汗亡陽瀉瀉痘疹陰瘡者
常以黃耆為君人參為臣不可少也

附方

舊五

小便不通

綿黃耆

一錢小

二錢煎

一盞

酒疸黃疾

心下懊痛足脛痛小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉常風入
水所致黃耆二兩木蘭一兩為末西良方寸匕日三服

方氣虛白濁

黃芪五錢以半兩伏苓一兩

治渴補虛

諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘧

身或先癰疽而後發瘧渴宜常服此藥平補氣血安和臟腑

一身以溫水潤濕餉上蒸三次培割粉甘草一兩一半生用

一半炙黃為末每服二錢白湯點服早晨日午

各服亦可煎服各黃芪六一湯外利精要老人閱寒

蒼陳皮去白各半兩為末每服三錢用大府二一合研爛以

水通漿煎至乳起入白蜜一匙再煎服此藥至心服甚有不

過服此藥不冷不熱常服無秘腸風瀉血黃耆黃連等分

末之患其效如神和劑局方

二豆大每服二十丸米飲尿血沙淋痛不可忍黃耆人參等分

下孫用和秘寶方

拍厚大四五片蜜二兩淹炙令盡不令吐血不止黃耆二錢

焦點末食無時以鹽湯下永類方

萍五錢為末每服一錢久嗽膿血咽孔乃虛中有熱不可服

薑蜜水下聖濟總錄

一兩為末每服二錢肺癰得吐血者二兩為末每服二錢水

點湯服肺癰得吐血者一兩為末每服二錢水

甲疽瘡膿

生足趾甲還赤肉突出時常舉發者黃耆

取二合絞去滓以封瘡口胎動不安

黃內自消外臺秘要胎動不安

黃耆黃連下黃汁黃

一合水 升煎陰汗濕痒 綿黃耆酒炒為末以熟猪

方 痒疔内固 黃耆人參各一兩為末入真龍腦一錢用生藕

本串 和丸綠豆大每服二十九湯水下日日服

葦葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡 別錄

人參 本經上品

釋名人參 音參或黃參 吳血參 別錄人街 本經鬼蓋 本經神草 別土

精別地精 廣海腴 皺面還丹 廣雅 時珍曰人參年深浸

謂之人參 神草 浸字從漫 亦浸 漸之義 漫即浸字 後世因字

文繁遂以參星之字代之 從簡便爾 然承誤日久亦不能更

美惟張仲景傷寒論尚作漫字 別錄一各人微微乃漫字之

訛也 其成有階級故曰人參 其草皆陽向陰故曰人參 其

五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地

之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上黨有

搗光不晦人參不生於此
則神草之名又可證矣

集解

米根錄曰人參生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬

主中藥三月生葉小銳枝黑莖有毛三月九月采根根有手

足面目如人者神弘景曰上黨在冀州西南今來者形長而

黃狀如防風多潤實而其俗乃重百濟者形細而堅白氣味

薄於上黨者次用高麗者高麗即是遼東形大而虛軟不及

百濟並不及上黨者其草一莖直上四五根對生花紫色高

麗人作人參讚云三極五葉背陽向陰汝來求我假爾相尋

報首賈樹似桐甚大陰廣則多生采作甚有法今近山亦有

但作之不好恭曰人參見用多是高麗自濟者略州太行紫

團山所出者謂之紫團參保升曰今心州遼州澤州箕州平

州易州檀州幽州鵠州并州並出人參蓋其山皆與太行連

巨根接故也琦曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘

以杉木夾定紅絲纏繞之又沙州參知小不根川頽曰今河

東諸州及泰山皆有之又有河州推場及關中來者名新羅

人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近暇潔下濕

潤處物生小者三四寸許一經年深者生四五年後生兩極五葉

一莖俗名百尺竹三月四月有花細小如粟蓋如絲紫白色

秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神

參山省葉幹青根白殊別江淮間出一種上人參苗長一

尺匙而小與情梗州似相對生小五七節根亦如桔

人參乃真也宗輿曰上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為難得土人得一窠則置板土以新絲絨飭之嘉謀曰紫團參紫人補偏百濟參白堅且圓各白條參俗名羊角參遼東參黃黃潤纖長有鬚俗名黃參獨勝高麗參近紫体虛新羅參亞黃味薄肖人形省祥其類鷄腿者力洪時珍曰上黨今潞川也民以人參為地方害不復米取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮首黃潤色如防風去皮首堅白如粉為者皆以少參薺范括梗采根造作凡之少參體虛無心而味淡薺范體虛無心續体堅有毫味苦人參体实有毫味辛微帶苦自今余未俗名并玉蘭也其以人形者謂之孩兒參左多廣偽宋蘇頌謂經本草所繪潞州者三極五葉真人參也其潞州者乃少參之苗葉心州兗州皆皆齊楚之苗葉其所云江淮上人參者亦薺范也並失之評者今潞州者尚不可得則他處者尤不足信矣近又有薄夫以人參完浸取汁自啜乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察考戶部諸言聞字子解衛太醫吏曰嘗著人參傳上

修治

人參易蛀唯納新器中密封可經年不壞所