

增補
加批

臨證指南醫案

肝腎
悶症

臨證指南醫案卷七

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同載

龔初起腰足俱與肝腎蠱毒不得外越目泛匝舌繼增喘促是緊閉不治之症諸醫食用石膏大黃等然則此藥僅通陽明胃腑之壅未能搜透肝腎至陰之臟讀宋醫錢仲陽直訣毒伏於陰亦有下奪之法其製方曰東變百祥丸乃百中望一二生全者

紅芽大戟錢五 紅棗五 水煮至裏熟去核及大戟湯但用棗肉研開水送

某毒伏不肯宣透氣滯血凝馬能起綻成漿七八險關診視肉腫瘡枯神躁不安議疎利內壅佐活血透肌

法犀角 柴草 炒豇 鮮生地 酒浸大黃 紅花 青皮 丹皮 連翹 牛蒡 茅根 茅尖 湯代

水

俞發熱五六日來神煩不寧腹膨嗽逆詢知二三日前面間見點數粒狀如麩痞隨即隱伏不見乃毒重壅遏悶伏景象設成發出亦屬重險且甫生六月胃乏穀食難進湯藥擬進紫雪須少搜其蘊蓄之邪使其神安再商紫雪丹一分

高點雖繁密根腳綻立寒涼藥不宜太重可以維持收功

犀角 連翹 牛蒡 炒豇 紫草 丹皮 天蟲 桔梗

龐二神倦腹痛點粒繁瑣地界不清是時邪毒大兼重急進雙解法使大便稍通六腑氣宣則痘毒外透再商

犀角 連翹 牛蒡 酒大黃 紫草 青皮 桃仁 炒豇 木通 生石膏 荊芥 笋尖

程成片不立頂焦黑滯肝肺毒重不能起脹馬得化毒今咳喘交加九朝難過

羚羊角 元參 連翹 天蟲 土貝 紫草 丹皮 炒豇 銀花 地丁 湯代水

錢雖雖未發齊其點形繁密色澤不潤重險不疑今痧未全退尚宜清解

犀角 生石膏 炒豇 紫草 連翹 牛蒡 赤芍 桔梗 木通

程軀身小氣弱佈痘繁稠用藥不宜寒冷五日後受得托可冀有成

連翹 牛蒡 炒查 紅花 天蟲 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

毛 身小氣弱。發發驚風。屬虛。人參 炒歸身 炙草 廣皮 炒白芍 炒黃米

童 痘形粘着肌肉。不肯起綻高立。兼之繁紅殼薄。乃時火毒火交熾。而元氣素虧體質。目今六日前。時癘未

徹。宜先清解。活血提頂。布藥毒。分地界再究。

犀角 羚羊 元參 丹皮 炒查 秦皮 紫草茸 銀花

鄭 痘發猶然身熱咳嗽。乃風溫入肺未解。診其點粒粘着不爽。溫邪鬱滯。氣血更體質素虛。宜開肺氣以宣

之。活血以疎動之。冀其形色充長。若一進沉降。恐無好音。

連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草 炒查 鬱金 丹皮 雞冠血

又 昨進輕揚提頂活血痘形頗長。所嫌色不光潤。達鬆盛與有乾塌無漿之慮。今明時氣將解。氣血用事。況

正欲納穀。苦寒不但伏毒氣。更防大傷胃口。古人於重症更加詳慎者為此。

川芎 當歸 天蟲 桔梗 甘草 角刺 紫草茸 丹皮 炒查

又 進和氣血法。形色畧潤。究不肥綻。焉得起脹成漿。議進十宣散法。

人參 川芎 歸身 廣皮 紫草茸 天蟲 紅花 白芷 甘草 桔梗

張 朝船小重載。難許全功。勉議進雞鳴散二分。

陸 點雖不密。色滯形癢。痰多嗆逆。如嘶是痘。雖發出。毒猶在內。上冲心肺。故有喘咳不甯之象。進涼血透毒

法。羚羊 桔梗 甘草 紫草 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蟲 西牛黃分

朱 朝炒黃米 炒山查 紅花 芩尖

又 軀身小痘多。元氣最薄。胃腑未納穀味。湯藥太過。須慮嘔泄。宜少少與藥。扶過八九風波。方得平安。

川芎 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雞冠血

又 薄嫩無漿。仍宜內托。

黃芪 防風 歸身 川芎 紫草茸 丹皮 天蟲 桔梗 甘草 雞冠血

宋朝顧頰形似紅沙餘痘乾枯不潤昨進清毒活血續發點子盈千仲仁謂毒重壅閉氣血必乾焦退縮今五朝形象僅似初齋痘似十二日為常數已經壅遏未發三日矣當此所薄神勢恐難延多日即或望其堆沙發臭然必在旬日以外目下總以解毒清涼八九波濤洶湧恐難人力穩全

犀角 羚羊角 川連 炒查 土貝母 紫草茸 元參 鮮生地 連翹 丹皮 牛蒡子

猪尾血

吳朝痘子分顆原屬純正所嫌色滯乾枯防八九癢塌涼藥兼以活血是為平準方法看守勿懈為上

羚羊角 丹皮 連翹 炒查 紫草茸 黃連 元參 天蟲 生地 雞冠血

孫肌柔白嫩體質是虛但佈痘必由時癘感觸地中六氣咸從火化癘固客氣相混氣血若非清解何以透達令視色油紅按形鬆要法再視面部肌肉先腫痘形未具起脹之象體症未為合局慮進銳退速清涼解毒佐以提頂在五六日之法然險症變遷不一未可以經常定論

羚羊角 連翹 丹皮 天蟲 生甘草 紫草茸 川連 炒查 桔梗 銀花湯煎和入雞冠血數

滴

汪朝痘形繁瑣成片色紫滯乃火毒重險症藉身大氣旺扶持十日險關莫其發臭堆沙庶幾可以圖倖

犀角 羚羊角 桔梗 炒查 連翹 天蟲 紫草茸 丹皮 石膏 銀花 地丁 牛蒡

猪尾血 冰片

又雖雖血熱毒重猶幸八齡體堅急清解活血莫令痰阻廢食扶持堆沙可望向安

照前方去石膏地丁天蟲牛蒡加川連元參土貝

查痘子成漿濕氣蘊於皮毛與熱氣相蒸內應乎肺發出單痘疹宜忌葷腥輕清理肺淡滲消其濕熱驗其體質最薄慎勿過劑

沒仁 茯苓 連翹 地骨皮 通草 桑葉 白沙參 甘草

顧痘發由絡其毒不化而轉陷亦歸於絡當世畧曉攻補而已讀古人書辛香溫煦乃治毒陷大法

人參 肉桂 炙草 丁香 厚朴 訶子皮 廣香 木香 前胡 茯苓

徐 未納穀食。但以湯藥。所以滑泄不止。頭仰胸突。擁痰身熱。肺熱未清。不可驟補。翁仲仁有泄瀉安甯。大虛必毒之議。姑以和中。清咽再商。

桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮 炒查 炒黃米湯煎 冲雞冠血

又軀身小痘密。氣弱難任。雖清漿三四日。護宜慎。八九日不致損破。可以有成。

人參 黃芪 炙草 紫茸 天蟲 廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查 加炒冬米

孫朝色嬌皮薄。漿汁未灌。緣身小痘多。氣血交虧。不能運毒化漿。八九日期。最有癢塌之慮。扶過十二朝無變。

庶幾可望有成。進參歸鹿茸湯法。

人參 歸身 鹿茸 生黃芪 炙草 廣皮 厚朴 煨木香

又軀照前方加肉巢炒冬米。

又漿清四五。不能充灌。因元氣鋸弱不振。不能煅煉毒氣成漿。恐有內陷之慮。再進補托。冀其堆沙。或可回春。

人參 黃芪 廣皮 炙草 木香 鹿茸 歸身 肉巢 坎炁 官桂

又軀三醫痼甚薄。中凝血亦兼之。嗆逆帶嘔。食入便有化不化之形。此虛中有毒。非純補純清之症。

炒川貝 炒銀花 茯苓 苡仁 甘草 地骨皮 方太輕耳

楊朝八闊塌癰陷。漿色白滯不榮。謂之氣衰毒陷。所冀堆沙如食一線機耳。

人參 黃芪 川芎 歸身 木香 炙草 廣皮 桂心

又軀一漿滿堆沙。四肢圓綻。但氣弱恐其不肯收痂。必資脾利水為法。

人參 冬朮 炙草 茯苓 新會皮 白芍

又軀三已經堆沙如食。都是向安之象。便澹滑膩。皆寒涼傷裏。腸中脂垢自下。當脾胃藥中。必佐固陽。以久延不已。尚貽變症。

人參 焦木 訶子 廣皮 肉巢 白芍 木香 炙草 茯苓

又軀六納食不化。腹膨便真白色。要之胃滯當消。脾弱宜補。古稱痞滿屬氣。氣行滯通。但痘後虛體。純消猶恐變症。

人參 焦木 炒查 木香 焦麥芽 廣皮 茯苓 澤瀉

鮑欒漿不外達毒欲內陷已經交牙滑瀉嘔惡內症諸數皆屬深畏二十四總屬險關痘子毒氣必氣元旺冀其托出議以陳氏木香散救裏托毒

人參 木香 丁香 官桂 炒歸身 厚朴 廣皮 肉菓 訶子皮

孫面腫目沒頭搖微嘔肝風離體乘上逆攻此乃變驚欲厥之象天相火寄於肝胆氣斂痘痂宜進涼解清毒倘得微熱緩仍進穀方有佳音

羚羊角 川連 鉤藤 石菖蒲 黑山梔 膽星 天麻 連翹

又肝風熱定疳蝕亦緩仍宜清熱解毒但不可犯胃

羚羊角 連翹 膽星 丹皮 炒銀花 金石斛 茯苓

諸痂三痘已收驚然痂落太早恐有餘毒令瀉止瀉短宜進清涼佐以分利

生苡仁 百合 茯苓 川斛 白沙參 炒麥冬

某已經回痂不宜再進補劑恐氣血壅滯致有餘毒變幻宗翁仲仁清涼以助結痂之法

黃芩 銀花 川貝 甘草 地骨皮 桔梗 連翹 苡仁

胡五雖然堆沙鑿痂咬牙發倉毒氣未盡上冲心肺補清皆在難進扶過十八日後癰毒尚可療治若發疳

蝕恐難全愈 炒麥冬 白沙參 苡仁 川貝 炒銀花 地骨皮

沈三漿未充滿忽然乾涸即是倒靨咬牙寒戰元氣大虧非峻補難挽

人參 鹿茸 炒當歸 桂心 桂圓 煨木香 仍當加在藥一二味

程回痂太早餘毒流走四肢臂腿腫痛議活血解毒

連翹 小生地 當歸 赤芍 刺蒺藜 丹皮 夏枯草 銀花 酒半小杯

吳四倉咳嘔逆腹膨都是餘毒內閉小便少大便溏不得爽倘再加喘急便是棘手必得瘍毒外發可望挽

回桑白皮 大腹皮 萊菔皮 茯苓皮 飛滑石 生甘草梢

查痂後發癰係肺熱未清宜辛涼佐以解餘毒

凡病皆然

諸茶切近之和平又能沈着變化備前人之

加批附說不西醫書

連翹 杏仁 桑皮 地骨皮 黃芩 木通 銀花 牛蒡 夏枯草

吳謝 薄漿回痲毒氣未化已有疳蝕之患理進清解餘毒但勉進稀粥澹瀉未罷胃未旺相脾氣積弱識以

滲利分消做古痘毒當利小便意 桑皮 地骨皮 連翹 茯苓 川貝 杏仁 銀花

某 痘未退痲痧火內逼為喘 川連 犀角 連翹 銀花 元參 大貝 丹皮 地骨皮

又 痧火太清 川連 黃芩 山梔 連翹 銀花 杏仁 甘草

沈 薄漿回痲毒氣未盡只宜清肺解毒 炒川貝 茯苓 杏仁 車前 炒澤瀉 炒銀花

徐謝 六疳毒已發咳喘未止痲落如麤肌色皓白雖屬氣血交虛但痘後餘毒未可驟補議進和脾胃利溼方

法疳毒宜速調治恐日久恐虛致有慢驚之慮

汶仁 川斛 茯苓 百合 廣皮 炒澤瀉

沈二 朝瘡失音不嗜食物書則稍安暮夜煩躁此肺熱未肅磨耐多日體氣陽亢陰虧肝風內熾突起驚厥

可慮 地骨皮 甘草 生地炭 萊菔皮 炒丹皮 炒川貝 川斛

李朝 二十納食嘔吐脾胃不和肝風內動肢浮肉腫治宜培土制木以緩肝風冀免驚疳之患

人參 茯苓 芍藥 生穀芽 藿香 廣皮 半夏麴

馮二 朝痲腐粘連神氣昏昧元為漿泄而乏變幻慢驚欲脫此皆穉年陽亢陰虧毒明目竄肝陰之絕恐難再

振 人參 茯苓 神 棗仁 歸身 炙草 炒杞子 生白芍

又 七朝陽極則陰涸為躁反其劇自從陰分設法益虛和陽為治

人參 熟地 芡實 茯苓 建蓮 遠志 炒山藥 五味

又 點來不爽頂有水痕微焦此時氣傳染胎毒未發乃水赤之類痘耳

連翹 牛蒡 丹皮 赤芍 飛滑石 木通 山梔 甘草

邵 痘中復感溫邪口鼻觸入由中道以佈及絡脉目泛失明左肢不舉少腹突起腫滿兩足皆痿詢知痘見六日陡然頭搖煩躁而得小便淋滴大便漸塞乃厥陰肝熱痲癰失其疎泄內風旋轉腑陽不通經言養腫

所未備其去其純其如我其有如此名而家不師法偏拾庸妄人唾餘不論何人虛實總以石膏大黃種惡毒之劑灌死年枉症之當出死載全道不知

暴脹皆風火變動。至於迅速病來。其能食稍運。熱化自可殺穀。考古辛散酸泄甘緩三法。雖圖腑絡壅結。仲景於厥陰條例。有下之利不止者。死之大戒。議進鹹苦以通在下結。熱愚見若此。再與高明商酌良治。川

棟子 小茴 蘆薈 山柅 橘紅 龍膽草 方諸水 七匙

自古治痘名家。不啻廿數。各有精確卓識。以補前人之未備。雖各有所偏。實所以相濟也。醫者貴統彙群書。隨宜施治。安可執偏隅管見。以應無窮之變哉。先生治痘。夙稱神奇。觀其案中。寒熱攻補。不膠於一見。如毒水深伏。氣血壅遏者。藉芳香以搜逐。用紫雪丹。氣滯血凝。毒重火伏者。以酒大黃石膏膏。皮桃仁荊芥犀角猪尾血之類。主治。肝肺毒火不宣。氣血有焦燔之勢者。用犀角羚羊紫雪丹皮石膏。鮮生地之類。元氣不支。陽虛獨陷。而見反白濕爛泄瀉嘔惡等症者。用辛香溫煦。如陳文仲之法。為要。氣血極虛。而漿清塌痒。全無貴症相兼者。當峻補氣血。用參歸鹿茸湯。及坎炁湯之類。氣虛莫外乎保元。及四君子。血虛不離於四物。及補血湯。又於氣虛血熱者。補氣之中兼涼血。血虛氣滯者。補血之中佐辛香。用攻法須分部位經絡。用補法當辨寒熱燥濕過清則有水伏之慮。偏熱則有液涸之虞。此皆先生採擇先賢之法。因人見症而施治。可謂善法古者矣。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。如痘點既起。或不慎風寒。而營衛凝滯。或縱慾飲食。而氣機呆鈍。以致身熱不食。腹膨嘔惡泄瀉。漿水不行。不究治其病因。但執清寒膩補。當有凶危之變。亦有痘形雖重。若神甯安靜。飲食二便如常。聲音清響。調理得宜。亦可轉危為安。大凡形老而色鮮明者。雖其惡變幻恒少。形嫩而色晦滯者。雖稀疎變幻恒多。表裏相參。審症的確。然後設法處治。方無貽誤。至於逆症條款已現。雖自昔名醫亦莫能挽救。小兒天枉者。不可勝數。深可憐憫。通年以來。幸有種痘一法。盛行於世。實可挽回造化。凡有小兒者。俟週歲後。即可選用種痘之苗。引而發之。百不失一。此誠補痘科之未備。而為最上一乘之法也。正痘有先賢諸成法。避險有種痘之良方。痘症於是乎大全矣。蔭願安痘之發也。一由乎胎毒內伏。一由於外感時邪之氣。引導而出其症之順逆。若內毒輕而外感之氣亦輕者。痘必稀疎。此為順症。若內毒輕而外感之氣重者。慮其過悶不齊。不易灌漿。若能至灌漿。則時邪漸退。後易收功。此為先重後輕症。若內毒重而外感之氣輕者。慮其灌漿已後。毒難盡

修此等惡醫有針心也

種痘之法此段詳種痘之法明白使人能知人之能信而為之全活不少仁人之言其利溥哉然有命焉愚魯之人

洩。不易收醫結痂。恐發痘毒。用蝕之患。此為先輕後重症。若內毒重而外感之氣亦重者。痘必稠密。色不鮮澤。發熱見點之後。一路踏踏。難以收功。此為逆症。然胎毒之輕重。人皆易明。若外感之氣。人莫能曉。夫天地間祇有六氣。氣平則為和。氣不平則有勝復。勝復至極。則為瀉氣。為痘疫氣。瘴氣。更有道途中穢濁氣。人若感之。不拘老幼俱病。今出痘所感之氣。則異乎是。此氣獨與未洩胎毒之小兒。兩相感觸。未聞痘症盛行之時。已出過痘之兒。亦染病也。考是氣自古迄今。從未有人申說明白。確定為何氣。故前賢於痘症一科。未嘗不殫心瘁慮。立論著方。因不明其氣之源。不無偏執之弊。有喜於寒瀉者。有喜於溫托者。有先用寒瀉而後用溫補者。有先用溫托而後用清火解毒者。更有不審見體之虛實寒熱。俱宗費建中救偏瑣言。每於發熱見點時。緊用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等。不知費氏之書。名為救偏。乃救憤用熱藥之偏耳。若本不偏。而宗其法。則不偏者。反至偏矣。嬰兒之命。其何以堪。幸古有種痘良法。相傳至今。其法簡易靈驗。至穩至當。蓋正痘因外感時邪而發。種痘則種於無病之時。故所出稀疎。輕者不過幾十粒。此豈非避危就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出。彼此相較。其理自明。假使一村之中。有百兒出天花。未嘗不延醫服藥。若能八九十收功。人咸稱為太平痘矣。其有竭力調治。而損傷幾及一半者。不聞其歸咎於醫生。惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不容其托足於此一村矣。人何篤信醫生。而不相信種師耶。與其委命於天。孰若以人功挽之。以此相較。則當種與不當種。自決矣。至於種法。全在乎好苗。夫苗者。即取他兒之痘痂也。必要用種出之痘。落下之痂。謂之種苗。此苗之中。毫無天行時毒之氣在內。故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中。有時行之氣。若不辨而用之。名雖為種。實與傳染他兒天行時痘之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內。尚要揀擇。必取痘粒稀少。其色紅潤。灌漿濃厚所結之痂。厚實光澤尖圓者。此氣血充足。陰陽合德。上好之苗也。俟痂落下。用紙包好。記明何日收得。收於新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸穢熱之氣。其苗在北方天氣涼。春月之苗。一月之內尚可種。冬月之苗。四五十日尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五日春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。欲覓此等種苗。先訪有人家正在

終不信也 此等嗜利之徒 害人不淺 井令世人 連種法 症亦不 信矣

脾虛胃弱 和氣不

沈

(疳)

種痘之際向彼明言其故懇求四五粒即可源源而種或平日於同道種師內相與一二位志誠老實者議明彼此互借則苗亦可不斷亦有膽大種師於五六月中覓家貧莊實之兒種之不惟不索酬謝反肯津貼銀錢次遞傳種三四箇兒延至七月則苗亦可以不斷矣近有種師因種苗已斷權取時苗種之往往有種出稠密棘手重痘者或時苗之過也不知時苗之性即選上好者亦必要傳種過四五兒俱各順當者其苗性始和平方能與種苗相等至於下手種法尤須詳慎凡種一兒用痘痂三四粒兩兒則用六七粒放於乾淨茶杯中傾入清水四五茶匙用小指尖在內三四攪則痂已溼急將水傾去用柳木杵研其杵約長四寸粗如筆管兩頭要光圓研十數轉足矣如痂太乾加入清水一二滴切不可太潮只要研如乾漿糊狀用彈熟新棉花捏一小團如棗核大兩頭要圓其長短粗細量兒鼻孔之大小為之其綿團不可太鬆軟鬆則苗氣易往外洩且見涕則縮小易於脫出漿棉團只用一頭醮痂末糊於上塞兒鼻中男左女右塞不可太進太進則兒不適意亦不可太出太出則易於脫落總要寬緊淺深適中為妙塞後勿放小兒用手拈出若被噴嚏打出急將苗仍塞入鼻下苗後以六個時辰為度天氣熱早取出數刻天氣寒多留數刻痘苗取出之後其苗氣漸次傳遍五臟至七日或八九日始發熱發熱三日而見點矣此誠至穩至當之種法也種痘之苗不過痘痂一味令各處種師說稱痘痂之外尚要加他藥為引導者此係惑人謠語切勿信之既種後將發熱時小兒頸項內男左女右必發一小塊狀如痰核此乃毒氣結聚於此故痘發必稀疏此塊不必醫治待落痂後則塊亦漸消矣若用時苗種者項中無塊當以此辨之又間有驚痘於發熱時小兒忽然驚搖手足躁不語目上視有片時即平復者有發一二個時辰者有發一次者有發兩次者總屬不妨斯時切不可擾動叫喚之待其自平即已不必服藥須預對痘家說明免其憂慮以上諸論皆時下種師之秘訣也若夫辨兒之可種與不可種須察兒體之虛實及有無宿病若調治之法當節飲食適寒溫防驚嚇此皆種師俱各明悉茲不重贅鄭望頤

穉年歌乳進穀脾胃氣饒少運腹膨目翳是為五疳夏日中土司令久病投以補氣恰令調其脾胃近日

增補 品登 上海華僑記書局印

嘔吐泄瀉身熱乃寒暄失和致食不易化小溲既少腑氣不和余幼科久疎憶錢氏每以調中為主而驅邪

內傷
夾滯
生積

張四 五疳腹脹數月法當疎補 人參 茯苓 麥芽 炒查肉 廣皮 半夏 湖蓮
又 照前方去半夏湖蓮加澤瀉

陳五 官人自汗短氣咳嗽風溫見症肌腠有煙瘴之形與疹瘡腑病不同但幼穉生陽充肺春深入夏形質日減色脈是虛而補脾辛甘不應腹滿按之自爽二便原得通利腹痛時發時止痛已即能飲食考幼科五疳與大方五勞相類疳必因鬱熱為積為蟲此飲食不充肌膚也病來非暴攻之由漸再論疳熱蟲積古人治肝治胃恒多而潔古東垣於內傷夾滯每製丸劑以緩治取義乎渣質有形與湯飲異歧刻下溫邪擾攘之餘聊以甘涼之屬清養胃陰以化肺熱其辛氣泄表不宜進

食傷
脾胃

甜杏仁 麥冬 地骨皮 生甘草 冬桑葉 玉竹 和入青甘蔗汁一酒杯
做治疳熱羸瘦從陽明厥陰疏通消補兼施

沈 人參 黃連 蘆薈 川連子 使君子 茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山查

某 飲食物不節脾胃受戕腹膨大便不調此屬脾疳

焦木 茯苓 廣皮 益智仁 大腹皮 木瓜 炮薑 炒神麴

吳 飢能食色枯形瘦暮熱泄瀉此皆口腹不慎值長夏溫熱脾胃受傷將成五疳

青蒿梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍 炒山查 廣皮 茯苓 澤瀉

王 五疳已久脾胃受傷食物不運腹膨漉瀉此積聚未清中焦先斂完穀不化腫脹皆至難治之症

丁香餅

疳者乾也小兒腸胃柔嫩若乳食失調甘肥不節運化不及停積發熱熱久津乾此因積成疳者也或五臟偏熱或因病後或醫藥誤下致亡失津液脾不輸化積滯不行此因乾致積者也故五疳不離乎脾胃

溫邪

暑濕

傷胃陽

脾胃

其治法胃滯當消脾胃宜補熱者用苦寒清火冷者宜辛溫健運有蟲者兼用殺蟲之品其虛者各隨本
臟補其母總宜丸劑緩調不能旦夕速功或用雞肝納入治疳樂敷食最為有效 陸履安
此是幼科症不僅名家
可稱大家矣敬服敬服

吐瀉

吳

身熱吐乳自利溫邪內擾脾胃擬年防驚 藿香葉 飛滑石

王

未到周歲熱犯脾胃嘔逆下利壯熱不已最多慢驚之變

某

暑邪犯肺交土王用事脾胃素弱不運暑溼腹鳴泄瀉惡心露睛怕成慢驚 慢驚二字亦有此名

章

傷食一症考古用五積散之義取暖使其腐熟也此上湧頻吐大便溏瀉胃氣益傷陽氣坐困日甚清不
升濁不降痰潮氣嘔腹鳴便遺睡則露睛黑唇紫小溲竟無陽不流行津液自耗有慢驚昏厥之危議通
胃陽讀錢氏薛氏之書能知此意

人參

藿香 炒厚朴 木瓜 川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

又

陽明胃陽受傷胸病以通為補若與守中必致壅逆昨日用方通勝於補獲安幼穉非真虛寒之病

又

鼻明汗出齟血陽明虛胃氣未和不宜涼降六神湯加炒廣皮

又

面色痿黃脈形弦遲湯水食物入咽吐出神氣憊憊欲如昏寐此胃陽大乏風木來乘漸延厥逆俗稱慢
脾險症幼穉弱質病延半月有餘豈可再以疫樂玩忽宗仲景食穀欲嘔者吳茱萸湯主之

人參

藿香 炒厚朴 木瓜 川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

又

昨用泄木救胃土法安受不見嘔吐然中焦陽氣太虛濁氣上僭則為昏厥津液不升唇口乾燥豈可苦
寒再伐生氣今如寐神倦陽陷於陰何疑仲景通陽理虛後賢錢氏薛氏皆宗其義

又

鼻明汗出齟血陽明虛胃氣未和不宜涼降六神湯加炒廣皮

又

面色痿黃脈形弦遲湯水食物入咽吐出神氣憊憊欲如昏寐此胃陽大乏風木來乘漸延厥逆俗稱慢
脾險症幼穉弱質病延半月有餘豈可再以疫樂玩忽宗仲景食穀欲嘔者吳茱萸湯主之

人參

藿香 炒厚朴 木瓜 川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

又

昨用泄木救胃土法安受不見嘔吐然中焦陽氣太虛濁氣上僭則為昏厥津液不升唇口乾燥豈可苦
寒再伐生氣今如寐神倦陽陷於陰何疑仲景通陽理虛後賢錢氏薛氏皆宗其義

又

鼻明汗出齟血陽明虛胃氣未和不宜涼降六神湯加炒廣皮

又

面色痿黃脈形弦遲湯水食物入咽吐出神氣憊憊欲如昏寐此胃陽大乏風木來乘漸延厥逆俗稱慢
脾險症幼穉弱質病延半月有餘豈可再以疫樂玩忽宗仲景食穀欲嘔者吳茱萸湯主之

人參

藿香 炒厚朴 木瓜 川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

增補

上海章福記書局校印

六

吐瀉

六

上海章福記書局校印

傷內伏

人參 炒半夏 茯苓 廣皮 煨薑 南棗 此方偏於溫補
蘇 周歲幼小強食腥麪身不大熱神氣呆鈍上吐下瀉最防變出慢驚此乃食傷脾胃為有餘因吐瀉多擾

胃虛

動正氣致傷耳 廣皮 厚朴 茯苓 廣藿香 生益智 木朮
陳 涼風外受內鬱熱伏身發癰疹便解血膩煩渴得汗僅解外風在裏熱氣未和啾唧似痛大便仍有積滯
清裏極是但半歲未啖穀食胃弱易變驚症少少與藥

胃不和

藿香梗 川連 黃芩 生白芍 淡竹葉 廣皮 滑石 炒查面
余 形神衰弱癰泄純白而癰瘍疳蝕未罷氣喘痰井總是損極令胃虛納減倘內風掀動驚 立至孰不知

胃氣逆

因虛變病也 人參 炒粳米 茯苓 炒神 炒廣皮 炒荷葉蒂
呂 痰中帶血食已嘔吐因驚小氣逆令胃不和與黃連溫膽湯因年弱質怯以金石斛代之

濕熱

溫膽湯去甘草 加金石斛薑汁
某 蛇厥久嘔少食 人參 半夏 茯苓 廣皮 薑汁

久痢 楊梅 木清

某 蛇厥必腹痛欲嘔 安胃丸
王 久瀉兼發瘡痍是溼勝熱鬱苦寒必佐風藥合乎東垣脾宜升胃宜降之旨
人參 川連 黃柏 炙草 廣皮 白朮 神麴 麥芽 柴胡 升麻 羌活 防風

中寒 無本 驚急 急若 不必

何 十夏病入冬仍腹痛下積 穉年不慎食物腸胃屢滯痢久陰傷身熱發倉先與理陰疎腑滯濁
熟地炭 當歸炭 山查 炮薑 炙草 茯苓 麥芽
世俗所謂慢驚風者不知起於何代創是名者其遺禍於嬰孩已不啻萬億矣蓋就其所指之病而論如
吐瀉兼作氣怯神倦虛煩搖弱痰喘不食脈虛無神睡則露睛等症乃與病名毫不相關其所指之症是
或由外感未清或諸病誤治或飲食失調或由病後而成以致吐則傷胃瀉則傷脾土衰則不生金中虛
未必乘尅是皆肝脾脾胃之病治宜急顧本原扶土生金安胃和肝溫養腎陽猶虛弗及若就其名而治
之醫家胸中先執慢驚風三字之名概用重墜之藥鎮驚定怯或散風清火豁痰破氣其遺禍可勝言哉

富用 至寶 牛黃 等精 靈入 心之 藥為 妙

熱邪 阻竅 陰風 絡入 脾 邪通 心胞 熱邪 傷陰 肝風 動

蓋是症因中土已虛風木已動延久必現出似驚之狀耳。實則並非因驚而起也。奈何竟以慢驚風名之。豈非指鹿為馬乎。要之慢字若以急慢為論。則凡病之緩者皆可稱為慢。惟驚乃屬急症。不可以慢字加之。若以傲慢肆慢而講於病名上。又甚荒唐。惟願觀幼科書者。當知其背謬不通。勿為其所惑。則幸甚。今觀先生案中。並未嘗用及驚藥風藥。是明微也。此症更當兼參東垣立齋景岳諸法。則無遺蘊矣。華岫雲

〔癰疽殿〕

周

癰年癰疽。病發迅速。醒來二便自通。此係陽氣拂逆。阻其靈竅。姑與清絡宣通方法。
犀角 遠志 膽星 黑山梔 元參 葛蒲 連翹 竹葉心

唐

面青脣濡。神呆古縮不伸。語寂寂然。癰症四肢皆震。口吐涎沫。此陰風已入脾絡矣。
人參 生朮 蜈蚣 全蝎 薑汁炒南星 薑汁炒白附

某

伏邪經旬。發熱不解。唇焦舌渴。暮夜神識不清。慮其邪陷心胞。有瘰癧之變。
犀角 捲心竹葉 鮮石葛蒲 連翹 元參心 浙生地

又

化熱液枯。生地 竹葉心 丹皮 元參 麥冬 生白芍

吳

冬月伏邪。入春病自裏發。裏邪原無發散之理。更誤於禁絕水穀。徒以苓連枳朴。希圖清水消食。以退其熱。殊不知胃汁再劫。肝風掀動。變幻瘰癧危疴。診視舌絳鼻竅黑燥。肌膚甲錯。乾燥渴欲飲。中痰熱。何一非肝腎陰液之盡。引水自救。風陽內熾。躁亂如狂。皆緣醫者未曾曉得溫邪從陰裏熱為病。清熱必以存陰為務耳。今延及一月。五液告涸。病情未為穩當。所恃童真食穀多歲。錢氏謂幼科易虛易實。望其尚有生機而已。阿膠 生地 天冬 川石斛 雞子黃 元參心

又

鹹潤頗安。其熱邪深入至陰之地。古云熱深厥深。內涸若此。陰液何以上承。慮其痞融阻咽。故以解毒佐之。元參心 真阿膠 真金汁 細生地 天冬 銀花露

又

胃未得穀。風陽再熾。入暮煩躁。防其復厥。生地 白芍 麥冬 金汁 阿膠 牡蠣 金銀花露

又

神識 蘇常欲煩躁皆是陰液受傷肝風不息議脈陰和陽

生地 牡蠣 阿膠 麥冬 木瓜 生白芍

又

膈中熱熾神躁古乾痰多咳喘皆大刑肺金宜用紫雪丹一錢

小兒癰瘰厥本屬險症十中每死二三奈令之患者十中常死六七其故何也蓋緣醫者不察病情概以
 芩連鉤藤葛蒲橘紅等夾金石之藥投之以冀清火降痰而已此醫之不善治也而最可惡者尤在病家
 之父母失於調治有名為愛之實以殺之之故何也小兒諸症如發熱無汗煩躁神昏譫語之頃或戰汗
 大汗將止之時或嘔吐泄瀉之後或瘰厥漸起或便久閉而通然大便或灌藥之後斯時正元氣與病邪
 交戰之際若能養得元氣一分即退一分病邪此際小兒必有昏昏欲睡懶於言語氣怯神弱身不轉動
 之狀此正當養其元神冀其邪退正復乃病家父母偏於此際張惶驚恐因其不語而呼之喚之因其不
 睡而頻叫醒之因其不動而搖之拍之或因微有昏譫而必詳詰之或急欲以湯飲進之或屢問其痛瘰
 之處嘵嘵不已使其無片刻安甯如此必輕變為重重變為死矣更有豪富之家延醫數人問候者多人
 房中聚集者多人或互談病情病狀夜則多燃燈燭以照之或對之哭泣不已或信巫不信醫祈禱疊興
 舉家紛擾此非愛之實以殺之也試以大人之病情體貼之抑好安然寂靜乎抑好宣譁動擾乎此理概
 可知也予曾見一孩兒患暑溼初瘰半月有餘病勢甚重醫者投以蒼朮白虎湯夜半發汗至寅時身體
 漸涼冷汗不止默默倦睡口不肯言氣息甚微醫云六脈安靜並不煩躁此病退之象也因戒其父母切
 勿擾動直至申時汗止聲出而病已霍然矣可見大人與小兒諸病總要安然寂靜為主其調養之法有
 非筆墨所能罄者惟在病家能細心體會醫者能諄諄告戒勿以余之言為迂拘則幸甚更有幼孩發熱
 昏迷手足厥冷竅路阻塞哭不出聲藥難下咽斯時惟有請善於推拿者可使之時甦醒然後再議用藥
 至於治法癰瘰厥本屬三症與大方相類茲不重贅

華油雲

小兒無癰症不必另立一門
 即瘰厥亦僅病中之一症耳

陽明熱

陳以濕傷脾胃失調下注小腸蟲從溺竅而出糞溲完穀不可溫補

黃柏 茯苓 猪苓 槐米 澤瀉 草薢

又蟲自小便而出經月瀉皆粘膩及不欲食物此非虛寒皆溫蠱內蘊運化失司當苦藥勝溼兼理幼穉疳積

黃連 黃柏 茅朮 厚朴 澤瀉 槐角子 木通 使君子 淡竹葉三服從時

糞蟲濕熱生蟲腹痛便溲惡食川連 胡連 生白芍 烏梅 枳實 川椒 炒查 青皮 水法丸

許腸有濕熱生蟲蟲用苦寒引導小腸

苦楝皮 北秦皮 槐角子 胡粉 黃柏 牡蠣 生研末猪肚腸一條漂潔煮丸

張汁丹溪云小兒盜汗不須醫以體屬純陽汗乃陽泄故也至於瘡多溼熱浮腫脹滿得攻下而消此六腑以

通為補也其小腹痛屢發亦因溼熱生蟲生積當以酸苦泄熱

川連 胡連 生白芍 雞肫皮 炒查肉 蘆薈 枳實 苦楝皮 烏梅肉搗丸

汪汁肛漏時腫瀉過白蟲手足陽明熱甚

槐角子 黃柏 樞子肉 生茅朮 檉根白皮 小川連 茯苓 炒地榆 蒸餅為丸

蟲類雖多其由皆有飲食停滯濕熱鬱蒸化變而成者也凡面色痿黃飲食不為肌膚起伏作痛聚散不

定痛止即能飲食者皆有蟲積或從嘔或從小便或從大便而出治法當觀其微甚若蟲勢驟急者當用

攻逐之劑如黑豆檳榔大黃胡粉山稜菝葜之類蟲去則調其脾胃緩者用酸苦泄熱躁溼兼以相制相

畏之品如川連胡連蘆薈苦楝烏梅川椒雷丸蕪荑史君樞肉之類脾弱者兼運其脾胃滯者兼消其滯

蟲症治法大略如此 陸履安

治蟲有緩治之法其病熱甚輕而日久當用膏丸等藥兼補兼消之若病勢危

急者必另有緩瀉之方并奇藥秋方可殺蟲去積否則元氣消乏不可補救矣

案中用諸方開載於後以便初學之士查閱

桂枝湯 桂枝 白芍 炙草 生薑 大棗 桂枝加附子湯 即桂枝湯加附子 苓桂木甘湯 茯苓 白朮 桂枝 炙草 小建中湯 白芍 桂枝 炙草 生薑 大棗 鉅糖 桂枝去芍藥加蜀漆

龍骨牡蠣救逆湯 桂枝 炙草 生姜 大棗 蜀漆 龍骨 牡蠣 〇 生姜瀉心湯 生姜 乾姜 半

夏 黃芩 黃連 甘草 人參 大棗 甘草瀉心湯 甘草 乾姜 半夏 黃芩 黃連 大棗 半

夏瀉心湯 半夏 黃芩 黃連 人參 炙草 乾薑 大棗 附子瀉心湯 附子 黃芩 黃連 大

棗 黃芩湯 黃芩 白芍 甘草 大棗 〇 黃連阿膠湯 黃芩 黃連 白芍 阿膠 雞子黃 〇 旋覆

花代赭石湯 旋覆花 代赭石 人參 半夏 甘草 生姜 大棗 〇 炙甘草湯 炙甘草 芍藥 黃連 黃芩

桂枝 人參 麻仁 生地 阿膠 麥冬 生姜 大棗 烏梅丸 烏梅 人參 當歸 黃連 黃柏

桂枝 乾姜 蜀椒 附子 細辛 〇 白虎湯 石膏 知母 甘草 粳米 白虎加入參湯 即白

虎加入參 〇 竹葉石膏湯 竹葉 石膏 人參 麥冬 半夏 甘草 粳米 〇 白頭翁湯 白頭翁

秦皮 黃連 黃柏 大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連 〇 猪膚湯 猪膚 白蜜 白粉 四逆湯

甘草 乾姜 附子 〇 人參四逆湯 即四逆湯加入參 通脈四逆湯 即四逆湯加葱白 更有隨

症加法 〇 通脈四逆加猪膽汁湯 即四逆湯加猪膽汁 〇 白通湯 葱白 乾姜 附子 〇 白通加

猪膽汁湯 即白通湯加猪膽汁入尿 〇 木附湯 白木 附子 甘草 生薑 大棗 〇 桂枝附子湯 桂

枝 附子 甘草 生薑 大棗 〇 理中湯 丸同 人參 甘草 白木 乾薑 〇 吳茱萸湯 吳茱萸 人

參 生薑 大棗 〇 真武湯 茯苓 白芍 白木 附子 生薑 〇 桃花湯 赤石脂 乾薑 粳米 〇 麻

黃杏仁甘草石膏湯 麻黃 杏仁 甘草 石膏 小青龙湯 麻黃 桂枝 白芍 乾薑 細辛 甘

草 五味子 半夏 梔子豉湯 梔子 香豉 〇 桃仁承氣湯 桃仁 桂枝 大黃 芒硝 甘草 四

逆湯 柴胡 枳實 白芍 甘草 〇 白散 桔梗 貝母 巴豆 〇 五苓散 猪苓 澤瀉 白木 桂枝

茯苓 猪苓湯 猪苓 茯苓 澤瀉 阿膠 滑石 〇 牡蠣澤瀉散 牡蠣 澤瀉 海藻 蜀漆 葶

藶 商陸根 瓜蒌根

右仲景傷寒中方
龍甲煎丸 鼈甲 烏扇 黃芩 柴胡 鼠婦 乾姜 大黃 芍藥 桂枝 葶藶 石葦 厚朴