

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷八

訂正仲景全書傷寒論註厥陰全篇目錄

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

白頭翁湯

御纂醫宗金鑑卷八

訂正仲景全書傷寒論註

辨厥陰病脈證并治全篇

厥陰者陰盡陽生之藏與少陽爲表裏者也
故其爲病陰陽錯雜寒熱混淆邪至其經從
化各異若其人素偏於熱則邪從陽化故消
渴氣上撞心中疼熱虵厥口爛咽痛喉痺
癰膿便血等陽證見矣若其人素偏於寒則
邪從陰化故手足厥冷脈微欲絕膚冷藏厥

下利除中等陰證見矣所以少陽不解傳變厥陰而病危厥陰病衰轉屬少陽爲欲愈陰陽消長大伏危機茲以陰陽從化厥熱勝復之微旨詳發於篇中俾臨證者診治有要道焉

厥陰之爲病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食則吐衄下之利不止

註

此條總言厥陰爲病之大綱也厥陰者爲陰盡陽生之藏邪至其經從陰化寒從陽化熱

故其爲病陰陽錯雜寒熱混淆也消渴者飲水多而小便少乃厥陰熱化而耗水也厥陰之脈起足大指循股內入陰中環陰器抵少腹貫心膈其注肺熱邪循經上逆膈中故氣上撞心心中疼熱也饑而不欲食者非不食也因食則動虵而吐故雖饑而不欲食食則吐虵也夫消渴多飲饑不能食則胃中所有者但水與熱耳若更以厥陰熱氣挾虵撞疼誤認爲轉屬陽明之實痛而下之則胃愈虛

必下利不止矣

集註

成無已曰邪自太陽傳至太陰則腹滿而噤

乾未成渴也至少陰則口燥舌乾而渴未成
消也至厥陰則成消渴者以勢甚能消水故
也又張卿子云嘗見厥陰消渴數證舌盡紅
赤厥冷脈微渴甚服白虎黃連等湯皆不能
救蓋厥陰消渴皆寒熱錯雜之邪非純陽亢
熱之證可比也

魏荔彤曰此申解厥陰傳經熱邪爲患歷舉

其證以禁誤下也傷寒之邪傳入少陰爲裏中之裏及自少陰傳厥陰又爲三陰之極盡處矣陰盡處受邪無所復傳却同少陽爲升降之出路少陽無下法厥陰陰邪亦無下法下之爲誤可知矣首標消渴二字凡熱必渴而寒濕隔阻正氣亦有渴者然其渴雖欲飲水必不能多未有渴而飲飲而仍渴隨飲隨消隨渴若是者則消渴爲傳經之熱邪傳入厥陰無疑也

厥陰病渴欲飲水少少與之愈

註

厥陰病渴欲飲水者乃陽回欲和求水自滋
作解之兆當少少與之以和其胃胃和汗出
自可愈也若多與之則水反停漬入胃必致
厥利矣

集註

張璐曰陽氣將復故欲飲水而少少與之者
蓋陰邪方欲解散陽氣尙未歸復若恣飲不
消反有停蓄之患矣

汪琥曰厥陰有消渴一證不言自愈者蓋熱

甚而津液消爍雖飲水不能勝其燥烈乃邪氣深入未愈之徵也而此條之渴欲飲水與之愈者蓋其熱非消渴之比乃邪氣向外欲解之機也兩者自是不同

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

按

厥而心下悸者之下當有以飲水多四字若無此四字乃陰盛之厥悸非停水之厥悸矣何以卽知是水而曰宜先治水耶

計

傷寒厥而心下悸者不渴引飲乃陰盛之厥
悸也若以飲水多乃停水之厥悸也故宜先
治水却治其厥當與茯苓甘草湯卽桂枝甘
草湯加茯苓生薑也桂枝甘草補陽虛也佐
生薑外散寒邪則厥可回矣若茯苓內輸水
道則悸可安矣此先水後厥之治也蓋停水
者必小便不利若不如是治之則所停之水
漬入胃中必作利也

按

傷寒太陽篇汗出表未和小便不利此條傷

寒表未解厥而心下悸二證皆用茯苓甘草
湯者蓋因二者見證雖不同而裏無熱表未
和停水則同也故一用之諧和榮衛以利水
一用之解表通陽以利水無不可也此證雖
不曰小便不利而小便不利之意自在若小
便利則水不停而厥悸屬陰寒矣豈宜發表
利水耶

集註

方有執曰金匱云水停心下甚則悸者是悸
爲水甚而厥則寒甚也寒無象而水有形水

去則寒消而厥亦愈入胃者水能滲土也

喻昌曰太陽篇中飲水多者心下必悸故此厥而心下悸者明係飲水所致所以乘其水未漬胃先用茯苓甘草湯治水以清下利之源後廼治厥庶不致厥與利相因耳

程應旄曰寒因水停而作厥者其證以心下悸爲驗厥陰有此多因消渴得之水其本也寒其標也不先水而先厥且防水漬入胃敢下之乎

汪琥曰厥而心下悸者明係飲水多寒飲留於心下胸中之陽不能四布故見厥此非外來之寒比也故法宜先治水須與茯苓甘草湯而治厥之法卽在其中矣蓋水去則厥自除也不爾者謂不治其水則水漬下入於胃必作利也

吳人駒曰氣脈流行不循常道是爲悸逆名之曰厥但厥有痰實寒熱氣水之不同此因於水者也水氣不循故道則水之寒氣上乘

於心而爲悸故治水卽所以去悸而厥亦回
設或不然則水之甚者其土沮洳因爲之利
矣

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時
者此爲藏厥非虵厥也虵厥者其人當吐虵今病
者靜而復時煩者此爲藏寒虵上入其膈故煩須
臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自
吐虵虵厥者烏梅丸主之又主久利

按此爲藏寒之此字當是非字若是此字卽是

藏厥與辨虺厥之義不屬

註

首條總論厥陰陽邪化熱此條詳辨厥陰陰邪化寒以明藏厥虺厥之不同而出其治也傷寒脈微而厥厥陰脈證也至七八日不同手足厥冷而更通身膚冷躁無暫安之時者此爲厥陰陽虛陰盛之藏厥非陰陽錯雜之虺厥也若虺厥者其人當吐虺今病者靜而復時煩不似藏厥之躁無暫安時知非藏寒之躁乃虺上膈之上也故其煩須臾復止也

得食而吐又煩者是虵聞食臭而出故又煩
也得食虵動而嘔虵因嘔吐而出故曰其人
當自吐虵也虵厥主以烏梅丸又主久利者
以此藥性味酸苦辛溫寒熱並用能解陰陽
錯雜寒熱混淆之邪也藏厥者宜吳茱萸湯
兼少陰者宜四逆通脈附子等湯臨證者酌
而用之可也

集註方有執曰脈微而厥統言之也膚冷言不獨
手足以見陽氣內陷也藏厥言非在經也

喻昌曰衄微而厥則陽氣衰微可知然未定其爲藏厥虵厥也惟膚冷而躁無暫安時乃爲藏厥藏厥用四逆及灸法其厥不同者死若虵厥則時厥時煩未爲死候但因此而馴至胃中無陽則死矣

程知曰言厥有藏與虵之別也藏厥者腎藏之陽不行也虵厥者手足冷而吐虵胃府之陽不行也虵厥者虵動則煩而有靜時非若藏厥之躁無暫安時也此胃陽病而無關於