

醫
統
三
脈
全
書

祕傳證治要訣目錄

卷一諸中門

中風

附破傷風漏風

中氣

中寒

中暑

中溼

中惡

附霍亂厥

卷二諸傷門

傷風寒

傷暑

傷溼

附痺

傷酒

傷食

卷三諸氣門

七氣

痞塞

附噎膈

積聚

腫

蠱脹

脚氣

附下血

陰頰氣

附玉莖疼

手氣

小腸氣

卷四諸血門

鼻衄

舌衄

肌衄

牙宣

吐血

咯血

嗽血

附肺癰

小便血

破傷血

瘡毒血

大便血

卷五諸痛門

頭痛

眼眶骨痛

附眼梁痛

牙痛

咽喉痛

附上一壅

膈痛

附心瘥

臂痛

飲流入臂

肩背痛

心痺痛

脇痛

腰痛

腹痛

卷六諸嗽門

嗽證

哮喘

嘔吐

附惡心

吐血

停飲伏痰

翻胃

不喜食

噫氣吞酸

咳逆

卷七寒熱門

瘧寒熱

獨寒

獨熱

潮熱

卷八大小腑門

小便多

淋閉

尿血

白濁

遺精

附遺瀝
夢遺

三消

大便秘

溏泄

交腸

瀉血

腸風臟毒

附痔漏
腸癰

痢疾

附痢後
風脫肛

卷九虛損門

五勞

盜汗自汗

眩暈

虛炎短乏

驚悸

附健忘

愷忬

五癰

顛狂

附心風

不寐

卷十拾遺門

渴病

疽

眼疾

耳

鼻

口舌

附聲音

卷十一瘡毒門

癰疽癰毒

附發背腸癰露瘕

瘡癰疥

附疥瘡

癩

豆疥

癩風

附下疳瘡

癰撲

惡蟲蛇傷

發丹

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘵

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

楊氏家藏方

魏氏家藏方

易簡方

簡易方

直選方

得效方

瑞竹堂方

黃堅志方

江西方

沈氏筆讀方

千金方

大全良方

活人書

祕傳證治要訣卷一

江陰朱氏校刊本

明 太醫院使戴元禮述

諸中門

中風 附破傷風漏風

天地間惟風無所不入一罅不塞來不可禦人之一身
縝密者少疎漏者多風乘之也輕則爲感重則爲傷又
重則爲中古人謂避風如避寇蓋欲窒源以防患中風
之證卒然暈倒昏不知人或痰涎壅盛咽喉作聲或口
眼喎斜手足癱緩或半身不遂或舌強不語風邪旣盛

氣必上逆痰隨氣上停留壅塞昏亂暈倒皆痰爲之也
五臟雖皆有風而犯肝經爲多蓋肝主筋屬木風易入
之各從其類肝受風則筋緩不榮或緩或急所以有喎
斜癱緩不遂舌強語澁等證治之之法調氣爲先經云
善治風者以氣理風氣順則痰消徐理其風庶可收効
先用麻油調蘇合香圓或用薑汁或用白湯調如口噤
挾開灌之稍甦則進八味順氣散

諸中或未甦或已甦或初病或久病或吐出紫紅色者
死昏沉不省人事口噤不可進藥急以生半夏爲末吹

入鼻中或用細辛皂角爲末吹入喉噴嚏則甦此可以
驗其受病深淺則知其可治不可治若稍得甦省者入
味順氣散便服治風藥然未遽絕治氣藥小續命湯煎
熟去滓調蘇合香圓一粒或五積散加麝香少許或星
香散或醒風湯加木香一錢如服前藥不効其人頑涎
愈盛或前證不解或增困重宜星附湯或三生飲加全
蝎三箇間磨沉香湯下養正丹肥人多有中病以其氣
盛於外而歉於內也肺爲氣出入之道人肥者氣必急
氣急必肺邪盛肺金剋木膽爲肝之腑故痰涎壅盛所

以治之必先理氣爲急中後氣未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿香正氣散星香散煎服此藥非特可治中風之證治中氣中惡霍亂尤宜尋常上嘔下疼多痰者亦可用之

若中後體虛有痰不可峻補熱燥者宜四君子湯和星香飲或六君子湯和之中而口眼喎斜者先燒皂角烟薰之以逐去外邪次燒乳香薰之以順其血脉若前證多怒宜小續命湯加羚羊角熱而渴者小續命湯去附子加秦艽半錢恍惚錯語者加茯神遠志各半錢不得

睡者加炒酸棗仁半錢不能言者加竹瀝一蜺殼許人
虛無力者去麻黃加茯苓如其數

若人自甦者能言能食惟身體不遂急則攣蹠緩則耽
曳經年累月難以起止加減地仙丹常服

若中飲食坐卧如常但失音不語俗呼爲啞風小續命
湯去附子加石菖蒲一錢

筋骨疼者俗呼爲痛風或痛而遊走無定俗呼爲走注
風並宜烏藥順氣散和煎復元通氣散嚙地仙丹或青
龍圓未效用大防風湯或五積散調乳香末

脛細而膝腫者俗呼爲鶴膝風宜地仙丹

感冒後四逆手足不遂牙關緊急與霍亂後四逆手足
搐捻欲成風者草果飲和星香散各半貼煎服

有無故口眼喎斜投以中風藥劑不效蓋緣骨虛中受
風所致當於此求之不可例作尋常中風治之川烏一
味決不可少宜炮熟用

遍身骨節疼痛晝靜夜劇如虎之嚙名曰白虎歷節風
並宜加減地仙丹或青龍圓乳香圓等

有於窓牖間梳洗卒然如中呼爲詹風五積散加防風

一錢有痛風而痛有常處其痛處赤腫灼熱或渾身壯熱此欲成風毒宜敗毒散

兩頰赤腫其狀如癰名頭面風酒調消風散食後服仍以生杏仁去殼頻搯之諸般頭風見在諸痛門頭痛證病有終身不愈者其在腰或屈而不能伸或伸不能屈者在手足亦然以風傷肝肝主筋筋爲之也治法活血爲先多服四物湯吞活絡丹

治風之法初得之卽當順氣及其久也卽當活血此萬古不易之理久患風疾四物湯吞活絡丹愈者正是此

義若先不順氣遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌活輩吾未見能治也

風有偏枯風痺風懿風痺此皆言其至重也外有證狀不同其名亦衆非旦暮可愈非口耳可受不復繁引若中人髮直吐清沫搖頭上攣面赤如粧汗綴如珠或頭面赤黑眼閉口開手撒遺尿聲如鼾睡皆不可治所謂風中脉則口眼喎斜中腑則支體廢中臟則性命危不特中風他中亦然

其有害大風者古謂之癰風俗呼爲麻風病之至惡無

出於此得此病而眉髮髭髯先落猶風撼木而葉先落也間有食蛇服大風油而愈者亦幸耳

破傷風者因皮肉曾有破傷處風從瘡口入其證項強牙關緊狀如發瘥不似中風又似產後角弓反張用蘇合香圓進防風散玉真圓

漏風不論冬夏額上常有汗出得之醉後當風所致頭乃諸陽之會酒能發陽所以飲必見面醉後陽氣上升頭面之毛竅必開當風坐卧風邪入之以致頭面汗名曰漏風黃耆六一湯加防風麻黃根桂枝各半錢風已