



R272.2

10-1

活幼心法目錄

卷一 痘症

論受病之原

折諸家之衷

闢時醫之謬

辨虛寔寒熱之異

晰氣血盈虧消長之理

精炮製用藥之法

卷二 痘症

初發熱至痘出齊數日內調治法

備載各變症方論治法

卷三 痘症

症出齊後起發灌膿數日內調治法

備載各變症方論治法

卷四 痘症

漿足回水至結痂還元數日內調治法

備載各變症方論治法

卷五 痘症

備用緊要諸症方論

夾班丹

夾麻疹

倒靨

痒

痛

肉脹

發

發癰

臭爛

衄血

水疱

口瘡

咽喉

失聲

瘡水

小便不利

患眼

以上各症治法

并附古今治痘要方

卷六

痘症

痘證或問六條

卷七

痧症 麻疹同惜心法止論發熱見形留毒
三方因詳補孟氏諸症治法以成全

痧疹治法總論

初發熱欲出未出時用治法

已見形一二日內用治法

已出而紅腫太甚用治法

痧症四五六日同時各症用治法

卷八

雜症

雜症論

急驚風卽陽 慢驚風卽陰 吐瀉

疳 腹痛 發熱

卷末 心法附條

附治痘要方

論脉

集中諸方。有用人參者。在從前參價尙不甚貴。今則六七百換矣。平等之家。恐難購用。故遇其症。但以上黨參加倍代之。庶不致見貴藥而遂不用。轉有以誤之也。然力能用者。仍宜用之。附記

活幼心法大全卷五

明清江聶尚鉅久吾父著

備用緊要諸症方論

夾斑

痘有夾斑而出者。有紅赤點而無頭粒多。隨出而隨沒。又有夾丹而出者。紅赤成片如雲頭而突起。此皆毒火浮游散漫於皮膚之間也。遇此者不必驚惶。但用元參升麻湯一二劑。散其游火。其斑丹自退。

元參升麻湯

元參

去蘆

升麻

去散小根
各二錢

甘草

八分

防風

荆芥

治癰疽
卷三
癰疽
癰疽

夾麻

倒靨

在內不出為伏出而復入為陷膿時不起為倒陷膿時不結亦為倒靨

表虛故痒

牛旁子

各六分水煎溫服

有夾麻疹而出者用前方加桔梗酒炒黃岑各六分令其

麻疹先退痘疹自當起發

痘瘡初見一二日細小四五日漸大頂平至六七日脚

漸潤頂愈平陷其色全白形如豆殼者名曰倒靨此氣

血大虛而漿不行也宜用前參歸鹿茸湯加官桂白朮

川芎各八分南木香四分大便溏泄者兼用參朮散痘痒

者表虛也此為危症宜用參芪實表湯

參歸鹿茸湯

鹿茸酒塗炙去毛勿用酥蜜炙黃芪一錢當歸身酒洗

一錢炙甘草六分人參一錢官桂二分川芎白朮

南木香四分

參朮散

白朮用裏白無油去蘆人參白茯苓去砂仁炙

草去蘆苡仁炒熟家蓮子去心真神曲炒山查肉各

錢肉豆蔻麵裹煨熟去麵切細訶子煨去廣陳皮洗

去筋膜晒南木香三錢以上共研極細末每用二錢

清米飲調食前溫服。兒有不肯服者入稀粥內和服

治外八法
卷三
痘疹

亦可

參芪實表湯

與平和湯意亦相形

蜜炙黃芪一錢五分人參一錢五分炙甘草 官桂 防風

白芷各八分當歸 川芎 桔梗 厚朴各六分南木香

三分生薑一片同煎溫服。

一方外治痘痒用荆芥穗爲末。紙裹緊搓。糊貼紙頭。令不散。仍焙乾。燈上燃之。却於桌上敲去灰。指定痒痘頭。用荆芥火點痒處一下。患者自以爲妙。每痒痘悉點之。立止。

痘。痒。必。定。屬。虛。管。瞬。乃。謂。有。氣。盛。血。熱。而。痒。者。此。無。稽。
謬。說。也。又。有。謂。因。血。上。行。氣。分。血。味。本。賊。醃。蝥。皮。肉。作。
癢。似。爲。近。理。然。灰。白。之。痘。不。惟。氣。虛。而。血。虛。亦。甚。矣。豈。
能。上。行。而。醃。皮。肉。而。癢。塌。最。甚。則。此。說。亦。未。必。然。也。有。
穢。氣。觸。犯。而。癢。者。急。燒。蒼。朮。紅。棗。或。黃。茶。葉。以。辟。之。甚。
者。內。服。平。和。湯。

平和湯

人參

當歸

桔梗

白芍

紫蘇

黃芪

各四分

防風

白芷

甘草

各三分

官桂

沉香

檀香

乳

香

藿香

各二分

生薑一片同煎溫服

表虛之痘。膿漿不滿。多有癢者。其在幼兒。或兒雖長而神氣困者。必不能禁其手搔。須令其著舊軟絹衣袖長者。用絹條縛其袖口。令不得爪搔。爲妙。如無絹衣。或作軟絹袋。裹兒手。亦可。有一六歲女孩。其痘不正。膿漿淋漓。而癢甚。曾用此法。得不搔破。其後頭面亦無疤痕。若不用此法。而爪破已多。縱性命能保。惡疤決難免也。痘痛爲實。此爲吉兆。用生白芍爲細末。酒調下一錢五分。立止。甚者不過二服。

痘痛

肉脹

危症
頭面預腫者
亦危

痘出齊後有面目腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不能拘攝毒氣以成膿故其毒散漫妄行肉分也此為危候急宜大補氣血以收攝其毒則痘灌膿而腫脹自消矣以參歸大補湯主之

參歸大補湯

與和平湯參芪實表湯相似 即實表湯去官桂加山查紫草

人參

當歸

蜜炙黃芪

各一錢二分

川芎

桔梗

山

查肉

炙甘草

各八分

防風

白芷

薑炒厚朴

紫

草茸

各六分

南木香

三分

生薑一片同煎溫服

痘疔

痘出齊數日後其間有紫黑脹硬獨大而無根暈者痘

疔也用四聖膏填入或拔毒散點之。

四聖膏

珍珠

碗豆

俱燒存性

亂髮灰

三灰等分

水片

半分

用油胭脂點成膏。先將金銀簪撥開疔口。將藥填入瘡內。卽轉紅活。

拔毒散

雄黃

一錢研碎

胭脂濃浸水調。點疔頭上。卽時紅活。

痘毒發於肌膚而氣血不能悉運化以成膿結痂。則有鬱熱不散。赤腫而成癰者。其發於未收以前者少。而發

發癰

於既收以後者多。未收以前。必膿漿少而薄者有之。若
膿漿滿者。無有也。既收以後。必結痂浮薄而速結速落
者有之。若結痂厚實而緩結緩落者。無有也。此毒氣發
洩盡與不盡之明驗也。又有不虛而服補劑。不寒而服
熱劑。以致發癰者。醫之悞也。凡此俱大連翹飲主之。

大連翹飲

連翹

牛旁製

柴胡

去蘆

當歸

赤芍

防風

各八分

木通

車前子

荆芥

酒炒黃芩

酒炒山梔

滑石

甘草

蟬退

各五分

生薑一片同煎大便秘者

內服大連翹
飲外刷三豆
漿

加酒炒。大黃一錢五分。

但當其勿發熱發腫時。內外夾攻。急消散之。爲上。至於成膿。則幼小之兒。多難堪。而在頭項胸腹腰背者。甚險也。慎之。慎之外治。以三豆漿塗之。

三豆漿 黑豆 萊豆 赤小豆 各用一合。以酸醋。

浸脹搗研醲漿。時時以鵝翎刷之。紅腫退去其效如神。又方用赤小豆爲細末。清水調敷。乾卽易之。

痘瘡原多潰爛。收結後。或手足等處。仍作熱臭爛。出膿水不止者。生肌散摻之。

臭爛

生肌散

地骨皮 黃連炒 黃柏炒 五倍子 生甘草 等分

爲細末。乾摻之。卽熱退結痂而愈。其有仍作熱作膿而不卽愈者。內毒未淨也。仍用大連翹飲解之。

大連翹飲

連翹 牛旁製 柴胡去蘆 當歸 赤芍 防風各八分

木通 車前子 荊芥 酒炒黃芩 酒炒山梔

滑石 甘草各五分 蟬退五分 生薑一片同煎大便秘

者加酒炒大黃一錢五分。