

增補洪氏女科一盤珠下卷

金川邑庠生洪金鼎玉友氏纂男廉洛 參訂

產育門類

併附方脉叔和脉論三條

欲產之婦脉離經

脉歇至是也

沉細而骨節痠痛

分誕來朝日午定知生

欲產之脉必離經離經之脉認分明

其來大小不調勻或如雀啄屋漏應腰疼腹痛眠生花產在須

臾却非病新產之脉緩滑吉實大絃急死來侵若得重沉小

者吉忽來堅牢命不停寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生審

看症候分明記常將此念註心經

臨產吉凶脉訣

身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青

陰陽兩虛心氣將絕及舌

上冷子當死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定
然斷唇口俱青沫又來母子俱死總高判面青舌赤沫又頻母
死子活自分明不信若能看應驗方知先哲不虛陳

臨產要論

臨產總看血盈虛再加藥力以相扶血足潤腸胎易下血虛胎
澁不能蘇性培養血氣爲真訣催生湯藥莫忙活

臨產六字訣

一曰睡 二曰忍痛 三曰慢臨盆

將產未產真僞辨

一胎未滿月胞水不破先下血者此是傷胎非產也宜服
保元湯隨服八珍湯胎卽安不安再服

黃芪蜜炒二錢人參一錢當歸五錢童便爲引

八珍湯 人參一錢當歸三錢熟地瓦炙乾三錢白芍酒炒

白朮土炒白茯苓去皮甘艸蜜水炒川芎各錢半外加酒炒

續斷 阿膠各二錢蒲黃炒京墨爲引

一胎未滿月先破水腰不痛名試水症非產也宜服八珍湯加杜仲故芷益母草服數帖俟月足自易產

一惡露少者雖久不妨此胞水未破不宜用大力早宜安睡內服佛手散以生血水破即生

一胞水先破惡露行盡數日不生者血虛也宜服八珍湯佛手散不可速用催生藥方見前

一腰痛甚水破者將產也以胎繫于腎故也宜服佛手散母草加益

一 臨產胞水惡露已盡此胞衣久破其血已涸致兒乾攔

宜服佛手散
又各君臣散

當歸一兩 川芎六錢 外加益母草 五錢 人參五錢

又方 佛手散

加蜜糖

半盞生用

麻油

半盃

爲引

一 婦人臨產數日不下下半身俱冷貧窘無藥令取花椒槩橙葉吳于共煎湯一盆令產婦以小橈坐盆內薰洗良久小腹皆煖氣溫血行遂生

一 兒未生先露手足謂之逆生非吉兆也古方用綉花針將兒手足針下一兒得驚一縮又以食鹽塗其手足心使老成穩婆緩緩推入產母久睡不縮又推非推不入難恃藥力之功

蟠腸生論

或問蟠腸生是何緣故曰是用力之過產母平日氣虛臨時用

力努搏搏身氣血下注以致腸隨兒下一次如此下次又復如此若能等待瓜熟蒂落何得有異怪之事耶

一方治蟠腸生用大紙條一個以麻油潤透火點燃吹滅以烟薰產婦鼻孔生腸卽上

又方生腸出以潔淨滌器濃煎黃芪湯浸之腸卽上

又方以通關散吹鼻得噎數聲腸卽上方見妊娠中風門

催產經驗方

臨產之時有主方催生甚穩佛手散當歸六錢川芎四五錢益母水煎嘗單方用黃牛糞調敷母腹一炷香少頃扶起卽下催生神效方

急救產婦有神方一鐘好酒與蜜糖麻油童便雞子白水煎熱

服最爲良

保產應驗方

縣主王毓德刊傳予撰歌訣以便讀記

川朴傳來用七分當歸川芎錢半增貝母羌活甘草艾葉五分煎等分不宜用各一錢荆芥八分枳壳六錢活甘草艾葉五分煎等分不宜多加減依方取用是真詮胎動卽安生卽下死胎奇效若神仙

滑胎枳壳散

湖陽公主產難當南山道人進一方一兩甘炒枳壳二爲末服之立刻康

經驗滑胎

胎乾凝滯不能生蜜糖半盞麻油煎

各用半盞

滑石二兩爲細

末徐徐調吃卽安然

死胎論

凡子死腹中多因傷觸跌撲或胞破血乾日久困憊但察母腹飽脹面赤舌黑或下血塊其子已死或爲嘔吐或穢氣上冲皆子死之症宜速用下死胎方下之下後察其虛寔隨加調補自愈若唇舌面色俱青則子母皆危之兆也

下死胎方

丹方

鮮紅花

二兩以酒煮汁飲之卽下

又方

當歸

兩川朴

三錢

陳皮

二錢

酒

水各半煎一碗

加朴硝

五錢

再煎熱服

死胎卽下

千金去胎方

麩麴

升酒煮

二三沸徐徐服之

其胎如縻

母無所苦千金不傳

下胎小品

麥牙

一斤搗碎

水二碗煮

一碗服之卽下

廣濟下胎方

花粉

五錢

肉桂

半斤

豆豉

三錢

水煎服

下死胎古方 蒼朮 陳皮 川朴 甘艸 各三錢 酒水各半

煎熟入芒硝三錢再煎服死胎即化為水而出

又方下死胎 芒硝三錢 當歸一兩 川芎六錢 童便半碗水煎

交骨不開 治初產體寔者

交骨不開也不難當歸川芎炙龜板取來亂髮燒存性指甲川

山皆要辨名爲五虎下西川水煎熱服骨自散

右藥歸芎各半兩 川山甲人指足指頭髮俱燒灰各一錢

又方 治交骨不開血氣虛者 當歸一兩 川芎六錢 髮灰一

錢 龜板炙六分 人參五分 水煎吃以熱童便催之 此方

能助氣血開闢之功立致也若見咬牙昏憤急以熱童便

灌醒速進干全大補湯培養精神遲則不能救矣

外治丹方 用熟黃芪二兩煎湯薰洗

又方 用荊芥藿香椿根皮煎湯薰洗

胞衣不下

產後何症最爲急胞衣不下飽悶極皆因惡露脹胞中漸冲心上痛不息若喘滿時定至齒脫衣散用爲中的牛膝木通各三錢歸尾枳壳二錢入化石二錢葵子二水煎熱服應有益產母自啣頭髮尾得嘔噦時胞自出外用鞋底炙熱來乘熱產母小腹慰又有單方鉄秤錘燒紅淬酒產母吃異人傳授一單方半盞好酒與蜜糖麻油童便各半盃芒硝三錢加入良當歸牛膝二錢半一同煎吃自安康

又有單方又見竒只用雞頭蓮葉一枚煎吃一半下一半全用

全下又何疑 瘀血脹胞不能出人參三分不可忽更加蘇木
用三錢童便一盞同煎沸外用灶心土爲末醋調塗腹胞自出
古方只用失笑散欲下胞不難蒲黃靈芝共爲末破破氣無憂患
氣虛血弱不能送也不脹分也不痛大補氣血助其功惟有決
津煎可用當歸澤瀉川牛膝肉桂地黃烏藥共

產門不開

產門不開氣血虧補中益氣最合宜加入黑姜一錢半管教門
閉不須疑方載前腫脹疼痛加丹皮黑枝仁各六分

產後四大方

產後總宜大補益寒涼攻伐害非一雜症皆爲末病看培養元
氣爲中的三日之內宜行血熟地白芍忌酸收黑神散與生花

湯生新化蕩二方求歸木保產併回生四方斟酌不須憂

生化湯 產後主方生新血化汚血極平極穩 當歸六錢

川芎 四錢 黑姜 五分 桃仁 去皮尖五分 甘草 五分 腹痛已止

去桃仁再服數劑尤妙水煎加酒一鐘童便一鐘

黑神散 產後主方治惡露未盡腹痛等症 甘炒錢二黑姜錢一

肉桂 一錢 熟地 四錢 白芍 酒炒二錢 三錢 三錢 當歸 四錢

蒲黃 三錢 炒黑姜為引 三錢 宜服生化湯較勝黑神散

歸木保產湯 產後主方 三五日 當歸 川芎 白朮 土黑姜 錢半

白芍 酒炒 生地 各七 陳皮 香附 各五 甘草 一錢 酒水各半服

回生丹 治婦人死胎不下及產後諸疾汚穢未盡 腹痛等症

製大黃膏法 用蘇木 三兩 河水 五碗 煎至三碗 去渣紅

花

三兩炒黃色

用好酒

一大壺煮十餘沸

去渣

黑豆

三升

煮熟

存汁三碗而乾為末

大黃

一斤用

好醋

八碗

熬成膏

次下紅花酒蘇木湯黑豆汁攪勻又熬成膏以磁盆收貯

定用將鍋焦焙乾為末入後藥同磨之

大參

白朮

青皮

木瓜

各三錢

當歸川芎玄胡蒼朮香附蒲黃赤苓桃

仁熟地

各一兩

牛夕

三稜

芎皮

靈芝

地榆

甘艸

羌活白芍陳皮

各五錢

良姜

四錢

烏藥

二兩

木香

爾香

沒藥

各二錢

右藥共為末用前大黃膏和為丸計重二錢

每服一

方

加益母草馬鞭草

五錢

秋葵子

三分

尤妙

產後諸症論列于後

一產畢血暈用薄荷湯調服此丸

產後七日氣血未定因食物與血結聚胸中口渴心煩裏水調服此丸

產後血入心肺熱入脾胃寒熱似瘧寔非瘧也滾水調服此丸

產後敗血走注四肢化爲浮腫乃血腫非水腫也宜連服二

產後敗血冲心言語顛狂非風邪也宜服此丸

產後敗血流入心孔閉塞失音用菊花分三桔梗分三煎湯調吃

產後悞食生冷滯物流入大腸不得剋化傳成煎湯服此丸

產後餘血流入小腸閉塞水道小便溺血用調木通四分煎湯服此丸

產後餘血流入大腸閉澁肛門有瘀血成塊用陳皮三分煎湯調服此丸

小便澀大便閉乍寒乍熱如醉如痴宜服此丸

產後敗血入五臟六腑并走肌膚四肢面黃口渴鼻中流血

遍身斑點危症也陳酒化服此丸可愈

已上諸症皆產後敗血爲害也此丸大有奇功至產後一切奇症醫人所不識但服此丸無不立安一丸未應二丸必效無疑胎前常服回生丹壯氣養胎滋陰順產調和臟腑平理陰陽更爲神妙先賢此條議論但施之體寔胎者則可體虛者恐墮胎矣慎之一室女閉經月水不調並宜服回生丹

此回生一丹不知始自何人徧考醫書所列不過二三長葛孫奎臺經驗較予所傳之方尚有所缺法製湯引亦未講明予特詳述之以備後之參考

產後血暈

婦人產後血暈迷神昏口噤令人悲快把秤錘用小鉄秤錘紅火煨

酸淋對鼻急薰之單方速取熱童便徐徐灌下又何疑炒黑三

錢荆芥穗爲末調吃更爲奇

以童便調吃

清魂散

治血暈不省人事

澤蘭

荆芥穗炒

黑川芎各二錢

石菖蒲生蒲黃

黑姜

灰生甘草

各三分童便爲引

失笑散

治血暈

五靈芝

蒲黃

各三錢

俱炒爲末水調服

龍牙清魂散

治產後去血過多虛暈識語或言鬼神或出此

腔野調拋磚弄石不認親人多不治惟此方可以挽回

龍齒

火煨爲末

志肉

甘草水炒

當歸

茯神

去骨各一錢

麥冬去心

人參

各五分

肉桂

玄胡

細心

甘艸

各四分

薑棗引

益母丸

治血暈識語

此方極平穩多效

益母艸

一兩炒爲末

用薄荷湯童便調服

加味平胃散

治產後敗血冲胃惟昏沉飽脹嘔吐是也

蒼朮 陳皮 厚朴 甘艸 各一錢 黑姜 灰 肉桂 各五分

又單方 治血暈神效 上血竭真沒藥二味 各三錢 共為末

又單方 治血暈 鹿茸 一錢 燒灰為細末好酒和童糞即醒

加味益母散 治血暈惡露不行 益母草 荆芥 炒黑 各三錢

歸尾 紅花 丹皮 各錢半 桃仁 七粒 山查 炒黑 三錢

蒲黃 葛蒲 甘艸 各三分

芎歸瀉心湯 治血暈心神恍惚 歸尾 川芎 玄胡丹皮

各一錢 蒲黃 肉桂 各五分 靈芝 一錢 另研末水煎服

血暈醫按

一婦人初產血暈不省人事請予治之 先用古方取薑酒瓶中

取熟醋淬之以瓶嘴對產婦鼻孔薰之略醒予立破血方新治之