


宋蘇集
冬



傷寒論註卷之四

南陽

張機

經集原義

慈谿

柯琴

韻伯編註

崑山

馬中驊驥北較訂

太陰脉證

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利。益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結。嘔。

陽明三陽之裡。故提綱屬裡之陽證。太陰三陰之裡。故提綱皆裡之陰證。太陰之土。濕氣主之。腹痛吐利。從濕化也。脾爲濕土。故傷于濕。脾先受之。然寒濕傷

人入于陰經不能動藏則還于府。府者胃也。太陰脉布胃中又發于胃。胃中寒濕故食不內而吐利交作也。太陰脉從足入腹寒氣時上故腹時自痛。法宜溫中散寒。若以腹滿爲實而誤下。胃口受寒故胸下結。顛。

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也。當溫之宜四逆散。
甘草 乾姜 附子

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趨少腹者。此欲自利也。上條明自利之因。此條言自利之兆。四五日是太陰發病之期。

大陰之脾家
實心陽明之
胃家實達
相對

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩下利。日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。

前條是太陰寒濕。脉當沉細。此條是太陰濕熱。故脉浮緩。首揭傷寒。知有惡寒證。浮而緩。是桂枝脉。然不發熱而手足溫。是太陽傷寒。非太陽中風矣。然亦陪對不發熱言耳。非太陰傷寒。必手足溫也。夫病在三陽。尚有手足冷者。何況太陰。陶氏分太陰手足溫。少陰手足寒。厥陰手足厥冷。是大背太陰四肢煩疼。少陰一身手足盡熱之義。第可言手足爲諸陽之本。尚

所謂不表
熱也。熱至
表也。若真
不表熱則
病已愈。何
以又有黃
下利等事
乎。

自溫不可謂脾主四肢故當溫也。凡傷寒則病熱太陰爲陰中之陰陰寒相合故不發熱太陰主肌肉寒濕傷于肌肉而不得越于皮膚故身當發黃若水道通調則濕氣下輸膀胱便不發黃矣然寒濕之傷于表者因小便而出濕熱之蓄于內者必從大便而出也發于陰者六日愈至七八日陽氣來復因而暴煩下利雖日十餘行不須治之以脾家積穢臭塞于中盡自止矣手足自溫是表陽猶在暴煩是裡陽陡發此陰中有陽與前藏寒不同能使小便利則利自止不須溫亦不須下也

傷寒下利。日十餘行。脉反實者死。

脾氣虛而邪氣盛。故脉反實也。

太陰病脉弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其胃氣弱。易動故也。

太陰脉本弱。胃弱則脾病。此內因也。若因于外感其脉或但浮。或浮緩。是陰病見陽脉矣。下利爲太陰本証。自利因脾實者。腐穢盡則愈。自利因藏寒者。四逆輩溫之則愈。若自利因太陽誤下者。則腹滿時痛。當加芍藥。而大實痛者。當加大黃矣。此下後脉弱。胃氣亦弱矣。小其制而與之動。其易動合乎通因通用之。

法

大黃瀉胃是陽明血分下藥芍藥瀉脾是太陰氣分
下藥下利腹痛熱邪爲患宜芍藥下之下利腹痛爲
陰寒者非芍藥所宜矣仲景于此芍藥與大黃並提
勿草草看過

惡寒脉微而復利亡血也四逆加入參湯主之

方註見四逆湯註中

○右論太陰傷寒脉証

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

太陰主裡故提綱皆屬裡証然太陰主開不全主裡

也脉浮者病在表可發汗太陰亦然也尺寸俱浮者太陰受病也沉爲在裡當見腹痛吐利等証此浮爲在表當見四肢煩疼等証裡有寒邪當溫之宜四逆輩表有風熱可發汗宜桂枝湯太陽脉沉者因于寒寒爲陰邪沉爲陰脉也太陰有脉浮者因于風風爲陽邪浮爲陽脉也謂脉在三陰則俱沉陰經不當發汗者非也但浮脉是麻黃脉沉脉不是桂枝証而反用桂枝湯者以太陰是裡之表証桂枝是表之裡藥也太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈。

風爲陽邪四肢爲諸陽之本脾主四肢陰氣衰少則

兩陽相搏故煩疼脉滿與長不是並見滿本病脉滿而轉長病始愈耳風脉本浮今而微知風邪當去滿則少氣少血今而長則氣治故愈

四肢煩疼是中風未愈前証微滿而長是中風將愈之脉宜作兩截看

太陽以惡風惡寒別風寒陽明以能食不能食別風寒太陰以四肢煩溫別風寒是最宜着眼少陽爲半表半裡又屬風藏故傷寒中風互稱少陰厥陰則但有欲愈脉無未愈証惜哉

○右論太陰中風脉証

太陰病欲解時從亥至丑上

經曰夜半後而陰隆爲重陰又曰合夜至鷄鳴天之陰陰中之陰也脾爲陰中之至陰故主亥子丑時

結胸太陰腹滿時痛而反下之寒邪與寒藥相結成

寒實結胸無熱証者不四肢煩疼者也各以三白散


三物皆白別于黃連小陷胸也舊本誤作三物以黃

連括覆投之陰盛則亡矣又誤作白散是三方免費

連巴豆寒熱天淵云亦可服豈不誤人且安爲

陽病中水瀉証後而方後又以身熱皮栗一證

使人難解合夜太陰病下結覆之後其証其方若合



三白散證

寒實結胸。無熱証者。與三白小陷胸湯。爲散亦可服。
太陽表熱未除而反下之。熱邪與寒水相結成熱實。
結胸。太陰腹滿時痛而反下之。寒邪與寒藥相結成。
寒實結胸。無熱証者。不四肢煩疼者也。名曰三白者。
三物皆白。別于黃連小陷胸也。舊本誤作三物以黃。
連括萸投之。陰盛則亡矣。又誤作白散是二方矣。黃。
連巴豆。寒熱天淵。云亦可服。豈不誤人。且妄編于太。
陽篇中。水瀉証後。而方後又以身熱皮粟一段雜之。
使人難解。今移太陰胸下結鞭之後。其証其方。若合。

符節

三物白散

桔梗 貝母 各二錢 巴豆 一分 去皮熬黑研如脂

右二時爲散內巴豆更于硃中以白飲和服強人半錢

七、羸者減之

貝母主療心胸鬱結。桔梗能開提血氣。利膈寬胸。然非巴豆之辛熱。斬關而入。何以勝硝黃之苦寒。使陰氣流行而成陽也。白飲和服者。甘以緩之。取其留戀于胸。不使速下耳。散者散其結塞。比湯以蕩之更精。病在膈上者必吐。在膈下者必利。

本証原是吐利。因胸下結塊。故不能通。因其勢而利導。是則結塊自除矣。

不利。進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。

東垣云。淡粥爲陰中之陽。所以利小便。今人服大黃後。用粥止利。卽此遺意耳。



少陰脉證

少陰之爲病。脉微細。但欲寐也。

三陽以少陽爲樞。三陰以少陰爲樞。弦爲木象。浮而弦細者。陽之少也。微爲水象。沉而微細者。陰之少也。衛氣行陽則寤。行陰則寐。日行二十五度。常從足少陰之間。分行藏府。今少陰病。則入陽分多。故欲寐。欲寐是病人意中。非實能寐也。少陽提綱。各臻其妙。少陰病。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若小便色白者。以下焦虛。有寒不能制水故也。

欲吐而不得吐者。樞病而開闔不利也。與喜嘔同。少陽脉下胸中。故胸煩。是病在表之裡也。少陰經出絡心。故心煩。是病在裡之裡也。欲吐不得吐。欲寐不得寐。少陰樞機之象也。五六日。正少陰發病之期。太陰從濕化。故自利不渴。少陰從火化。故自利而渴。少陰主下焦。輸津液。司閉藏者也。下焦虛。則坎中之陽引水上交于離。而未能。故心煩而渴。開門不開。故自利。不能制火。由于不能制水。故耳。然必驗小便者。以少陰主水。熱則黃赤。寒則清白也。不于此詳察之。則心煩而渴。但治上焦之實熱。而不顧下焦之虛寒。則熱